

72+/03
229
X

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

57,065

BEQUEST OF

WALTER FAXON

June 22, 1921.


6/-

225

London, May 7, 1902

Walter Sapon

JUN 22 1921



JOANNIS RAII
SYNOPSIS
METHODICA

Avium & Piscium ;
OPUS POSTHUMUM,

QUOD
Vivus recensuit & perfecit ipse
insignissimus Author :

IN QUO
Multas SPECIES, in ipsius Ornitho-
logiâ & Ichthyologia desideratas, adjecit :
Methodumque suam PISCUM Naturæ
magis convenientem reddidit.

CUM
Appendice, & Iconibus.

LONDINI:
Impensis GULIELMI INNYS, ad In-
signia Principis in Cœmeterio D. Pauli.
MDCCXIII.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
AND
ZOOLOGY
OF THE
CITY OF LONDON

PLATE 1
OF THE
FISHES OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
AND
ZOOLOGY
OF THE
CITY OF LONDON

By
J. A. S. REED,
F.R.S.

London:
Printed by
J. A. S. REED,
F.R.S.

1871

Printed by
J. A. S. REED,
F.R.S.

JOANNIS RAII
SYNOPSIS
METHODICA
AVIUM.



LONDINI:
Anno MDCCXIII.

ERRATA Typographica

Leviora haud operæ pretium est indigitare: Graviora autem hoc modo corrigenda.

IN Præfatione p. 1 l. 16. post *amicorum* inferere *D. HANSII SLOANII Archiatri, &c.* In ipso libro Litera *A* Avibus Anglicanis anteponenda est in pag. 6. l. 18. ante 2 Aquila. p. 7. l. 3. ante 3 *Haliaeët.* p. 13. l. 6. ante 1 *Falco.* p. 16. l. 1 ante 16 *Tinnunc* l. 17. ante 1 *Buteo* l. 26 ante 2 *Buteo.* l. 33. ante 3 *Balbus.* p. 40. l. 2 lege *Tritico.* p. 64. l. ult. *Cen.* p. 65. l. ult. *Hathersedge.* p. 70. l. 9. post *flavo* dele periodum. p. 108. l. 14. post *fuscus* inferere *Uropygium lineis albis & nigris varium; Pectus & Venter alba.* p. 119. l. 8. dele periodum post *habuit.* p. 128. l. 16. *Strundt jager.* p. 147. l. 27. post *Provincia* dele periodum. l. 1 snult. *Tardi.* In Synopsi Piscium p. 5. l. 16. *duo.*

Ad Lectorem.



HIC Liber, insignis licet, & clarissimum superiore seculo Scriptoris nomen primâ fronte gerens, in cujusdam Bibliopola scrinio, forte fortunâ paulo abhinc reperi-
tus est. Ibi pulvere obrutus, & cum tincis certans, Bibliopola culpâ, diu delituit. Quem ut Autographum remitteret, nec prece, nec premio, nec minis **RAII** amici moverent: id quod ex eorum Epistolis, jam penes me asservatis, nuperimè intellexi.

Opus idcirco Posthumum habes, benevole Lector; at ab ipsius magni **RAII** manu, diu ante obitum ejus, limatum & perfectum. Quippe summorum & doctissimorum ejus amicorum, **D. TANCREDI ROBINSONI, M. D.** aliorumque rogatu, inchoatum est hoc Opusculum; quod ut absolutius ederetur, huic suas Jamaicenses, aliasque Observationes & Collectiones imperavit clarissimus **SLOANIUS**. Ita tandem ad finem perductum est circa annum 1693 aut 1694, ut ex **RAII** Epistolis patet, & de hac re me certiore fecit **D. DALE Braintreensis** Vir curiosus, ac **RAII** vicinus & amicus.

In utrâque hujus Synopsis parte, plurimæ additæ sunt Species; ac in posteriore Methodo;

Ad Lectorem.

us alia est, & Naturæ magis conveniens quam in Clarissimi WILLUGHBEI Ichthyologiâ, à R A I O nostro editâ.

Quamvis igitur immortale magni WILLUGHBEI nomen, & opera sint laudè dignissima, aliorumque facile superantia ejusdem Ornithologia & Ichthyologia, si tamen Historias excipias, hic Liber non tantum mole minor, ideoque ad circumferendum aptior, verum etiam auctior multò est & emendatior.

Cum primò Willughbei Raiique mentionem feci, in animo fuit quadam de tam illustrium virorum institutis, & exantlatis laboribus dicere, prout ab ipso R A I O, WILLUGHBEI item filiâ (sui sexûs ornamento) alii(que accepi. Hæc verò si aggrederer, necesse esset, aut plura dicere quàm quæ in Prasatiunculâ enumerari possunt, aut pauciora quàm tantorum Virorum meritis debeantur. De his autem alius erit dicendi locus, cum Epistolas, cæteraque R A I A N A edidero; quod molior, si modò vitam otiumque dederit Deus. Obnixè igitur omnes, qui de re literariâ cum Clarissimo R A I O egerunt, peto, si qua ejusmodi R A I A N A habeant, ut pro suâ humanitate mihi velint impertire: quod beneficium, ut omnes rei literariæ studiosi, gratâ memoriâ & summâ laude prosequantur, ita præ aliis

Upminster prope Rumfordiam, Essexiæ.

Dec. 19. 1712.

W. DERHAM.

SYNOPSIS

METHODICA

AVIUM.

AVIUM Divisio generalis.



VES sunt vel *terrestres*, vel *aquaticæ*.

Terrestres vocamus quæ aquas minimè frequentant, sed in siccoribus plerumque degunt, & in terra victum quærunt.

Hæ vel sunt rostro & unguibus *aduncis*, Γαυψώνυχες Græcis dictæ, vel rostro & unguibus *rectioribus* minisque hamatis.

Γαυψώνυχες vel sunt *frugivora* ut *Psittaci*, vel *carnivora* & *rapaces*, ut reliquæ. Rapacium in genere, sed præcipuè *Diurnarum*, Noctæ sunt, Caput habere grande, collum breve; Rostrum & unguis (ut diximus) *aduncos*; Linguam latam, crassam, & humanæ similem. Pennas in cauda 12, quod & multis præterea avibus commune est; Remiges in utraque ad 24. Ventriculum membranosum, non musculosum; Appendices seu *Intestina cæca* gemina, brevissima, quæque adultis saltem nullius usûs esse videntur; femora valida & musculosa, ad prædam ferendam; *Insigni visûs acumine* pollere, ad eam è longinquo dispiciendam: *Solitarias* esse, non *gregarias*. Quamvis autem *Aristoteles* in genere

B

pronunciet,

Pronunciet, Γαμψορύχων ἐστὶν ἀγλαῖα. Vultures excipienda videntur, quos *B. Illonius* catervatim volare, 50 aut 60 simul, observavit: *Pennis plumisve pro corporis mole copiosissimis vestiri*, ut Aves majores esse videantur, quam pennis exutæ reverà sunt: *Longævas esse, & quidem præ aliis Avibus*; de quo quamvis dubitem; Aves tamen in genere omnes pro corporum mole Quadrupedibus vivaciores esse certissimum est. *Inediam diutissimè tolerare*, quod pro victûs ratione, qui non semper in promptu, iis ferè necessarium est. *Fœminas maribus corporis mole majores esse, formâ speciosiores, viribus fortiores, indole generosiores ferociorelve*; quodd sobolis alendæ curâ iis præcipuè incumbit. Quodd *Rostrî basis aliquousque cute nudâ*, (ceram Accipitrarii vocant) obducatur. Quodd *uncus Mandibulæ superioris ætate augetur, & in longum producitur*. Quodd denique *excrementa fluida ferè sunt lactis instar*. Hæ prædâ & rapinâ plerunque victitant, Quadrupeda minora & Aves invadentes & dilaniantes; nonnullæ ignaviores cadaveribus fortè repertis non abstinēt, sed discerptis vescuntur, ut *Vultures*. *Γαμψορύχες rapaces & carnivoræ sunt vel Nocturnæ*, quæ internoctu evolant & prædantur, capitibus magnis & velut Felinis, *Bubenes & Noctuæ dictæ*; vel *Diurnæ*, ut Reliquæ, quæ interdiu prædantur.

Uncungues *rapaces* seu carnivoræ *Diurnæ* sunt vel *Majores*, vel *Minores*. *Majores* sunt vel *Generosiores* ut *Aquilæ*; vel *Ignaviores*, ut *Vultures*.

Aquilæ nonnullæ Accipitres quosdam (ut v. g. Gyro-falconem dictum,) magnitudine non superant quin potius ab hisce superantur. Differunt ergo Aquilæ ab aliis rapacibus, non tantum quodd magnitudine excellunt, sed quodd naturâ feræ & indomitæ sunt, nec institutionis & tractationis patientes.

Minores itidem sunt vel *generosiores*, ad aucupium institui solitæ, *Hawks* nostratibus dictæ, Latinis *Accipitres*, quas Accipitrarii optimâ ratione distinguunt in *Macrop-teras*, h. e. *Alis longis* & ad caudam ferè extremam extensis donatas, *Long-winged Hawks*; quales sunt *Falco*, *Lanarius*, &c. & *Brachypteras*, *Short-winged Hawks*, i. e.

alis brevibus & ab extrema cauda multum deficientibus præditas; uti sunt *Accipiter Fringillarius* & *Palumbarius*: vel *Ignaviores* & *Sylvestres*, ab Accipitrariis ferè neglectæ, ut *Buteo*, *Milvus*, &c. quibus addi possunt *Lanii* seu *Colluriones*; in hoc genere minimæ, rostro aliquousque recto, extremo adunco. Aves rostro & unguibus rectoribus minùsque hamatis sunt vel 1. *Maximæ*, singulares & sui generis, ob corporum molem & alarum parvitatem volatui inidoneæ, ut *Struthio-camelus*, *Emeu* seu *Cassoaris*, & *Dodo*.

2. *Mediæ magnitudinis*, seu majores, quæ vel sunt *Rostris magnis crassis validis* & *oblongis*; vel *Rostris minoribus* & *brevioribus*, nonnihil incurvis, saltem in *Galinaceo* genere.

Priores in duo genera distinguimus. *Primum Genus* *Corvinum* vocamus à similitudine *Corvi* Avis notissimæ; quarum notæ sunt, *Rostrum* magnum; crassum, rectum, aut modicè inflexum; victus ex carne, insectis & frugibus promiscuus; nonnullæ tamen carnivoræ tantum sunt, morticinis & cadaveribus præcipuè inhiantes, quin & aves vivas aliæque animalia rapiunt & dilaniant, undè à nonnullis *Semirapaces* appellantur. *Corvos* etiam à quibusdam ad aucupium institutos dividimus. *Secundum*, *Picorum* genus est, quod plurimis & insignibus notis ab alio quocunque *Avium* genere differt, & cognitu facillimum est. Earum præcipuæ, & maximè characteristicæ sunt, 1. *Linguam* habere teretem, in spinulam osseam, acutam, utrinque dentatam desinentem, quam longissimè exserere & evibrare potest in arborum rimas aliæve foramina, ad insecta ibidem latitantia lancinanda & extrahenda. 2. *Digitos* in pedibus anticos tantum duos, & posticos totidem, ad arbores commodius scandendum. 3. *Intestinis* cæcis carere; quod nulli alii quam hætenus novimus avi convenit.

Posteriores in duo genera subdividuntur, 1. *Gallinaceum*, quarum notæ sunt 1. *Rostrum* breve validum & nonnihil incurvum, ad grana, quibus præcipuè victitat hoc genus, colligenda. 2. *Ventriculus* crassis musculis

4 SYNOPSIS METHODICĀ

instructus ad eadem, calculorum (quos deglutit) opē comminuenda. 3. Corpus crassum & ponderosum, carne multa. 4. Alæ breves & concavæ, undè minimè altivolæ sunt, & breves volatus faciunt hæ aves. 5. Intestina cæca longissima. 6. Caro, præcipuè musculorum pectoris, alba, qui color à coctione se prodit manifestius. 7. Humi nidificare, quia sci. pulli recens exclusi in nido non jacent, nec à matribus aluntur; sed densa lanugine vestiti, huc illuc cursitare, matres sequi, ipsique cibum rostellis colligere possunt.

2. *Columbinum*, cujus notæ sunt 1. Figura corporis peculiaris, Cuculum referens. 2. Tibiæ breves, & in omnibus quas novimus speciebus unà cum pedibus rubræ. 3. Alæ longæ, & volatus pernix. 4. Rostrum rectum, tenue, angustum & longiusculum; excipienda hîc sunt columbæ nonnullæ exoticæ, quæ rostrum brevius & crassius habent. 5. Vox gemebunda. 6. Bina duntaxat unâ vice ova ponere; quem defectum sæpiùs in anno pariendo compensant. 7. Cibum pullis ex ingluvie sua in os eructare maceratum & emollitum ad faciliorem concoctionem.

3. *Minores*; quarum notæ, magnitudo inter Columbas & Alaudas media: Rostrum longitudinis & crassitiei mediocris, deorsum modicè inflexum, cauda longa; victus è baccis & insectis promiscuus. Hoc genus Avium à similitudine cum Turdo Ave notissima *Turdinum* vocamus.

4. *Minimæ*, quas Aviculas dicimus, & in *tenuirostras* & *crassirostras* dividimus.

Aves aquaticæ sunt vel quæ circa aquas versantur & in aquosis plerumque victum quærunt, aquis tamen non innatant, quæ omnes *fissipedes* sunt, pleræque etiam longicruræ, tibiis quoque supra genua vulgò credita aliquousque nudis, ut aquas vadosas commodiùs ingrediantur: vel quæ aquis innatant, quarum pleræque *Palmipedes* sunt, & crura breviuscula maximam partem obtinent.

Quæ

Quæ circa aquas versantur sunt vel *Maximæ*, singulares & sui generis, ut *Grus*, &c. vel *Minores*. *Minores* sunt vel *Piscivoræ*; vel *Insectivoræ* aut *Limosugæ*, five ut utrasque eodem nomine comprehendam, non *Piscivoræ*. Non *piscivoras* pro rostrorum longitudine dividimus in 1. *Rostris longissimis* donatas, seu *rectis*, ut *Scolopaces*, &c. five *curvis*, ut *Arquatae*, &c. 2. *Rostris mediæ longitudinis*, cujusmodi sunt *Himantopus*, &c. 3. *Rostris brevissimis*, hoc est, *Digitum* & *dimidium* non excedentibus, ut *Vannellus*, *Pluvialis*, &c.

Aves aquis innatantes, sunt vel *fissipedes*, digitis in nonnullis, ut *Fulica*, ad latera membranis auctis: vel *Palmipedes*; æque vel *longicruræ* & *anomalæ*; *Phœnicopterus*, *Avosetta*, *Trochilus*; vel *cruribus brevioribus* donatæ. Hæ vel *Tridactylæ* sunt, digito postico carentes; ut *Penguin*, *Alca*, *Lomwia*, *Lunda*: vel *Tetradactylæ*: quibus vel *digiti omnes membranis intercedentibus connexi* sunt, ut, *Onocrotalus*, *Anser Bassanus*, *Corvus aquaticus*, &c. vel *tres tantum*, postico soluto; atque hæ iterum vel I. *Angustirostræ*; seu *rostro in extremo acuto*, recto aut modicè tantum inflexo, quæ duum generum sunt 1. *Brachypteræ* & *urinatrices*, *Colymbi dictæ*, quorum nonnulli digitos habent divisos membranis tantum lateralibus auctos. 2. *Macropteræ* & *volaticæ Lari dictæ*: five *Rostro in extremo adunco*, quæ duum pariter generum sunt, nimirum 1. *Rostro serrato* seu ad latera utrinque dentato; *Mergi*: 2. *Rostro levi* seu dentium experte, *Puffinus* Anglorum, *Avis Diomedea*, &c. vel II. *latirostræ*; quæ dividi possunt in genus *Anserinum*, quarum notas inferiùs dabimus: & *Anatinum*, cujus generis *Aves* sunt vel *marinæ* & *urinatrices*: vel *fluviatiles* & *lacustres*.

*Aves rapaces diurnæ: & primò MAJORES
quæ duûm Generum sunt.*

Primò Generosiores, seu A Q U I L Æ.

Aquila magnitudine insigni, quâ earum plerisque antecellunt, necnon feritate innata, ut difficulter admodum cicurari & ad aucupium institui possint, à reliquis *Avibus rapacibus* differunt; generositate & Rostri aduncitate à *Vulturibus*, quibus Rostrum non confestim atque è fronte enascitur in hamum curvatur, verùm post duorum digitorum seu medii palmi continuam rectitudinem, observante *Gesnero*.

1. *Chrysaëtos Aldrov.* Ornithol. lib. 2. cap. 2. i. e. *Aquila fulva seu aurea.* Magnitudine inter Aquilas excellit, & colore in toto corpore fulvo à reliquis distinguitur; à proximè sequente caudæ totius colore fulco, quòdque crura ad pedes usque plumosa habeat. *Aldrovando* appensa 12 libras æquabat.

2. *Aquila fulva seu Chrysaëtos*, caudâ annulo albo cinctâ. Hujus nidus Anno 1668. in sylvis propè *Derwentiam fluvium* in *Pecco Derbiensi* inventus est, è bacillis seu virgis ligneis grandioribus compositus, quorum altera extremitas rupis cujusdam eminentiæ, altera duabus betulis innitebatur. Bacillis junci insternebantur, juncis *Ericæ*, *Ericis* iterum junci; in quibus jacebat pullus unicus cum uno ovo urino, adjacentibus cadaveribus unius agni, unius leporis, & trium *Grygalli* pullorum. Erat autem nidus iste quadratus, duas ulnas latus, nullâ in medio cavitate; verùm planus & æqualis. Pullus seîdè adultus erat, & ad volandum idoneus, *Accipitris palumbarii* figurâ; dorso *Subbuteonis* instar nigricante; Anseris propè pondere; tibiis ad pedes usque plumosis; annulo seu zonâ in cauda albâ.

Aquilæ

Aquilæ speciem quandam in præruptis rupibus seu clivis montis *Snowdon* in Wallia quotannis nidificare aiunt.

3. *Haliaëtus* seu *Offifraga*, *The Osprey*. In fluminibus nostris non rarò pisces prædatur; at verò pedem alterum planum, digitis membranis intercedentibus connexis, Anseris aliùve *Avis* palmipedis in modum, alterum divisum ad instar aliarum Rapacium habere (ut vulgo persuasum) proculdubio falsum & fabulosum est. Ob magnitudinem insignem Aquilis annumerari mereatur; cum *Balbusardus* Anglorum, *The bald Buzzard*, (qui à multis pro *Haliaëto* habetur) nonnullis etiam ex *Accipitrino* genere avibus magnitudine cedat.

4. *Melanætos* seu *Aquila Valeria*. A colore nigro, & viribus quibus valet dicta. Hujus generis Avem in Curia *Medioburgensi* *Zelandiæ* enutritam vidimus, Corvi magnitudine duplâ; Capite, collo, pectore, nigris; in interscapulio maculâ magnâ triangulari ex albo rufescente notatam, item areâ albâ transversâ in alis. Sexus tam in hac specie quàm in aliis Aquilis coloribus multùm variant.

5. *Pygargus*, *Albicilla Gazæ*, quibusdam *Hinnularia*. Magnitudine quâ ei cedit; colore luteo rostri & pedum, capitis albicante aut cinerascante, caudæ vel totius, vel alterius medietatis albo, à *Chrysaëto* differt. Nobis ad frateram examinata $8\frac{1}{2}$ libras pendebat. *Aldrovando* descripta multò minor erat, & colore diversa. Venetiis nacti sumus ab Aucupibus occisam, & in foro venum oblatam.

6. *Morphnos* *Gesn.* & *Aldrov.* non alia avis est quàm *Balbusardus* Anglorum, ipso *Turnero* fatente, qui descriptionem ejus sub *Morphni* appellatione ad *Gesnerum* transmisit.

7. *Morphno* congener *Aldrov.* Galli gallinacei magnitudine erat, Cera rostri luteâ, colore rotius ferrugineo, maculis tamen aliquot albis hinc inde sparsis; cruribus totis hirsutis ad digitos usque.

8. *Aquila Brasiliensis cristata*, *Urutaurana* Indigenis dicta *Maregrav.* Crista è quatuor pennis nigris componitur, duabus mediis 2 digitos altis, lateralibus parvis. Ro-

strum nigrum cum cera ad basin flava. Pedes etiam flavi. Color in capite, alarum remigibus, & tota ferè supina parte fuscus: in pectore, ventre, & femoribus cruribusque ad pedes usque albus, nigris pennis squamatim variegatus.

9. Urubitinga Brasiliensibus *Marcgrav.* A præcedente differt 1. colore, qui huic per totum corpus fuscus est & nigricans; 2. Oculis Aquilinis, cum illi eleganter aurei sint; 3. Cruribus nudis luteis; 4. Cauda bicolore, inferiore parte ad duas tertias alba, reliqua nigra. 5. Cristæ denique absentia.

10. *Pernopteros seu Gypætos Aldrov. Oripelargus* etiam dicta. Hujus Avis tres seu species seu varietates proponit *Aldrovandus*, quarum descriptiones apud ipsum vide. Nos hujus generis Avem *Venetis* in ædibus cujusdam *Nobilis Veneti* enutritam vidimus & descripsimus An. 1664.

Magnitudine Aquilam æquat superatve. Caput & collum plumis destituta, albâ duntaxat lanugine vestiebantur. Inum collum infra lanuginem quidam veluti torquis plumarum albertium cingebat. Plumæ ferè omnes corpus tegentes dilutè ferrugineæ. Remiges alarum & cauda nigra. Rostrum magnum, Lari quàm Aquilæ similis, extremo albicans: Nares cute nigra tegebantur. A rostro ad oculos cutis nuda erat, colore cœruleo. Oculorum irides ex rubro Avellaneæ. E naribus continuè guttatim humor stillabat. Crura paulò infra genua plumis recta, ex interiore parte alba. Pedes plumbei: medius digitus reliquis multò longior: extremus ad primum articulum membranâ medio annexus: Ungues nigri, minores minisque incurvati quàm in Aquilis. Ingluvies tanquam saccus propendebat. Semper fere alis expansis stetit, eodem situ quo *Vultur Leporarius* à Gesnero depingitur.

Avis hæc primæ ab *Aldrovando* descriptæ eadem esse videtur, à qua secundam ejusdem speciei diversam non esse suspicor; cum *Aldrovandus* ipse secundam suam *Gypæton Gesnerianæ* non dissimilem esse fateatur. Quod verò *Gesneriana* & nostra eadem Avis sint, vel unica

nica illa nota humoris è rostro stillantis ad probandum sufficere videtur, quantumvis colores discrepent: *Gesneriana* enim colore Ciconiam referebat. Sexus autem in hoc genus Avibus coloribus aliisque accidentibus plurimùm differunt.

Avis hæc ob ignaviam suam, rostrique & pedum figuram, Aquilis minimè accenseri debet.

De VULTURIBUS.

Vulturum notæ characteristicæ quibus ab aliis Rapacibus Avibus, Aquilis præcipuè, differunt, sunt, 1. Quòd Rostrum eis non confestim atque è fronte enascitur in hamum curvetur, sed post duorum digitorum continuam rectitudinem. 2. Quòd Aquilâ ignaviores sint, & cadaveribus vescantur, à quibus illæ abstinent: nec tamen cadaveribus solis vescuntur, sed etiam vivas volucres, hædos, lepores, hinnulos insectantur & rapiunt. 3. Collum ferè implume habere. 4. Turmatim volare, observante *Bellonio*, quod solis inter Rapaces diurnas Vulturibus convenit. 5. Ingluviem ante ventriculum velut sacculum propendentem habere, quod in *Gypaëto* dicto Venetiis viso observavimus. 6. Quòd marem fœmina, præter morem aliarum Rapacium, magnitudine non superet. 7. Quòd alarum incumbens corpori pars leni tota vellere, quod soli inter Rapaces peculiare, integitur. 8. Quod sub gutture spatium habeat palmi latitudine non tam plumis quàm pilis, qui Vitulinis simillimi sunt, vestitum.

Verùm Crura ad pedes usque plumosa habere, quâ notâ Vultures ab aliis Rapacibus distingui existimat *Bellonius*, nec omnibus commune est nec solis proprium.

Vulturum species à *Bellonio* & *Gesnero* proponuntur sex.

1. Vultur cinereus.

2. Vultur niger. Quorum *Bellonius* nullas neque descrip-

scriptiones integras, neque notas characteristicas adhibet, sed nudas duntaxat icones ponit.

3. Vultur *Bæticus* à Bætico seu castaneo totius corporis colore dictus. Alarum & caudæ pennæ nigræ sunt : Plumæ verticis breviusculæ & curtæ : Cauda brevis alarum longissimarum respectu. Crura brevia, plumis undique contexta ad digitos usque.

4. Vultur *Leporarius* *Gesn.* Colore est in rutilo nigricante, pedibus flavis. Stans aut sedens cristam quasi cornuta in capite erigit, quæ in volante non apparet. Minor est, nec pectore adedò fulvo ac proximè sequens.

5. Vultur *aureus* *Gesn.* Pars prona tota ruffa, versùs caudam dilutior. Dorsum nigrum : Alæ & cauda fuscæ. Aquilæ est magnitudine. Digiti pedum fusco aut corneo colore sunt.

6. Vultur *albus*, quem cum cinereo *Bellonius* eundè facit.

7. Vultur *fulvus*, *Bætico Bellonii* congener. Dorsum ei & alæ fulvæ : cauda brevis alarum respectu, quo cum Bætico *Bellonii* convenit. Rostrum nigrum, extremo aduncum. Caput & collum ad pectus usque, ut & media pars pectoris, plumis destituta, brevi, molli, densaque lanugine alba vestiuntur. Oculi torvi, iridibus croceis : In cervicis ima parte, seu dorsi summa, congeries pennularum angustarum, reliquis multò longiorum, ut in *Pernoptero* Aldrovandi, collum cingit. In Ornithotropheo Regio, in Vivario *S. Jacobi* dicto enutritum vidimus & descripsimus, unde allatum nescimus.

8. Vultur *Brasiliensis* aut *Mexicanus*, Urubu *Marcgr. Tzopiloth* Fr. Ximen. *Aura* *Nieremb.* Corvi magnitudine est ; caudâ longâ, alis tamen ea longioribus. Pennæ totius corporis nigræ : caput parvum, cute tectum paulum rugosa, mira colorum diversitate ; nam in sinistro latere infra oculum crocei est coloris, supra oculum cœrulei, item in summitate ; reliqua parte subruni ; in dextro latere circa oculum supernè & infernè crocei coloris, in summitate itidem ; reliquâ partem ex croceo albicantis. Rostrum satis longum, extremo aduncum, & ad medietatem usque à capite cute obtectum è croceo cœrulescente. In medietate rostri superiore narium

um foramen unum, amplum, transversim positum. Extremitas rostri quæ cute caret alba est. Fœtet ejus caro instar cadaveris; nam & cadaveribus vescuntur. Fœda avis est, semper macra, nunquam satura. *Ximenes* Corvi speciem facit. Verum Rostri extremitas adunca & Caput implume Vulturibus accensendum suadent.

Avis hæc Jamaycensibus nostris the *Carrion-Crow* dicitur in superiore: à rostri mandibula duo narium foramina ampla habet, non unum transversim positum, ut falso *Hernandez*. Volat ut *Milvus*: Animalia viva non aggreditur aut rapit, sed mortuorum duntaxat cadaveribus vescitur, ut nos certiores fecit doctissimus Amicus noster & naturalis Historiæ callentissimus *D. Hansius Sloane*, αὐτόπῃς.

9. Hujus generis esse videtur Avis illa ingens Chilensis, *Cuntur* dicta, quam ego ob magnitudinem enormem & pene incredibilem, pro ficta & fabulosa olim habui, ideoque Ornithologiæ *D. Willughby* inferere non sum ausus. Jam verò dari hujusmodi Avem fidem mihi fecit Amicus noster summus, & in Historia Naturali versatissimus *D. Hansius Sloane* M. D. Historiâ ejus, quam ab αὐτόπῃ fide dignissimo, *D. Joanne Strong*, Nauarcho, qui per tretum Magellanicum in Oceanum Australem navigavit, unâ cum penna Alæ remige, accepit, communicata.

Ad oram, inquit *D. Strong*, maritimam Chilensem, circa tricesimum tertium latitudinis Meridionalis gradum, non procul à *Mocha* insula, antequam locum *Herradura* dictum accederemus, Alitem hanc offendimus, Clivo maritimo excelso prope littus insidentem. Glande plumbea tractæ & occisæ spatium & magnitudinem socii navales attoniti mirabantur. Quippe ab extremo ad extremum alarum extensarum communisurata 13 pedes latitudine æquabat. Hispani Regionis istius incolæ quænam Avis esset interrogati *Cuntur* dictam affirmabant, seque ab illis valdè timere, nè liberos suos raperent & dilaniarent, vel aliquam eis noxam inferrent.

Penna quam mihi (verba sunt *D. Sloane*) dono dedit Capitaneus prædictus, duos pedes & quatuor insuper

per digitos longa erat. Scapus nudus seu pars fistulosa $5\frac{3}{4}$ dig. longa, ambitu ferè sesquidigitali, ab uno latere non nihil concava, ab alterò convexa, colore tota fusco seu obscuro, $\text{℥iij. gr. } 17\frac{1}{2}$ pondere. Avis ipsa, ex descriptione rudi, qualem ab imperitis & in Historia Animalium minimè versatis extorquere potui, quin Vultur fuerit ex Aurarum dictarum genere minimè dubito. A nautis ob caput calvum seu implume pro Gallo pavone per errorem initio habita est, ut & Aura à primis nostræ gentis Americæ colonis ob eandem rationem, unde & carnem ejus comederunt, idque sine ullo nocumento.

Avis hujus à *Josepho Acosta* mentionem factam invenio lib. 4. cap. 37. *E contra* (De Tomineis sermonem habuit) *Quas Condores vocant magnitudinis sunt ingentis, earum-
runque virium, ut non solum Ovem eviscerare & comedere valeant, sed & vitulum integrum.*

Garcilasso de la Vega de iis hæc habet, Aliæ adhuc Alites habentur, quas Rapacibus annumerare possumus, magnitudine vasta & immani, *Cuntur* dictæ, Hispanis corruptè *Condor*. Harum nonnullæ ab Hispanis occisæ ab extremo ad extremum alarum extensarum mensurâ sumptâ 15 aut 16 pedes, hoc est 5 $\frac{1}{2}$ ulnas latitudine implebant. Natura ad earum ferociam viresque in parte temperandas aut irritas reddendas, ungues iis aduncos, quos Aquilæ concessit, denegavit, pedum digitis in rectiores & Gallinaceorum æmulos desinentibus. Rostrum tamen iis satis validum indulgit ad Boum etiam tergora perforanda & diripienda, visceraque abdomine discisso dilanianda. Binæ earum vaccam taurumve adorsiri audent, & vorare solent. Nec ab hominibus abstinent; quin singulæ pueros decennes duodecennésve aggrediuntur & occidunt. Insigni Naturæ providentia, tum pecudum tum indigenarum securitati cautum est, nè multæ nascerentur; nam si numerosæ essent, magnam armentis stragem, & incolis damnum inferrent, nec quicquam ferè ab earum rapinis tutum foret. Color varius est ex albo & nigro, Picæ caudatæ instar. Cristam in capite parilem seu æqualem habent instar Novæcylæ, non ferratum ad modum Gallinacæ. Cum ex aëre
in

in terram devolant forti alarum agitatione aërem verberando strepitum susurrumve adeò vehementem & terrificum edunt, ut vel attonitum vel surdum reddat audientē.

Accipitres macropteri generosiores *ad aucupium institui soliti*, Hawks *nostratibus dicti*.

1. **FALCO** *peregrinus*: niger Aldrovando descriptus vertice erat plano & depresso; Rostro pulchrè cœruleo, cum cœra intensè lutea. Caput, cervix, dorsum, alæ fulcæ & propemodum nigræ: Pectus, venter & femora alba, lineis latiusculis nigris transversis distincta. Cauda minùs fusca, lineis nigris transversim ductis [*cross Bars*] insignita. Crura pedesque lutea; tibiæ breves.

2. Falco *Sacer*. Angl. *The Sacre*. Omnium præter Gyrfalconem maximus est, colore Milvino, seu inter ruffum & fuligineum medio; cruribus brevibus, digitis cœruleis; rostro etiam brevi & cœruleo: Corpore longiusculo, alis & cauda longis.

3. Gyrfalco, *The Ferfalcon*, cujus mas five Tertiarius (Anglicè *Tarcel*,) *The Jerkin* dicitur, Gyr. Germanis Vulturem significat. Sola magnitudine sua, Aquilæ æmulâ, ab aliis quibuscunque Falcionibus satis distinguitur; quamvis aliæ notæ non desint Vertex planus, Rostrium cœruleum, item tibiæ & pedes; Color plumarum in corpore toto albus, verum dorfi & alarum pennæ nigra macula cordiformi notatæ; cauda breviuscula notis nigris transversis variegata: Gula, pectus & venter albedine pura tincta. Gruibus & Ardeis inprimis infesta est.

4. Falco *montanus*, *The Mountain Falcon*. Peregrino minor est, verticè fastigiato seu leniter elevato: Rostro crasso, brevi, nigro, cœrâ luteâ; corpore leucophæo; pedibus croceis.

5. Falco *gentilis* i. e. *nobilis dictus*. a Peregrino & Germanico parùm admodum differt vel corporis forma, vel indole & moribus, ut nonnisi oculatissimus quisque & in arte exercitatissimus Accipitrarius eos possit distinguere.

6. *Falco gibbosus*, *The Haggard Falcon*. Sic dictus est, quod ob brevitatem caput vix appareat ante juga alarum, dum eas supra latera dorsi componit; ita ut gibbum gestare videatur. Anglici nostri Rei Accipitrariæ scriptores Falconem hunc gibbosum seu *Haggard Falcon*, & Peregrinum dictum pro eodem habent, nomina hæc promiscuè usurpantes.

7. *Falco albus*, *The White-Falcon*: Colore totius corporis & alarum albo à reliquis speciebus abundè distinguitur.

8. *Lithofalco* & *Dendrofalco*. De his nihil notatum dignum invenimus. *Lithofalco* Alberto mediæ magnitudinis est & vigoris inter *peregrinum* & *gibbosum*. *Dendrofalci* plenissimam descriptionem apud *Gesnerum* habemus, quam Subbuteoni convenire *D. Willughby* existimat.

9. *Falco Tunetanus*, *The Tunis or Barbary Falcon*. Qui nostratibus hoc nomine venit hujus generis reliquis, *Peregrino* dicto, *Montano* & *Gentili* minor est. *Belonius* ad *Lanarii* magnitudinem & similitudinem accedere scribit.

10. *Falco rubens*, *The Red Falcon*. Quæ de hoc genere *Aldrovandus* ex Alberto habet apud ipsum vide: nos an detur hujusmodi species à reliquis distincta dubitamus.

11. *Falcones Indici rubri Aldrov*. Horum alter quem foeminam esse putavit major erat, vertice lato & fere plano. Rostrum cinereum, cerâ luteâ. Supina pars tota cinerea ad fuscum tendens. Ab exteriore oculorum cantho macula longa ducitur, eodem quo pectus colore imbuta. Pectus autem & prona superficies penè tota rubet cinnabarino remisso; inspersis anteriori sterno maculis rarioribus cinereis. Alter, quem marem putavit, minor erat. Color autem rubeus in prona superficie saturatior erat: Dorsum & supina facies prorsus nigra.

12. *Falco Indicus cirratus*. Magnitudine ad *Asturem* accedit. Caput ei planum, nigrum, cirratum, crista bifida ab Occipite retrò dependente. Collum rubrum; Pectus

Pectus & venter ex albo & nigro varia, lituris seu lineis transversis alternis perquam lucidis & pulchris. Irides oculorum flavæ. Rostrum obscurè cœruleum & propemodum nigrum; præcipuè versus apicem, nam basis luteâ membranâ obducitur. Crura plumis ad pedes usque vestita: Pedes lutei, ungues nigerrimi. Minores pennarum alæ ordines fimbriis albicant. Cauda areolis seu zonis nigris & cinereis alternis varia. Cætera nigricat. Avem hanc ex India Orientali advectam in Ornithophio Regio in vivario S. Jacobi dicto enutritam vidimus.

13. Lanarius, *The Lannar*, cujus mas sive Tertiarius *The Lanneret* dicitur. Notæ hujus diagnosticæ sunt, Quod rostrum crurâque cum pedibus habeat cœrulea; plumas anteriores albo & nigro varios maculis non transversis, sed plumas in longum distinguuntibus, contrariâ atque in Falconibus ratione. Supina pars tota fusca; Alarum prona notis rotundis ac instar exiguorum nummolorum per superficiem disseminatis picta. Galliæ perpetuus est Lanarius.

A. 14. Subbuteo *Bellon. & Aldrov. The Hobby*. Parvitate sua à præcedentibus distinguitur, appendicibus angularibus utrinque ad superiorem Rostris mandibulam cum Balbusardo, Æsalone, Tinnunculo & Laniis dictis convenit; ab insectandis Alaudis quibus præcipue infestus est *Accipiter Alaudarius* dici meretur. Ejus autem conspectum & præsentiam, instinctu quodam naturæ, adeo horret & expavescit Alauda, ut ad eum evitandum vel in hominis ipsius sinum confugere vel in carpentum quo vehitur apertum velut in Asylum, quamvis non satis tutum; se recipere non vereatur.

15. Æsalon *Bellon. & Aldrov. The Merlin*. Avium hujus generis omnium minima est, Merulâ non multo major, animosa tamen & audax. Rostrum cœruleum: Torquis sub occipite ex albo lutescens. Dorsum ferrugineo & nigricante cœruleo colore varium. Prona pars corporis albo ferrugineo cum maculis nigro-ferrugineis deorsum à capite caudam versus tendentibus, non transversis.

A. 6. Tinnunculus

16. *Tinnunculus* seu *Cenchrus* *Aldrov.* *The Kestrell*, *Stannell*, or *Stonegall*. nonnullis, *The Windhover*. Magnitudine est *Columbæ*; capite cinereo, lineolis nigris vario; Supina pars corporis ad uropygium usque (quod cinereum) ruffa cum maculis nigris in extremis plumis versûs apices; Prona pars ruffa cum lineis nigris secundum longitudinem pennarum ductis. *Windhover* dicitur quodd aërem quasi ventilet, alas moritando, unde in eodem loco diutius hæret.

Solent non rarò *Tinnunculi* à nostratibus cicurari, & ad aucupium institui, aliarum Avium rapacium more.

Cenchrus seu *Miliaria* dicitur hæc Avis, quodd punctis nigris Milii æmulis insignis sit. *Gesn.*

Aves Rapaces diurnæ minores, macropteræ, sylvestres & ignaviores, ab Accipitrariis neglectæ.

1. **B**uteo *vulgaris* sive *Trionches* quod tres testiculos habere vulgò sed falsò creditus sit. Notæ hujus Avis sunt, Color dorsi è ferrugineo nigricans, cum maculis interdum albis in alarum vestitricibus: Pectoris ex albo flavicans, cum maculis oblongis ferrugineis in singulis plumulis, non transversis sed deorsum tendentibus. Rostrum quoque nudum, è cœruleo nigricans, basi cute nuda lutea (quam *Ceram* à colore, ut puto, vocant) recta. Cuniculis infesta est hæc Avis.

2. Buteo *apivorus* sive *vespivorus*, *The Honey-Buzzard*, A Buteone vulgari differt membranâ ad rostri basin [*the Cere*] nigricante; capite cinereo, iridibus oculorum flavis; pedibus brevioribus & crassioribus; cauda longiore; zonâ cinereâ transversâ in alis & cauda.

Insectis victitat, & vesparum nymphis pullos nutrit.

3. *Balbusardus* Anglorum, *Halixætus* *Aldrov.* *The Bald-Buzzard*; nonnullis, *the Sea-Eagle*. A Buteone vulgari

vulgari differt Occipite albo, unde nomen Anglicum *Bald-Buzzard*, i. e. Buteo calvus: 2. Pondere & magnitudine, quâ eum superat. 3. Alarum longitudine. 4. Digito anticorum extimo retrorsum versatili seu flexili, 5. Appendicibus seu processibus angularibus in superiore rostri mandibula. 6. Victu è piscibus.

A. 4. MILVUS æruginosus *Aldrov. Circus Bellonii, The Moor-Buzzard*. Ad Buteones potiùs quàm Milvos referri debet, cùm caudam non habeat forcipatam, quæ Milvi nota est. Colore undique tam prona quàm supina parte ferrugineo seu Aquilino, excepto summo capite quod ex fulvo albicat; magnitudine infra Buteonem; pedibus longis, tenuibus, flavis, à congeneribus differt.

A. 5. PYGARGUS Accipiter, Subbuteo *Turn. The Ring-tail: Mas Hen-barrow* seu *Henbarrier* dicitur, à laniandis gallinis. Ab aliis differt uropygio albo, unde nomen; torque plumularum arrectarum circa aures, ceu corona, caput cingente.

A. 6. *Milvus, The Kite, or Glead*. Nota hujus característica, quâ solâ ab aliis Rapacium speciebus faciliè distinguitur, est cauda forcipata; ut aliàs conquirere non sit opus: est tamen pulchrè colorata. Pullis gallinaceis & anatinis infesta est. Alis expansis in aëre se librat: quin nulla vel rara alarum agitatione de loco in locum provehitur velut fluxu aut lapsu quodam. Hinc Anglis *Glead* dicitur à verbo *glide*, quod labi motu velut insensibili & tranquillo absque agitatione aliqua aut subsultu significat, ut flumen super planitiem sensim declivem.

6. *Milvus Brasiliensis CARACARA dictus Gaviaon Lusitanis* *Marcgrav*. Magnitudo Milvi: Cauda 9 dig. longa, Alæ 14, quæ tamen nondum ad finem caudæ pertingunt. Color totius ravis cum albis & flavis punctulis. Cauda albo & fusco variegata est. Caput Accipitrinum, rostro adunco, mediocriter magno, nigro. Pedes lutei, unguibus semilunaribus nigris.

Aves Rapaces brachypteræ, i. e. alis cauda brevioribus, seu ab extrema cauda cum componuntur multum deficientibus.

HUJUS generis duas tantum præter *Lanios* species novimus. Eæ sunt,

1. *Accipiter Palumbarius* Aldrov. & aliorum, *Astur Gallorum*. The GOSHAWK. Magnitudine insigni quâ *Buteonem* vulgarem superat à *Niso* Recentiorum seu *Accipitre Fringillario* differt. Supina corporis pars tota fusca, *Buteonis* colore, prona alba, transversis lineolis nigris creberrimis undulatis pulcherrimè variegata.

A. 2. FRINGILLARIUS *Accipiter*, Recentiorum *Nisus* & *Sparverius*, The SPARROW-HAWK. Hujus mas The *Musket* nomine Gallico dicitur. Magnitudo ei *Columbae*. Pars corporis supina fusca; prona lineolis transversis crebris, albis & fuscis ferrugineisve undulatis varia; Alæ breves, quâ notâ ab antedictis omnibus excepto præcedente distinguitur; cauda longa, fasciis transversis (bars vocant) nigricantibus distincta. *Columbas* prædatur & vastat mirum in modum.

His adde Aves Lanios dictas,

A. 3. LANIUS seu *Collurio cinereus* major, The greater BUTCHER-BIRD or *Mattagasse*, *Eboracensis* & *Derbiansibus* *Wereangel*, nomine cum *Germanis* communi. Magnitudine est *Merulae*, colore, exceptis alis & caudæ pennis, (quæ ex albo & nigro variæ) & ductu nigro à rictu oris utrinque per oculos ad occiput, cinereo. Ad *Avicularum aucupium* interdum instituitur.

A. 4. LANIUS minor *rufus* seu *tertius* Aldrov. The lesser red-backt BUTCHER-BIRD. Dorsum huic rufum, uropygium tamen cinereum, ut & caput. A rostro per oculos ultra aures linea lata nigra extenditur. Gula & pectus alba.

A 5.

A. 5. LANIUS minor lineis albis & nigris semicircularibus variegatus, *The lesser variegated BUTCHER-BIRD*. Hæc species lineâ illâ nigrâ à rostro utrinque per oculos ductâ caret.

A. 6. LANIUS minor cinerascens seu ruffo cinereus cum macula in scapulis alba, *The lesser Ash-coloured BUTCHER-BIRD with a white Spot on each Shoulder* : The Wood-chat.

Lanii omnes rostro sunt longitudinis mediocris, aliquosque recto, in extremitate tantum adunco : & *barbula* seu *setas* nigricantes circa rostrum habent : præterea *mandibula* superior prope curvaturam appendices duas angulosas obtinet inferiori superincumbentes, cui nullæ cavitates ad eas excipiendas insculptæ sunt, ut in *Subbuteone* & *Tiununculo*, &c.

Varietates omnes antedictas sæpius observavi ; specie revera distinctas esse non ausim fidenter asserere, cum noverim quantum sexus in hoc genus Avibus colore inter se differant.

Avium rapacium species adhuc tres apud D U
T E R T R E & R O C H E F O R T invenio
in Historia Naturali *Insularum* Antillarum.

1. **M**Ansfeſy dictam formâ & pennis *Aquilæ*, sola magnitudine, (quâ ei cedit nec *Falconem* superat) discrepantem. Aves tantum imbelles, *Turdos*, *Hirundines marinas*, *Alaudas marinas*, *Turtures*, &c. prædatur. *Serpentibus* etiam & *Lacertis* victitat.

2. Le *Pescheur*, *Piscator*, Præcedenti per omnia similis, nisi quod *plumas* in ventre *albas* habeat, & in summo capite *nigras*. Solos *pisces* invadit ; nec *quadrupedia* aut *Aves* aggreditur, iisve ullatenus infestus est.

3. L'esmerillon *Grygry*, a voce seu clamore sic dicta. *Turdo* non multo major est, Supina pars tota ruffa, ni-

gris maculis picta ; prona alba, armellino variegata. *Lacertulas* solas infectatur, sed interdum pullos parvos.

Aves Rapaces minores exoticæ & anōmalæ, *Manucodiata & Aves Paradisi dictæ.*

HA S non *Apodes* esse, ut olim vulgò persuasum, oculatis testibus & Avibus integris alatis constat. Appositè *Bontius* lib. 5. cap. 12. ' *Tantum abest has Paradisi aves vel pedibus carere, vel aëre nutriri, ut unguibus incurvois & peracutis parvas Aviculas, Chlorides Fringillas, & similes venentur, easque mox, sicut reliquæ rapaces Aves devorent : ut nec illud verum sit, eas nonnisi mortuas inveniri, cum & arboribus insideant, & sagittis à Ternacensibus figantur, unde etiam à celeri & reciproco volatu Hirundineo Hirundines Tarnacenses ab Indis vocantur.*

Sunt autem Aves hæ aspectu pulcherrimæ, & singulari pennarum forma & situ ab aliis omnibus avibus diveriæ ; siquidem è pectoris lateribus *pennæ* longissimæ hinc inde magno numero enascuntur, quæ tum ultra caudam in longum aliquousque procurrunt, tum in latum diffunduntur : & è nonnullarum, non tamen omnium, uropygiis, cirri bini seu pennarum scapi, plumulis seu villis destituti, enati, longissimè ultra reliquas pennas protenduntur.

Harum Avium 5 species describit *Aldrovandus* ; plures addunt *Clusius* & *Marcgravius*.

1. Corporis magnitudine & formâ *Hirundinem* pæne æquabat ; capitis plumagine purissimi auri colore egregiè relucente ; *menti* regetibus colore ex cyaneo viridi serici instar splendentibus : *Alarum* pennæ fuscae inter nigrum & ruffum fulgebant : reliqui corporis fulvæ in ruffum vergebant. *Cirri* illi gemini nigri.

2. A reliquis maximè diversa erat, quòd binas in *uro-pygio* pennas haberet cæteras duorum palmarum longitudine excedentes ; *linguam* rubicundam, longiutculam, acutam, *Picorum* non planè dissimilem. *Cirris caudæ* geminis longissimis carebat. *Pennarum* etiam colore à reliquis plurimum differebat.

3. *Hippomanucodiata dicta* ab insigni trium dodrantum à principio rostri ad caudam extremam longitudine. *Rostrum* aduncum : color totius albus, præter collum & ventrem, quæ castanea. Vertex ferrugineus, quem colorem flavus exceperit, ut hunc viridis.

4. Seu *Cirrata* ; rostro longissimo, nigro aduncor. Capitis, colli, & alarum pennæ nigrescebant. *Cirrus* 3. dig. altus, rigidus, flavus, prope cervicem, velut ex seris compositus.

5. Seu vulgaris *Aldrov. Gesn.* quartæ speciei valde similis, nisi quòd *cirro* careret, rostroque ab inferiore parte curvo & exiguo esset.

6. *Manucodiata Rex Marcgrav.* *Hirundinem* corporis magnitudine æquabat : *capite* & *oculis* parvis, *rostro* a recto acuminato, *pedibus* satis crassis, *unguibus* lunatis seu aduncis : pennulis ad rostrum holosericeis, superne viridi & fusco mixtis, inferiùs nigris : *Collum* superne aureum, inferiùs viride ex aureo splendens : *pectus* saturatè brunneum : reliquum corpus, alæ, & cauda eleganter brunnea. *Pennæ* longæ lateribus adnascetes, propè exortum aureæ fuere, reliquæ ex albo flavescentes. *Cirros* binos habuit prælongos ad exortum aureos, versùs extremum incurvatos & obscurè brunnos.

7. *Manucodiata altera, Marcgr.* Magnitudine *Hirundinem* superabat : *Caput* depressum, *Oculi* perexigui grani *Milii* magnitudine, *Rostrum* præcedentis simile. Ad exortum rostri pennulis nigerrimis holosericeis ornata erat. *Guttur* totum & collum inferius ad oculos usque & genas pennis holosericeis è viridi aureis, splendentibus vestitum ; caput superius holosericeis itidem obscurè luteis, sed ad tactum durioribus. Collum cingunt plumæ brevès, holosericeæ, ex aureo splendentes. *Dorsi* tegetes è

flavo aureæ splendentes, inferius dilutè ex albo brunneæ. *Alæ & cauda* brunneæ.

Hæ duæ descriptiones vel unius & ejusdem speciei *Avis* sunt, vel duarum valdè similium, cūque prima *Aldrovandi* in multis conveniunt.

8. *Paradisæa avis* majoris generis *Clusii* à precedente non multū differt, ut eandem planè putem; vertice à rostro ad oculos & collo holosericeis pennulis flavi coloris superna parte, infima fuscis vestito.

9. *Paradisæa* minoris generis *eiusdem*, primæ *Marc-gravii* eadem videtur. *Guttur* tamen pennis viridibus splendidibus tectum erat ad modum *Aldrovandinae* primæ.

10. *Rex Avium Paradisearum* majoris generis *Clus.* Aliis *Manucodiatis* minor erat. *Alæ* toto aviculæ corpore longè majores. *Rostrum* album, unciale, ima parte villis rubris, ceu staminibus holosericeis, tecta, ut & tota capitis parte anteriore. Media pars capitis circa oculos parvis maculis nigris punctata erat. *Collum* cum pectore pennulis saturè nigris, velut holosericeis staminibus, tectum. Supina pars tota ferè, [*dorsum, alæ, cauda*] unicolor erat, è flavo fusca. Sub pectore velut torquæ atro digitum minimum lato insignita erat. *Pennæ ventrem* tegentes albæ, sed quæ alis proximæ nigræ. *Cirri caudæ* tenues, nigri, extremo in orbem convoluti, & ab uno latere villis tenuissimis præditi, supina parte viridi saturo colore splendentibus, pronâ fuscis.

Caterūm Avium *Paradisearum* duo genera sunt, referente *Clusio*, unum *Majorum* quæ elegantiores, cujusmodi in insula *Arou* duntaxat reperiuntur alterum *minorum* & minùs elegantium, quas insulæ (*Papue* insulæ *Cilolo* vicinæ) producunt. Hæ *nervis* illis prælongis seu *cirris* ex *uropygio* exeuntibus carent, quibus alterum genus donatur.

Utrique generi suum *Regem* esse aiunt, peculiarem & colore differentem, qui supra reliquas perpetuò sublimiùs volat.

MANUCODIATA Zeylanica, cauda longissimâ forcipata bipenni, *Walubora* Zeylanensibus i. e. *Gossipium* furens *Mus. Leyd.*

Avibus

AVIBUS RAPACIBUS *diarnis* congener CUCULUS, Κόκκυξ *Græcis*.

Aucupes nostri *Bononienses* (inquit *Aldrovandus*) uno ore affirmant & Cuculos majores reperiri, & minores; & illos præterea duorum esse generum, sed quæ solius coloris differentiâ inter se distinguuntur. *Minores* verò à majoribus non alia ratione quàm magnitudine discrepare.

Majoris utriusque icones dat *Aldrovandus*: minorem nunquam vidit.

Prima *Aldrov.* nostrate *Cuculo* differt figura *Rostris* Palumbi *simili*, cum nostratis rostrum *Turdi* aut *Merulae* rostrum, potius referat: deinde lineis transversis in pectore & ventre interruptis, cum in nostrate integræ & continuæ sint.

CUCULUS nostras seu *Aldrov. secunda*, *The Cuckow*. *Rostro* & *unguibus* est minoribus & debilioribus quàm cæteræ rapaces. *Notæ* ejus *characteristicæ* sunt *Nares* rotundæ supra rostri superficiem eminentes, cujusmodi in nulla præterea ave hæctenus observavimus. Avium ova sorbere dicitur, aut pullos duntaxat tenellos nec dum nido egressos prædari; ideóque exacta ætate, cum ejusmodi victus ei non amplius suppetit, torpere & obdormire creditur. Verùm nos in dissecti ventriculis *Erucas* aliâque insecta invenimus, & aviculas Cuculi pullos insectis nutrire certissimum est: non ergo ob defectum alimenti vel se abscondit, vel alio transfert, quacunque tandem de causa id faciat: fortè quia frigoris hybernî minùs patiens est.

In Ave Anno 1693 observata *Prona pars* corporis albicabat cum aliqua flavi tinctura lineis transversis nigricantibus, in gutture & summo pectore crebrioribus, inferiùs rarioribus, variegata, *Accipitrum* modo: *imus venter* lineis hujusmodi carebat. *Supina pars* rota cum capite & alis, lineis seu ductibus fulvis & nigris transversis pulcherrimè distincta. In summo capite maculæ aliquot albæ; quin & apices pennarum in imo dorso supra uropygium albescent: interior etiam limbus exteriorum alæ remigum

maculis albis majusculis transversis pingitur : *Cauda* prælonga, ductibus transversis nigris & fulvis, maculisque ad scapum & extimos pennarum margines albis varia, 8 pen- nis composita, mediis duabus longissimis, exterioribus utrinque ordine brevioribus. *Tibiæ* brevissimæ, & ad pedes usque plumis velatæ. *Pedes* debiles flavicantes, ungibus propemodum concoloribus. *Digit*i 4, exteriores duo postici seu retrorsum siti, medii antrorsum; interiores autem exterioribus breviores & minores sunt. *Rictus* oris amplus; *os* intus croceum 2. *Cuculus* Indicus, *Mus. Leyd.*

Aves Rapaces nocturnæ.

Capitis & oculorum magnitudine & protuberantia, quodque noctu evolent & prædentur à reliquis Rapacibus diurnis differunt.

Noctuæ auritæ *Horn-Owls*, id est, *Cornutæ*, Anglis.

1. **B**U B O. Cujus tres species proponit *Aldrovandus*. *Noctua* omnium maxima, aut *Anserem* ut quæ *Aquilam* adæquet; *Secunda* à *Gesneriana* seu *prima* differebat *cruribus* minùs torosis supra genu, & gracilioribus; *Colore* per totum corpus fulvo seu ferrugineo ex cinereo, *pectore* subnigris maculis in longum ductis instar *Accipitrum* pulchrè minutimque distincto, nec colores in dorso respondent. *Tertia* *Aldrov.* cum *secunda* in omnibus convenit, præterquam *tibiis*, quas minimè hirsutas habet, sed, quem.

quemadmodum & pedes, debiles. 2. *Bubo Brasiliensis Marcgravii* Jacurutu dicta adeò similis est huic Avi, ut eandem dicere non verear.

Duas hujus generis Aves vidimus in *Ornithotrophio Regio* in vivario *S. Jacobi* prope *Westmonasterium* Aquilæ magnitudine, *pedibus* ad ungues usque hirsutis, iridibus oculorum ex rubro flavicantibus; colore totius Bætico, *Ardeæ stellari* simili, lituris longis nigris deorsum per medium plumarum ductis: lineis circa ventrem transversis.

A. 2. OTUS five *Noctua aurita*, Afioi Latinis Plinio, *The Horn-Owl*. A pennulis in capite extantibus, cornuum aut auricularum æmulis, ita dicitur. Hanc *D. Jessop* ex agro Eboracensi ad nos transmisit: cæterum in Anglia rarius est.

3. *Scops Aldrov.* Omnium rapacium nocturnarum prope minima. *Aures* dictæ seu *cornua* unâ duntaxat pennulâ constant.

Noctuæ non auritæ, seu pennulis aurium instar extantibus carentes.

A. 1. ALUCO minor Aldrov. *The common white Owl, or Barn-Owl*, and by some *The Church-Owl*, quo nomine quandam *Noctuæ* speciem *Belgæ* etiam appellant. *The white Owl*, i. e. *Noctua alba* dicitur à colore albo qui in eâ præcipuè eminet, quamvis maculis & lineolis fulvis pulchrè variegata sit.

A. 2. STRIX Aldrov. *The common brown or Ivy-Owl*, à stridore etiam *Screech-Owl* dicta. Differt à præcedente colore obscuriore, è ferrugineo & nigricante vario: quòdque extrema alæ penna exigua sit, & plus palmo brevior tertia quartâque; secunda digito brevior tertia; quarta & quinta omnium longissimæ; cùm in illa secunda & tertia longissimæ sint, extrema autem utrâvis vix digito dimidio brevior.

A. 3.

A. 3. *STRIX* cinerea, fortè *Ulula* Aldrovandi, *The Grey Owl*. A præcedente differt, quòd hæc cinerea sit, aut grisea, ut vocant, illa fusca aut brunnea; quòd hæc maculis longis in pectore donetur, quibus illa caret; quòdque interior peplus circa caput tantum fusco & albo varius sit.

4. *ULULA* Latinis, *Owl* sive *Howlet* Anglis, Gallis *Hulot*, Germanis *Ul* sive *Eul* à voce quam edit lugubri & flebili proculdubio denominata est hæc Avis, siquidem *Howl* Anglis & Germanis idem valet quod *ululo* & *ejulo* Latinis. *Owl* autem Anglis generale nomen est omnium Avium nocturnarum. *Ulula* Aldrov. *Strix* nostra cinerea esse videtur.

5. *Ulula* Gesneri, *Gallina* magnitudine aut supra; colore ruffo nigro resperfo; pinnulis inter oculos & dorsum multis, densis, cinereo fere colore: *cruribus* albicantibus, punctis conspersis lividis, nobis incognita est.

6. *NOCTUA* minor. *The little Owl*. Parvitate sua, ut quæ *Merula* minor sit, nec *Alaudam* magnitudine multum excedat, ab aliis nocturnis Rapacibus Avibus differt. In *Sylvis Austriacis* invenitur, sed rarius; *Roma* etiam venalem vidimus.

7. *Noctua Brasiliensis* *CABURE* dicta *Marcgr*. Magnitudo *Turdæ*, Rostrum & oculorum irides flavæ; *Cruca* breviter hirsuta; *ungues* nigri; *cauda* lara, umbræ dilutæ, colore albo undata. Pars *supina* tota, caput, dorsum, alæ Umbræ pariter dilutæ colore, maculis albis, in capite & collo minimis, in alis majoribus, variegata. *Pectus* & *venter* albicant, Umbræ dilutæ maculis variegata.

Aves nocturnæ anomalæ, Cuculi colore, ritu
Hirundinis apodis, *CAPRIMULGI* dictæ.

A. 1. *CAPRIMULGUS* nostras vulgaris & Aldrov. *Salopiensibus*, *The Fern-Owl*, *Eboracensibus*, *The Churn-Owl*, à strepitu quem inter volandum edit.

edit. *The Goat-sucker*. Pulcherrima est avis, corporis figura & coloribus *Cuculo* quàm *Noctue* similior. *Rostro* minimo nigro, *Rictu* oris ingenti, *Pedibus* brevibus exilibus ab aliis quibuscunque *Noctuis* abundè distinguitur. In ventriculo *semina* & *scarabeos* invenimus. Est autem *Avis* anomala, nocturna quidem, verùm cum *Rapacibus* nullo modo conveniens. *Caput* proportionè corporis magnum, verùm mulco minus quàm reliquis *Avibus* nocturnis. In *sylvis* præcipuè *mentosis*, in *Pecco Derbiensi*, *Eboracensi* comitatu, *Salopia*, & alibi invenitur.

2. *CAPRIMULGUS Americanus*, *IBIAU* *Brasilienfis*, *Noitibo* *Lusitanis* *Marcgr*. Magnitudo *Hirundinis*; *Caput* latum & depressum; *oculi* magni, pupillâ ellipticâ, iride flavescente. *Rostellum* minimum, *os* amplissimum, *lingua* minima. *Crura* alba parva. *Mediû* *digiti* unguis velut pinnatus. *Pars* supina nigricans punctulis albis inspersis. *Pennæ* in toto inferiore corpore ex albo & nigro mixtæ, ut in *Niso*. Reperitur & species hujus magnitudine *Noctuæ*.

3. *GUIRAQUERA Brasilensis* ad *Caprimulgum* accedens *Marcgr*. Magnitudo *Alaudæ*. *Capitis*, *oculorum*, *oris*, *rostri* figurâ ad præcedentem accedit. *Setas* crassas habet ad latera *rostri*. *Alæ* longæ sunt, sed *cauda* multo longior, cùm in præcedente *Alæ* ad *caudæ* extremitatem fere pertingant; duæ in *caudæ* *pennæ* reliquis longiùs excurrunt. Tota avis ex fusco cinerei coloris est, cum maculis obscurè flavis aut albicantibus mixtis, more *Nisi*. Circa totum collum ponè caput annulum habet obscurè aureum. *Crura* cinerea seu fusca. Reliqua vide apud *Marcgravium*, nam hæc ad distinctionem sufficient.

An *Aves* hæ nocturnæ sint necne, *Autor* non prodidit, utcunque externa specie *Caprimulgum* exactè referunt. Cùm autem *Caprimulgi* & *Hirundines apodes* in multis convenient, annon *Aves* hæ *Brasilenses* *Hirundinei* potius geueris sint considerandum. *Pedum* figura *Hirundini apodi* non respondet.

*Aves Roſtro & unguibus aduncis frugivoræ,
ſeu Pſittaci.*

PSITTACI capite ſunt prægrandi, *Roſtro* ac cranio duro ; Coloribus pulcherrimis, *unguibus* aduncis, *digitis* binis ante, totidem retro ſitis. *Roſtro* inter ſcandendum ceu hamo injecto corpus ſublevant. *Lingua* lata, *Cucurbitæ* ſeminis figuram referens, notante *Scaligero*. Humani ſermonis imitatione olim celebres. In omnibus quas hætenus obſervavi *Pſittacis* nares rotundæ fuere, in ſuperiore parte mandibulæ ſuperioris præ plumaginem ſitæ, ſibi que vicinæ.

Pſittaci magnitudinis ratione in tria genera dividi poſſunt, nimirum in maximos, mediocres, minimos. *Maximi* *Corvo noſtrati*, aut etiam *Caponi* bene ſaginato magnitudine pares ſunt, *caudâ* prælongâ, *Macaos* & *Cockatoons* Anglicè dicti.

Mediocres & vulgatiffimi, *Columbo* domeſtico æquales ſunt, aut paulò majores, minorè ſive, *cauda* brevi, *Parrots* & *Poppinjays* noſtratibus.

Minimi, *Merula* aut *Alaudæ* magnitudine, *caudâ* longiſſima *Peroquets* dicti, *Peroqueto* Italis.

Pſittaci maximi Macaos & Cockatoons dicti.

- 1. PSITTACUS** *maximus Cyano-croceus* Aldrov. *ARARAUNA* Braſilienſibus *Marcgrav*. Canide *Lerii*. Magnitudo *Caponis* bene ſaginati ; Longitudo bicubitalis. *Roſtrum* nigrum, prælongum. *Cutis* circa oculos nigris pennis variegata ; *Vertex* planus & viridis : *Guttur* veluti torquis nigra ambit. *Prona* pars tota crocea ; *ſupina* pulchrè cœrulea. *Cauda* duos dodrantes longa

longa. *Crura* brevissima, *tibiæ* & *pedes* fusci, *unguibus* nigris.

2. *PSITTACUS maximus alter* Aldrov. Superiore nihilo minor est, eadèmq; longitudine; *Rostro* breviorè, *mandibula* superiore alba, inferiore nigra. Albet oculorum regio & tempora. Totum corpus, alæ incipientes, & cauda tota pulcherrimè punicea; ut & alarum remiges parte interiore; exteriorè saturè cœruleæ sunt, unà cum uropygio inferno. Remigum tegetes secundo in alis ordine luteæ sunt, puniceis marginibus, cœruleo velut oculo in apice ornata. *Cruscula* brevia & *pedes* fusci.

In *Psittaco* hujus generis, quem *Londini* observavimus, Alæ & cauda miniaceæ, cœruleo & flavo coloribus variæ erant; caudæ mediæ duæ pennæ reliquas longitudine multum excedebant, in acutos mucrones desinentes, colore cœruleo.

3. *ARARACANGA* *Marcgr.* ab hac non diversa avis esse videtur: Notæ enim pleræque conveniunt; differt quòd per medietatem alæ pennis tectæ sunt viridibus, extremâ medietate cœruleâ.

4. *MARACANA* *Brasilensibus Marcgr.* *Psittaci* species est, sed major: plumæ totius ex gryseo subcœrulescunt. Clamat ut *Psittacus*, fructus amat, *Murucuia* in primis: nec plura de ea habet.

5. *MARACANA* *Araræ*, id est, *Macai* species minor, ut quæ *Psittacum* magnitudine non excedat, *Araræ* tamen figurâ est, cauda longa simili, *rostróque*, quod nigrum, & cute circa oculos, quæ alba, plumulis nigris punctulata. *Caput*, *collum* & *alæ* saturatè virides, *vertice* tantum dilutiorè & cœrulescente. *Alæ* & *cauda* supernè virides, infernè cœruleæ, extremitatibus pennarum obscurè cœruleis. In exortu cujuslibet alæ maculam habet miniatam, supra *Rostri* exortum fuscam.

Alias *Psittacorum* majorum species describit *Clusius* in exoticis.

*Psittaci mediæ magnitudinis Parrots & Pop-
pinjays Anglis dicti.*

1. **PSITTACUS** *albus cristatus* Aldrov. Colore in toto corpore albo, cristâ in capite, caudâ sur-rectâ, magnitudine *Columbæ* domesticæ majori pari, *pedibus* subluteis, ab aliis *Psittacis* facilè discernitur.

2. **PSITTACUS** *viridis, alarum costa superna rubente* Aldrov. Præcedenti magnitudine par est, *Rostrum* superius, extremo nigro, post subcœruleo, reliquo rubicundo ; inferius albo ; *iride* oculi crocea. *Vertice* luteo, reliquo corpore virente, supernè saturatiùs, infernè dilutiùs ; costa superna alarum rubente. *Caudâ* breviusculâ, infernè ad latera rubra in longum macula insigni, supernè flavescente. *Tibiæ* & *pedes* cinerei.

Hæc species apud nos omnium est frequentissima ; in illis quos *Londini* descripsi circa oculos *circulus* erat albus ; & appendix utrinque in superiore *Rostris* mandibula, cui in inferiore crena respondebat.

3. **PSITTACUS** *poikilorhynchos* Aldrov. *Rostrum* superius, in superiori parte, viridicœruleum, ad latera ochræ colore, in extremitate macula transversali candida notatum ; inferius rostrum circumcirca coloris plumbei, in medio lutescit. *Vertex* aureus, reliquum corpus viride, supina parte obscurius, prona dilutius. *Alæ* & *cauda* viridi, amethystino, nigro, miniaceo obscuro, coccineo luteo coloribus variæ ; colorum dispositionem in alis & cauda apud Autorem vide. *Tibæ* breves, *pedes* plumbei, *ungues* nigri.

4. **PSITTACUS** *viridis melanorhynchos* Aldrov. Ad rostri initium, in vertice & sub gula color cœruleus ad viridem tendit. *Supina* pars tota intensius viret, costa duntaxat alæ, quæ corpori adnectitur, extrema coccineo rubet, uti & remigum extrema : pars *prona* lutea, & è luteo viridis, uropygio inferius coccineo.

5. **PSITTACUS**

5. *PSITTACUS leucocephalus* Aldrov. *Rostrum* & pars capitis rostro continua alba. *Gula* & alarum costa suprema colore cinnabarino rubet. Medium pectus inter femora obscurè rubescit. *Occiput, collum, dorsum, ala, uropygium* supernum saturatè virent; *Pectus* & *femora* dilutiùs. Posset hic psittacus ob multiplicem colorum varietatem (qui non pauciores quam septem) ποικίλος seu *versicolor* appellari. Horum autem præcipuus est viridis.

6. *PSITTACUS versicolor* seu *erythro-cyaneus* Aldrov. *Rostrum* est minùs grandi quàm præcedentium, subnigro; *Capite, collo, pectore* cœruleis; *vertice* summo luteo: oculorum regio albicat: *Venter* viridis, *uropygium* luteum; summum dorsum dilutè cœruleum: Alarum tegetes viridi, luteo roseo perfusæ sunt.

7. *PSITTACUS cinereus* seu *subcœruleus* Aldrov. *Columbæ* domesticæ magnitudine est, *Rostrum* nigro. Color corporis totius cinereus obscurior: *Cauda* rubra, colore cinnabarino seu miniaceo, admodum brevis, & vix ultra extremas alas protensa. Oculos cutis nuda candida cingit. Hujusmodi omnes ex *Mina* civitate *S. Georgii* adferri aiunt. *Londini* plurimos vidimus.

8. *PSITTACUS erythro-leucos* Aldrov. Magnitudine *Macaws* dictas, æquat vel etiam superat, verùm *cauda* ei brevis est. *Corpore* toto obscuriùs candicat, ut cinericeus videatur. *Rostrum* nigrum. Postrema *tergi* pars, *uropygium* *cauda* tota, alarum remiges miniaceo tinguntur.

9. *PSITTACUS coccineus* Orientalis, *alis ex viridi & nigro variis*. Magnitudine *Merulam* superat. *Corpus* totum coccineum: *Alarum* vestitrices virides, remiges nigræ, pinnulis exterioribus viridibus, inferiùs cremesinis: costa alarum flava. *Cauda* ima medietate flava, summa luteo-viridis: *Annulus* plumarum viridium crura supra *genua* cingit. *Rostrum* flavum, ut & oculorum irides. *Crura* brevissima nigra. *Londini ex India Orientali* allatum vidimus.

10. *PSITTACUS pusillus viridis* *Æthiopicus* *Clus.* Magnitudo *Fringillæ*. *Corpus* totum viride, in ventre dilutiùs

dilutiùs, in dorso saturatiùs. Alarum *remiges* ab altero latere saturatiùs virides, ab altero & tota supina parte fuscæ. *Caudæ* pennæ ea parte quâ uropygio infixæ colore flavo-viridi, deinde rubro eleganti, demum nigro, postremò viridi tinctæ. Verticis supra rostrum & totius gutturis tegetes plumulæ rubio eleganti & florido colore imbutæ. *Rostrum* crassum & firmum, subrubens: *Crura* semunciam vix longa, cineracea. *Ungues* albi & satis longi.

Cùm edebat, cibum altero pede non tenebat, ut alii Psittaci, sed rostro carptim eum arripiebat.

N. B. Fæmellæ senescentes, (quod valdè notabile) vix edere volebant, nisi cibum jam à mare carptum, & aliquandiu in prolobo retentum, & quasi coctum rostro suo exciperent, ut *Columbarum* pulli à matre ali solent.

II. PSITTACUS elegans *Clus. exot.* Magnitudo *Columbæ*. Collum & pectus versicolores pennæ, rubescentis coloris, & extima parte cœrulei elegantissimi obsidebant, quas cùm irascebatur surrigebar, ut cristatus quodammodo videretur. *Ventris* pennæ similis ferè erant coloris, fusco tamen insuper suffulæ; *dorsi* virides, alarum *remiges* subcœruleæ, *cauda* viridis.

PSITTACI majores seu mediæ magnitudinis Marcgravii.

I. AJURUCURAU. Supra rostrum in capite *mitellam* habet eleganter cœruleam. *Guttur*, *latera capitis* & superior illius pars eleganti flavo vestiuntur; totum *corpus* lætè viridi. In alarum extremitatibus pennæ una medietate nigræ, altera croceæ, partim etiam in extremitate cœruleæ, partim hinc inde virides. *Cauda* viridis, sed quando illam explicat fimbriata nigro, rubro, cœruleo. *Rostrum* ex cinereo fuscum, pedes cinerei. Oculorum irides aureæ.

2. Priori

2. *Priori* similis, paulò aliter colorata ; *mitella* namque in capite flava albedine admixta, supra oculos & in gutture clarè flava est. Circa *Rostrum* superius macula est thalassina.

3. *AJURUCURUCA* *Mitella* ex cœruleo & paucò nigro mixta est, inque ejus medio macula flava, In *guttur* macula est cœrulea. *Pectus*, *alæ*, *dorsum* saturatiùs virent, *extremæ alæ* & *cauda* dilutiùs. *Extremitates pennarum alæ* flavæ & rubræ & Indico colore mixtæ. *Rostrum* superius cinereum, in *extremitatibus* nigrum.

4. *PARAGUA* *Psittacus* est niger, *pectore*, *dorso*, & *ventre* anteriore insigniter rubro ; *iridibus* oculorum rubris ; *Rostro* & *pedibus* obscurè cinereis.

5. *TARABE*. Major est quam præcedens, *capite* rubro & *pectore*, atque initio alarum, aliàs viridis : *Rostro* & *pedibus* obscurè cinereis.

6. *AJURUCATINGA*. Magnitudo *pulli gallinacæ* mediocris ; color viridis ; oculi rubri, & circa eos cutis alba, ut in plerisque ; *Rostrum* & *crura* alba. *Cauda* longa.

7. *AJURUPARA*, in totum convenit cum præcedente, sed minor est.

Psittaci minores, Gallis Perroquets dicti.

1. **PSITTACUS** *torquatus macrouros* Antiquorum *Aldrov.* Longitudo sesquidodrantalis, *Rostrum* miniaceum : *Iris* oculi lutea : Color totius viridis, superne plenior, subtus dilutior. *Torquis* miniaceus collum cingit, ad quem à rostro inferiori sub mento linea nigra ducitur. *Alarum pennæ* extimæ in superiore parte rubrâ notâ distinguuntur.

2. **PSITTACUS** *minor macrouros, totus viridis* Aldrov. Totus *Turdo* non major est ; *Rostro* rubro ; *pedibus* & *cruribus* rubicundis aut carneis præter aliorum omnium normam. *Iris* oculorum crocea.

D

3. PSITT

34 SYNOPSIS METHODICA

3. PSITTACUS erythrochlorus macrouros Japonicus Aldrov. Hic Aldrovando ex icone picta descriptus est.

4. PSITTACUS erythrochlorus cristatus Aldrov. Alis erat, cauda, ac crista coloris rubri, cætera viridis. Crista referebat Psittacum cristatum; ex 6 pennis constabat, tribus majoribus, minoribus totidem. Oculorum iris rubra.

5. PSITTACUS parvus Bontii. Magnitudo Alaudæ; rostrum griseum, ut & guttur. Irides oculorum argenteæ. Verticis plumas egregias cristæ more erigit. Venter inferior, caput, collum, cauda superius pulchrè rubicant. Pectus & inferiores caudæ pennæ dilutè rosaceæ, quæ elegantissimè in viridem ex albedine & viridi mixtum desinunt. Alæ potissimum virides, rubicundis pennis intertextis, quarum medietas luteo & rosaceo colore hinc inde variegatur.

Psittaci minores Marcgr. Tui Brasiliensibus, PARRAKEETS.

1. PRIMÆ Magnitudo Hirundinis, color in totum viridis. Rostrum nigrum.

2. TUI APUTEJUBA. Priori par, color idem in pennis & rostro, differt circello ex pennis circa oculos luteo, macula in capite magna ex pennis Auræci coloris.

3. TUITIRICA. Majores sunt Guineensibus: color idem qui præcedenti. Rostrum coloris incarnati. Pedes cœrulescunt.

4. Quarta Sturni est magnitudine, ejusdem cum secunda coloris, sed cauda brevior.

5. JENDAYA, Merula magnitudine, rostro & cruribus nigris; iridibus oculorum aureis. Caput, collum & pectus flavum luteo intermixto. Dorsum, alæ & cauda viridis thalassinio mixto.

6. TUIETE. Magnitudo Alaudæ, cauda in totum dilutè viridis, initio tamen alarum egregiè cœruleo: oræ etiam pennarum omnium in alis cœruleæ; in dorso etiam
ad

ad exortum caudæ macula cœrulea. *Rostrum* incarnatum. *Cauda* præter normam hujus generis; ad secundum ergo genus potius pertinet.

7. *TUIPARA Tupinambis*, magnitudine *Alaudæ*, in totum dilutè viridis, ut præcedens, *rostro* pariter incarnato, *cruribus* griseis; *cauda* etiam brevior. Differt maculâ in fronte prope rostri exortum semilunari miniatâ; cujusmodi & inferiùs habetur in cujuslibet alæ medio, lutei seu uranici coloris. *Nidificant* in cumulis à *formicis* relictis qui in arboribus reperiuntur.

8. *A NACA Brasil*. Magnitudine *Alaudæ*, *Rostro* fusco: in vertice epatici coloris pennæ, circa oculos brunni: *Guttur* cinereum: *collum* superius & latera viridia: *Venter* ex brunno rufescit: *Dorsum* viride maculam habet dilutè brunnam; cujus coloris & *cauda* est. In alarum initio macula sive fimbria sanguinea est; reliquum alarum viride, extremitas thalassini coloris. *Crura* superiùs viridibus vestita pennis, inferiùs cute cinerea, unguibus nigricantibus.

9. *QUIIUBATUI*. Magnitudo *Tuiaparæ* par; flavus totus, verùm extremitas alarum obscurè viridis: *Rostrum* gryseum: *Crura* coloris incarnati.

Pleræque hujus generis Aves colore viridi sunt, caudâ etiam longissimâ unde sexta & septima species è *Marcgravianis* ad medium potius genus pertinent, non obstante magnitudine, ob caudarum brevitatem.

10. *Pfittaco* congener *ANI Brasiliensium* *Marcgrav. Avis* est *Turdela* magnitudine, totaliter nigra, pennis, rostro, oculis, pedibus. *Caudam* erectam gerit, 6 digitos longam. *Rostrum* altum. latum, digitum aut paulò plus longum: inferior pars directâ ferè, superior alta, lata, semilunaris figuræ & compressæ, ità ut acumen ferè superiùs habeat. *Crura* & *pedes* ut in *Pfittacis*. In *sylvis* frequens est.

Notandum autem *Pfittacos* ferè omnes *crura* breviora & exilia habere, contra quàm *Rapaces* pleræque *rapaces*.

Aves Rostris rectioribus minúsque hamatis maxima, singulares & sui generis, ob corporum molem & alarum brevitatem volandi impotes.

1. **STRUTHIO-CAMELUS** five *Struthio*. The OSTRICH. Avium omnium maximus est, si unum fortè *Emeu* excipias, quæ quamvis proceritate ei multum cedat, corporis tamen mole æqualis est. *Capite* parvo depresso & fere *Anserino*; *pede* bifido cameli instar; & pennarum forma quæ ex villis crispis & disjunctis constant, ab aliis omnibus avibus abunde distinguitur. *Ova* parit maxima, 15 interdum libras pendentia, quæ in arena condita Solis duntaxat calore foveri dicuntur.

2. *Struthio-camelus Americanus*, NHANDUGUACU *Brasiliensibus*, EMA *Lustanæ* Marcgrav. Aliquantò minores sunt *Africanis*, & *Emeu* seu *Casoari* similiores quàm *Struthioni*; quatuor enim in *pede digitos* habent, tres anteriùs, unum posteriùs, crassum, rotundum. *Caudam* non ut in illo cristis præditam; sed plumas gryseas per dorsum expansas ad anum usque. *Caput Anserinum* ut in *Struthione*.

3. EMEU seu EME *Aldrov. Clus. Nieremb.* *Emeu*, vulgo *Casoaris Bontii*. *Emeu*, quibusdam dictus *Casearius Wormii*, The CASSOWARY. Corona ei in medio capite cornea. *Caput* & collum nuda seu potiùs raris pilis obsita, *cutis* colore è cœruleo purpurascente, exceptâ solum inferiore postici colli parte miniacea. Anteriùs in ima colli parte lobuli duo carnei nudi ad pectus dependent. *Rictus oris* amplissimus. *Rostrum* 4 ferè digitos longum, crassitiè mediocris, rectum. *Crura* crassa valida, quàm *Struthionis* breviora. *Digit*i in pede tres, Antici omnes, nam postico caret. *Alarum* quædam rudimenta

dimenta obtinet, veriùs quàm alas, 5 tantùm scapis pen-
narum teretibus parvis, *Histricis* calamis similibus, pin-
nulis plumosis aut nullis, aut attritu derafis. *Cauda* nulla.
Corpus grande, *Struthionis* par, *plumis* fuscis seu nigri-
cantibus rarioris texturæ vestitum, quæ è longinquo in-
tuentibus pili potiùs quàm plumæ videntur. Avis facilè
mansuecit. *Indiæ Orientalis* incola est. Sub pectore
callum habet ut *Camelus*, cui inter quiescendum innititur
& incumbit.

3. *CYGNUS cucullatus* Nieremberg. *Gallus gallina-*
ceus peregrinus *Clus.* *Dronte* Bontii, *The Dodo*. In Insula
Batavis *Mauritii* dicta invenitur. Magnitudine est in-
ter *Struthionem* & *Gallum Indicum* media. *Capite* magno,
membrana quadam cucillum referente tecto: *oculis*
magnis nigris: *Rostro* prælongo valido ex cœruleo albi-
cante, exceptis extremitatibus, quarum inferior nigricat,
superior flavescit: *Rictu* parulo: *corpore* obeso rotundo,
quod mollibus plumis griseis *Struthionum* vestitur. Ab
utroque latere loco *Remigum*, exiguis alis plumatis,
ex flavo cinereis, & ponè uropygium loco caudæ quinis
pennulis crispis ejusdem coloris, decoratur. *Cruribus* est
flavescentibus crassis, sed admodum curtis; 4 *digitis* pe-
dis solidis longis quasi squamosis, totidem *unguibus* ni-
gris validis munitis incedit. Cæterùm tardigrada est
avis & stupida, quæque facilis præda sit venatoribus.
Hactenus *Bontius*.

Aves rostris rectioribus minùsque hamatis &
Primò *Majores*,

Rostris crassis, longiusculis rectioribus donatæ.

HÆ vel victu ex insectis & frugibus promiscuo u-
tuntur, nonnullæ etiam carnivoræ sunt & rapaces,
morticinis præcipuè & cadaveribus inhiantes; vel insectis

tantum vescuntur. *Ille* vel corpore sunt *unicolore* ferè (nam datur in his aliqua colorum diversitas quamvis non magni momenti) nigricante, nimirum *Corvinum genus* dictum à *Corvo* ave notissima, & ex *Europæis* maxima, hujus generis : vel corpore *vario* seu diversicolore, voce garrula quas *Picas* dicimus, à *Pica varia*, ave vulgarissima. *Hæ* [sci. *Insectivoræ*] unius omnes & ejusdem familiæ sunt, & *Pici* denominantur.

Notandum tamen quòd cum *Picos* omnes insectivoros tantum esse affirmamus, Aves propriè sic dictas intelligimus : sunt enim Aves nonnullæ, quas ad hoc genus (*Picorum* nomine latè sumpto pro Avibus omnibus quæ arbores pariter scandunt) retulimus, quæ frugibus quoque vescuntur : ut v. g. *Picus cinereus* dictus, *Picus murarius*, &c.

Pici autem genuini multis & insignibus notis ab aliis omnibus Avium generibus distinguuntur. 1. *Rostro* recto, duro, robusto, anguloso ad arbores perforandas accommodato. 2. *Lingua* longissimâ, terete, in spinam osseam acutam rigidam, utrinque dentatam desinente, ad vermiculos, coßos, formicas aliâque insecta lancinanda ; quàm longissimè exserere & retrahere possunt pro libitu, duarum cartilaginum & muscutorum ope, miro artificio. 3. *Cruribus* brevibus at admodum robustis, ad arbores scandendum, iisque fortiùs adhærendum, dum foramina terebrant. 4. *Digitis* in pedibus binis ante, totidem retro sitis, ad eundem usum. 5. *Caudâ* rigidâ & duriuscula, deorsum etiam inflexâ, ut ei innitantur & se inter scandendum sustentent, unde pennæ ejus extremæ persæpe fractæ & detritæ sunt. *Cauda* decem duntaxat pennis componitur, quod paucis præterea avibus convenit. 6. Appendicibus intestinorum seu intestinis cæcis carent, quod huic generi peculiare est, nec ulli præterea, quod novimus Avi convenit, è quadrupedibus soli *mustelino* seu *vermineo* generi ; quod cum *D. Willoughby* Ornithologiam ederem, nesciebam. 7. *Insectis* duntaxat vescuntur, quod antea adnotatum.

Ex his notis prima & quinta *Iyngi* avi vix conveniunt, quæ tamen ob reliquas notas communes his Avibus omnino annumeranda est.

Corvini

CORVINI generis Aves.

HUjus generis notæ sunt *Rostrium* magnum crassum, rectum aut modicè inflexum, *victus* ex carne, Insectis & frugibus promiscuus; nonnullæ etiam carnivoræ tantum sunt, morticinis præcipuè & cadaveribus vescentes, unde à nonnullis *Semirapaces* appellantur, ut *Corvus* & *Cornix*; aliæ frugivoræ ut *Cornix frugilega*.

A. 1. **CORVUS**, *The Raven*; Κόραξ. In hoc genere maxima est, colore undique nigro cum quodam splendore cœruleo. Hic agnos recens editos sæpissime dilaniat & devorat. Oculos autem eorum primum rostro appetit & eruit; quin & aves invadit, & à nonnullis ad aucupium instituitur. Avis admodum longæva esse creditur.

A. 2. **CORNIX**, *The common or Carrion-Crow*. Κορώνη. Hæc carnivora est, & morticinis plerunque vescitur, quorum tamen inopiâ etiam sata depopulatur. *Corvo* dimidio minor, aliàs ei perquam similis est.

A. 3. **CORNIX frugilega**, *The ROOK*: A *Cornice*, cui similis videtur, in multis differt, v. g. Magnitudine quâ illam superat; colore Rostri circa radicem albicante; quod indè evenit, quod rostro in terram profundius subinde detrufo ut vel radículas, vel insecta extrahat plumaginem circa radicem ejus nascentem deterrat & cutem denudet; pennarum splendore purpureo-cæruleo; quod gregaria sit, nec gregatim tantum volat sed & nidificet; quodque frugibus victitet.

A. 4. **CORNIX cinerea frugilega**, *The ROYSTON-CROW*. Caput, gula ad sternum usque & alæ nigræ, reliquum corpus cinereum. Nonnulli *The SEA-CROW*, i. e. *Cornicem marinam* eam appellant. In planitie circa *Royston* oppidum, *New-market*, & alibi in agro *Cantabrigiensi*, & in agro *Dunelmensi* circa *Tese* fluvii ostia fre-

40 SYNOPSIS METHODICA

quens est, hyeme potissimum. Ventriculum dissectum *Titico*, *bordeo*, aliisque *granis* refertum invenimus.

A. 5. *MONEDULA* five *Lupus* Aldrov. *The JACK-DAW* : *Κολιδος ἢ Λύκος*. *Cornice* minor est. Postica pars capitis ad medium usque colli cinerascit, *Pectus* quoque & *venter* cinerascunt nonnihil; reliquum corpus nigrum cum cœruleo splendore, sed caput summum intensius: *Caput* grandius est in hac ave, quod eam callidi & sagacis ingenii esse arguit.

A. 6. *CORACIAS*, *Pyrrhocorax* etiam dicta, quantumvis *Aldrovandus* repugnet, *The CORNISH-CHOUGH*. *Rostri* colore rubro non à præcedente tantum sed ab aliis hujus generis quibuscunque avibus satis distinguitur, ut alias notascharacteristicas, quamvis multæ suppetant, adjicere non sit opus. *Scopulos* & *clivos maritimos* præcipuè frequentat, non in *Cornubia* tantum sed etiam in *Wallia*. *Corvus sylvat. Gesn.* in omnibus præterquam magnitudine cum hoc convenit.

7. *CORVUS Indicus* Bontii. *Corvum* nostratē rostro refert; verum in temporibus similiter pictus est ut *Indica* istæ *Meleagrides* quas Belgæ *Kalcoutse hanen* vocant. *Capite* & *collo* nigricantibus plumis ornatè vestitus est: *Pedibus* & *unguibus* validis. Indole differt à nostris *Corvis*, quodd non cadavere, sed *nucibus Myristicis* potissimum vescatur, iisque insigne damnum inferat. *Caro* ejus delicata est.

8. *CORVUS Indicus cornutus* seu *RHINOCEROS avis* Bontii. *Rhinoceros avis* Aldrov. *Topau Worm. Mus.* Magnitudine longè superat *Corvum Europæum*, *Rostrium* respectu corporis mediocre: *Quod si verum sit, omnium certè avium longè maxima erit.*

Joan Nieubof: nomine *Fager-vogel* describitur. Verum cum *Belgicam linguam* non bene intelligam, *Lectorem* ad *Nieuboffi* librum amando.

Hujus *Avis* diversæ species esse videntur: nam tria hujus generis rostra vidimus, figurâ tantopere differentia, ut unius & ejusdem speciei *Avis* esse non potuerint; quorum icones in *Ornithologia D. Willughby* habentur, quod *Lectorem* refero, non enim sine longa verborum

rūm ambage, intellectu admodum difficili, describi possunt.

PICARUM *genus.*

A. 1. **PICA** *varia caudata*, seu simpliciter *Pica*. The MAGPYE or PIANET: *Kīsu* ou *kīsa*. Colore vario ex albo & nigro, *Cauda* forma singulari pennis mediis longissimis, reliquis ordine ad extremas usque sensim brevioribus; nido supernè undique spinis connecto, excepto duntaxat foramine ad latus, à congeneribus avibus differt.

A. 2. **PICA** *glandaria*, The JAY. Verticis plumæ variæ sunt ex albo & nigro; Color dorsi rufus cum aliqua cærulei tinctura. Insignis autem nota, quâ coloris respectu ab aliis differt, sunt pennulæ illæ ad alæ basin pulcherrimæ, lineis transversis cæruleis amœnis, albis, nigris variæ, quæ priores 15 remiges operiunt. Non *glandes* duntaxat vorat, sed & *fabas* recentes nedum plenè maturas, & *Cerasa*, quibus avidissimè inhiat.

3. **GARRULUS** *Argentoratensis* Aldrov. The ROLLER. Coloribus est pulcherrimis, Pectore & ventre ex cæruleo albicante; uropygio & minoribus Alæ tegetum ordinibus cæruleo amœno tinctis; *capite* ex cæruleo obscurè virente. Alarum remigibus & caudæ pennis ex cæruleo, nigro & albo variis. Notæ singulares in hac Ave sunt, 1. Tubercula seu verrucæ nudæ ad oculos. 2. Figura caudæ, cujus extremæ utrinque pennæ reliquis longiores sunt. 3. *Digiti* ad fundos divisi. 4. Quod lingua duas tantum habeat bifurcatas appendices.

Picam marinam Aldrovando Ornithol. lib. 12. cap. 16. descriptam à Roller Argentoratensi diversam non esse suspicamur, quamvis colores non conveniant: fortasse Aldrovandus ad intuitum iconis pictæ descriptionem suam concinnavit.

Cornix

42 SYNOPSIS METHODICA

Cornix cœrulea Gesn. nobis etiam eadem cum *Roller* avis esse videtur : nihil tamen affirmamus.

4. *PICA Persica* Aldrov. quam ex imaginis pictæ intuitu descripsit, cum notæ quas illius adfert nullius ferè momenti sint ; nimirum *Rostrum* albicans, *irides* oculorum albæ, *pedes* subcœrulei, *Alarum* pennæ secundi ordinis, *uropygium* & priores in cauda luteæ ; Quodnam avis genus sit me nescire fateor.

5. *CARYOCATACTES* Gesn. & Turn. Magnitudo inter *Merulam* & *Picam* variam ; *Rostrum* nigrum, validum, *Picorum* simile. *Corpus* totum tam pronum quàm supinum ex ruffo fuscum, maculis albis triangularibus, excepto capite, perbellè depictum. Inter oculos & rostrum albet ; infra anum etiam sub cauda pennæ sunt candidissimæ. *Vox* *Picis* caudatis similis.

Garruli Bohemici Aldrov. descriptionem vide infra inter *Aviculas* crassis & validis rostris, ad quarum genus potiùs quàm ad *Picarum* pertinere videtur.

6. *PICA caudata Indica*, seu *Japonensis* Aldrov. rostro & pedibus rubris, capite & collo cœruleo, pectore & ventre albo. quid ?

7. *Mimus* seu *Picus garrulus Indicus*. quid ? *Picæ glandariæ* non admodum dissimilis, sed multo minor, *D. Charle-*
ton.

PICI MARTII iisque affines.

I. **PICUS** *niger maximus*. The GREAT BLACK WOODPECKER. Magnitudine insigni, colore rotius nigro, vertice excepto qui usque ad nares, miniaceo pulcherrimo tingitur, à reliquis hujus generis abunde distinguitur.

A. 2. **PICUS** *viridis*, The green WOODSPITE or WOODPECKER, called also the HEYHOE and RAIN-FOUL. *Pluvie avis* Veteribus, Nostratibus *Rain-Fowl* eodem significatu dicitur, quòd voce sua clamosiore & solito

solito frequentiore pluviam prælagire creditur, *Heyboe* quasi *Hewhole* quomodo Septentrionalibus appellatur, id est foraminum dolator, *Δενδροκολάτης* Græcis, quia Rostro arborem perforat.

Hæc species magnitudine sua, quâ reliquas superat, & colore viridi faciliè innotescit.

3. *PICUS viridis major seu maximus* Bellon. Pico viridi vulgari longè major est. *Rostrium* ei tribuit incurvum præter aliorum morem: pedes tamen similes; varias denique maculas in alis, quales in aliis etiam conspiciuntur sed colore differentes.

A. 4. *PICUS varius major. The greater spotted Woodpecker or Witwall.* Niger est, maculis albis pulchrè depictus. In mare infra verticem ductus pulcherrimus miniaceus cernitur. Uterque sexus sub cauda colore phoeniceo seu miniaceo lucido tingitur. Magnitudine *Merulæ* par est, vel major. *Cossis* aliisque *Insectis* victitat.

A. 5. *PICUS varius minor, The lesser spotted Woodspite or HICKWALL.* Præcedenti figurâ & colore similis est, sed multò minor. Avis hæc vel rostro suo in rimam arboris inserto & celerrimè huc illuc agitato, vel creberrima percussione, sonum efficit crepitantem clarum, qui è longinquo exaudiri potest. His addit *Theophilus Moliator* apud *Joan. Fabrum Lynceum* exposit. in *Animalia Novæ Hispan. Nard. Anton. Recchi.*

6. *PICUM varium tertium*, omnium minimum, qui circulos habet in pennis per integrum corpus, quorum unus albus, alius niger est. Hic *Passere domestico* paulo est minor, carne *Rubeculam* fere æquat. *Pedes* habet parvos, sed *ungues* longos.

7. *Picus varius Brasiliensis IPECU* dictus *Maregr.* Magnitudine est *Columbæ*. Caput vestitur pennis cinnabarii coloris, in quo & cristam habet. Collum supra & infra nigrum, in utroque latere lineam habet albam ad dorsum protensam; *Alæ* superius nigræ, subtus albæ: *Cauda* nigra. In ventre & cruribus superioribus pennæ sunt nigræ & albæ. *Rostrium Picorum* simile, quo cortices arborum excindit.

A. 8. JYNX five *Torquilla*. The WRYNECK. A præcedentibus differt 1. *Rostro* tenuiore & infirmiore; neque enim, ut illi, in solido ligno foramen sibi excavar, sed in arboribus cavis & putridis nidificat. 2. *Cauda* molliore minúsque rigida. 3. Quod caput ridiculè contorquet & ad humeros circumagit, unde *Torquillæ* nomen; Coloribus variis & elegantibus perbellè pingitur, ut pulchra admodum sit avis. *Alaudam* magnitudine non superat.

9. PICUS *luteus cyanopus Persicus* Aldrov. l. 12. c. 35. Descriptionem vide loco citato.

A V E S quædam exoticæ Picis affines.

1. PICA *Brasilica* Aldrov. lib. 12. cap. 19, TUCANA five *Toucan*. *Brasilienfibus* Marcgr. *Xochitenacatl Mexicanis* Nieremberg. *Avis piperivora* nonnullis. Ob similem *digitorum* dispositionem, duobus ante, totidem retro sitis; quodque foramen sibi in arbore excaver, in quo nidificet; ad *Picorum*, non *Picarum*, ut vult *Aldrovandus*, genus referenda est. Magnitudine est inter *Picam* & *Merulam* media. *Rostro* reliquo corpore toto majore ab aliis omnibus nobis hætenus cognitis Avibus differt. Avis hujus generis à D. *Cassiano de Puteo* apud *Joan. Fabricum Lynceum* descripta ab *Aldrovandina* specie distincta videtur, ut descriptiones conferenti, puto, patebit.

2. ARACARI *Brasilienfibus* Marcgrav. *Cochitenacatl* item *Xochitenacatl altera* Hernandez. Nieremberg. *Rostrium* hujus minus est *Tucanæ* *rostro*, superiore *mandibula* in nonnullis tota alba, in aliis linea in summitate nigra secundum longitudinem distincta; inferiore nigra; aliàs ei persimilis est *Avis*. *Pennarum* colore *Picam* potius refert quam *Picum*.

3. JACAMACIRI *Brasilienfium* Marcgr. *Digitos* in quolibet pede duos anteriùs, duos posterius sitos habet, eorum exteriores duplo longiores interioribus *Picorum* in modum, unde non sine ratione avem hanc *Picis* annumeramus. *Rostro* etiam recto acuto nigro cum *Picis* convenit. Magnitudine est *Alaudæ*, alijs brevibus: supina parte

parte tota coloris viridis cum aureo & igneo mixti, ut mirificè splendeat : prona obscurè flava ; annulus viridis collum circumdat.

4. **CURUCUI** *Brasiliensibus* Marcgr. Ob similem digitorum dispositionem & hanc Picis subnectimus. Magnitudo Picæ ; *Rostrum* breve, latiusculum, sulphureum, *irides* oculorum aureæ : *Crura* brevia, ad pedes fere plumata. Totum *pectus* & *venter* infimus coloris sunt egregiè miniati : *dorsum* & *cauda* superius ex cœruleo & igneo splendidè virescunt : *caudæ* extrema ora nigra, subtus pennas habet albas nigro transversim eleganter striatas. *Alæ* variis coloribus, initio viridi, media parte canescente, ultima nigricante, distinctæ. Colorum respectu *Psittacis* quàm *Picis* similior est.

5. **GUIRA ACANGATARA** *Brasiliensium* Marcgr. Digitorum situ cum *Picis* exactè convenit ; & prope modum numero pennarum *caudæ*. Magnitudo Picæ variæ : *Rostrum* paulum aduncum, obscurè flavescens : *irides* oculorum fuscæ. Totum *caput* pennis vestitur, in medio secundum longitudinem proximè scapum fulcis, ad latera flavescitibus ut crista. *Collum* & *alæ* è contrario, pennas habent in medio flavescentes, ad latera fuscas. Totus *venter*, *dorsum* (exceptis alis) *crura* superiora & exortus alarum, ex albo pallidè flavescunt. *Cauda* & pennis constat. *Crura* inferiora coloris sunt thalassini.

6. **GUIRA TANGEIMA** *Brasiliensium* Marcgr. seu *Picus* nidum suspendens. Hæc Avis præ aliis hoc nomen meretur ; nullam enim novimus præter hanc quæ nidum propriè suspendat. Picæ variæ æqualis est, *capite* parvo, *rostro* recto, acuto, nigro, digitum longo : *Pedes* aliarum Avium pedibus digitorum situ respondent. *Caput* & colli inferior pars nigerrima, superior ad initium dorsi uranica. *Cauda* tota nigra ; *alæ* etiam nigerrimæ, verùm in medio secundum longitudinem maculam habent albam : reliquum corpus coloris uranici. *Crura* subcœrulea. *Nides* egregios extruunt hæ aves cylindraceæ figuræ, è virgultis perquam artificiosè contextis, eosque appendunt magno numero extremitatibus ramorum,

7. JUPUJUBA seu JAPU *Brasilienſium* Marcgr. Ejusdem figuræ eſt cum præcedente, & eodem modo nificans, caudâ paulûm breviori. *Corpus* totum nigerimis pennis veſtitum : in utriuſque alæ medio macula flava, digitum longa : in extremitate dorſi & prope anum tota eſt flava. *Cauda* inferiùs ab exortu ad mediam partem flava, reliqua nigra : ſuperiùs tota nigra, lateraliſbus duntaxat pennis flavis ad medium ulque. *Crura* nigra & pedes : *Roſtrum* ſulphurei coloris : oculorum *irides* ſapphyrinæ. *Nidus* ex arido gramine, pilis equinis aut ſuillis mixtis, componitur, coloris fuſci, figurâ cucurbitæ anguſtæ cum ſuo Alembico, &c. Nidi hi è ramulis minimis extremis arborum dependent. Hoc artificio ova & pullos ſuos à *Simiarum* rapina & injuriis ſecuros reddit.

8. PICUS *Indicus ex albo & nigro variegatus*, Muſ. Leyd.

9. PICUS *Indicus criſtatus variegatus*, Muſ. Leyd.

10. PICUS *Indicus barbatus horarius*, colore viridante, vulgò horarius vespertinus, *Pala Kothaia* Zeylanſibus circa veſperam indefinenter cantare incipiens. Muſ. Leyd.

11. Idem minor.

PICI minùs proprie dicti ſeu Picis affines.

1. PICUS *murarius*, Aldrov. lib. 12. cap. 37. *Sturni* ſeù crasſitie eſt. *Roſtro* oblongo, tenui, nigro : *capite*, collo, dorſo cinereis : *Pectore* albicante : *Alis* partim cinereis, partim rubeis. *Cauda*, quæ brevis, pennæ alarum longiores, dorſum inferius, venter & crura, quæ picorum more brevია ſunt, nigra. *Digiti* longi, tres ante, unus pro calce.

Picus murarius dicitur, quoniam ut Pici arboribus, ità hæc muris maximè adhæret, vermiculoſque in eorum rimis quærit. In foraminibus arborum nidulatur. In *Anglia* inveniri aiunt, quamvis nobis inibi nondum fuerit conſpecta,

2. JUNCO

2. JUNCO Aldrov. *Cinclus Turni*. The greater REED-SPARROW. Magnitudine *Turdo* non multum cedit; *rostro* grandi, *digitali*, fusco, nonnihil incurvo. *Os* intus croceum. *Gula*, *pectus*, *venter* alba, cum aliqua flavedine, præcipuè circa anum. *Supina* facies tota è fusco seu obliuere cinereo flavicat: supra oculos linea albicans. *Plumulae* remigum radices subtus tegentes flavæ. *Caudæ* pennæ rigidae ut in *Picis Martii*. *Crurum* robur in hac ave præcipuè notabile est. In *arundinetis* semper versatur, & suaviter cantillat: *Arundinibus* autem adhærescit, eodem modo quo *Picus martius* arborum ramis: quam præcipuè ob causam ad hoc genus eam retulimus.

A. 3. PASSER *arundinaceus minor*. An *Cannevarola* Aldrov? *Ficedula cannabina* Olinæ. *Ruticilla* æqualis est aut tantillo minor: in *Arundinetis* versatur, & perpetuo cantillat *arundinibus* insidens. Coloribus à præcedente non multum differt, nisi quod de viridi magis participet. *Rostrum* & pedes in hac avicula multo majores sunt quam pro corporis ratione. In *Belgio* frequens est inter *arundines*.

4. ATOTOTL five *Avis aquatilis* Hernand. Magnitudine est & forma *Passeris*, *rosto* nigro, *pedibus* fulvis, prona parte candida, *supina* fulvo albo, nigroque variâ. In *juncetis* & *carectis* versatur & prolem educat.

Forte *Passeri* nostrati torquato in *arundinetis* nidificanti inferius descriptæ eadem *Avis* fuerit.

Describitur secundò cap. 16. sub nomine *Atototloqui ebtl*. ubi pertinacis cantionis esse dicitur, ab exortu solis ad occasum garritu mures imitante.

A. 4. SITTA seu *Picus cinereus* Aldrov. The NUT-HATCH or NUTJOBBER. *Supina* pars corporis cinerea est, prona ruffa. Linea lata nigra à *rostro* per oculos ad collum ducitur; *Rostrum* rectum, triangulum validum. Non insectis tantum sed & nucibus vescitur quas mira dexteritate *rostro* pertundit & aperit. *Arbores* scandit *Picorum* more.

A. 5. CERTHIA, The CREEPER. *Arborum* truncis & ramis adhærescit & reptat *Picorum* more, Parvitate

te sua & rostellò arcuato ab aliis omnibus hujus generis avibus distinguitur. *Caudæ* pennæ longissimæ, acutæ, & rigidæ, ut in *Picis*. Supina pars corporis fulva est, prona albicat.

A. 6. UPUPA, *Ερως, The HOOP or HOOP OF. *Crista* in capite pulcherrima duplici pennularum ordine constans, à rostro ad extremum usque occipitium protensa, quam pro libitu arrigere & demittere potest, huic pro characteristica sufficere possit. Magnitudine ad *Vannellum* accedit. E stercore, potissimum humano, nidum construeretur *Aristoteles* è Veteribus, tum Recentiorum nonnulli tradunt. Numero pennarum caudæ denario, Appendicum intestinalium abentiâ, alarum transversis macularum ordinibus cum *Picis Martii* convenit; aliis notis ab iis satis differt. In *Northumbria*, inque agro *Sur-reiano* interdum invenitur. *Insectis* vescitur, an & uvis aliisque fructibus ut veteres nonnulli tradiderunt, nescimus.

Aves terrestres aquas frequentantes, rostris longis, piscivoræ.

A. 1. I SPIDA, an *Veterum Alcyon*. The KINGFISH-
ER. *Merula* minor est: *Rostro* 2. dig. longo, crasso, valido, recto, acuto, nigro: ore intus croceo. Coloribus est pulcherrimis, vertice ex nigro virescente cum maculis transversis cœruleis; dorso coloris pulcherrimi dilutè cœrulei splendentis. *Pectus*, venter imus, latera & subalares plumæ ruffæ. *Venter medius* ex ruffo albet. Inter nares & oculos, item ultra oculos maculæ ruffæ, seu ex albo rufescentes. *Cauda* sesquidigitalis tantum. *Tibiæ* perbreves. *Pedum* in hac ave structura singularis est; nam extimi digiti tria internodia medio adhærescunt, intimi unicum tantum: est autem intimus digitus minimus, & medio dimidio brevior: extimus medio ferè æqualis: posticus intimo paulò major. *Ventriculus* magnus & laxus

laxus ut in carnivoris, officulis & squamulis piscium plenus. In *riparum foraminibus* nidificat.

2. *Ispide affinis* JAGUACATI GUACU Marcgr. *Turdela* magnitudo, figura Pici majoris Rostrum *Ispide*, sed uncia longius: *circa* brevissima nigra. E *digitis* anterioribus exteriores duo breves quidem at tertius interior longè brevissimus & remotior. Supina pars tota coloris est ferruginei & splendentis, torque circa collum albo, prona pars alba. Propè utrumque oculum maculam etiam albam habet.

3. MEROPS five *Apiaster*. The BEE EATER. *Ispide* figurâ corporis similis est, magnitudine *Merula*, aut major, Rostrum *Ispide* simillimum. nisi quod deorsum paulò magis incurvetur. Pedum conformatio *Ispide* per omnia exactè similis. Color in *vertice* rufus, in *cervice* & scapulis viridis, cum aliqua rubri mixtura Ab angulis oris per oculos ultra aures ductus niger utrinque extenditur: Huic contiguus sub mento color flavus. Pectus & venter totus cæruleus. Cauda palmaris, cuius mediæ pennæ ultra reliquas longiùs procurrunt. Ventriculus membranofus potius quam masculofus, *Scarabeis* aliisque insectis refertus. *Apibus*, aliisque insectis victitat: ob exactam partium omnium tam internarum quam externarum cum *Ispide* similitudinem suspicamur eam pisces pariter prædari. In *Italia* invenitur: in *Creta* autem insula frequentissima est, teste *Bellonio*.

4. MEROPS alter seu *Meropi* congèner Aldrov. Corpore est superiore paulò longiore & crassiore; *rostro* ad falcem messorium propiùs accedente: Capite & prona parte ferè tota flavescente; *dorso* castaneo, prope uropygium tamen ex viridi & flavo permixto. Reliquam descriptionem apud *Aldrovandum* vide, qui ex icone picta eam descripsit. Rostrum figurâ & maculis nigris utrinque per oculos ductis cum *Merope* convenit.

5. *Ispide* seu *Meropi* affinis, GUIRA-GUAINUMBI *Brasiliensibus*, Tupinambis Marcgr. Deplumatae corpus non superat magnitudinem *Turdela*, quamvis pennis induta *Columbae* par videatur. Rostrum nigrum, 2 dig. longum, in utroque latere, supra & infra, serræ in modum

dum dentatum, *Cyura* brevia, nigra ; *Pedum* & digitorum conformatio *Ispida* responder. *Cauda* ab *Ispida* plurimum differt, est enim longissima, ejusque mediæ duæ pennæ ad duos digitos plumis carent, in extremitatibus autem rursus plumas habent ad duos digitos. Pennæ totius elegantissimæ sunt : nam in capite quasi mitram gerit ex pennis sapphirinis compositam, maculâ nigrâ in medio insignem. *Irides* oculorum flavæ : infra oculos macula nigra. Prona pars tota obscurè lutea, supina viridis seu graminei est coloris. In medio collo inferiùs quasi pro insigni gerit tres vel quatuor pennulas nigras & circum eas sapphirinas, quæ maculam quandam constituunt.

6. *ISPIDA Indica major* sive *Halcyon*, *Pilibunduwa* i. e. Pisces captans, *Mus. Leyd.*

7. *ISPIDA Indica minor* *Charleton Mus. Leyd.*

8. *ISPIDA Indica marcouros major* *Mus. Leyd.* eademque minor *ejusdem.*

9. *Ispida Mexicana*, *HOCOCANAUTLI* dicta *Hernand.* A nostrate *Ispida* non multum dissimilis est, nisi quod crista magna cyaneum colorem vergente insigniatur.

GALLINACEUM genus ; & primò domesticum & mansuetum.

HOC Avium genus insignibus notis ab aliis omnibus differt, Eæ sunt 1. *Rostrum* habere breve, validum & nonnihil incurvum, ad grana colligenda, quibus præcipuè victitat. 2. *Ventriculum* crassis musculis instructum, ad eadem calculorum quos deglutit ope comminuenda. 3. *Corpus* crassum & ponderosum, carne multa. 4. *Alas* breves & concavas, unde minimè altivolæ sunt & breves volatus faciunt. 5. *Intestina* cæca longissima. 6. *Carnem* albam, præcipuè musculorum pectoris, qui color à coctione se prodit manifestiùs : quæ nota huic generi peculiaris est. Hoc autem indicium est carnem earum saluberrimam

rimam esse & optimi succi. 6. Multiparum esse. 7. Humi nidificare, quia, sci. pulli recens exclusi non aluntur à matribus, sed densa lanugine vestiti, huc illuc curstantes matres sequuntur, cibum rostellis colligentes. 8. *Pulveratrix* esse.

A. 1. GALLUS GALLINACEUS & Gallina domestica, The DUNGHILL COCK & HEN. De his, quoniam aves domesticæ & notissimæ sunt, nihil attinet multa dicere. Insignes harum varietates à nostratibus aluntur, nimirum, 1. Cristâ in vertice plumosâ densissimâ & undequaque diffusâ spectabiles. 2. *Pumiliones*, cruribus brevissimis, *Creepers* nostratibus dictæ. 3. Caudâ seu Orrhopygio carentes, *Rumkins* Anglis, *Aldrovando* Persicæ dictæ. 4. *Crispæ*, nostratibus *Frislandicæ*, pennis reflexis caput versus, & velut inversis.

A. 2. PAVO, Græcis Ταῶς, The PEACOCK. Gemmantibus caudæ oculis spectabilis, & ab aliis quibuscunque avibus discretu facilis est. Apicem in capite habet, quem crinitæ arbusculæ constituunt, ut loquitur *Plinius*. Variat interdum colore albo.

A. 3. GALLO-PAVO seu *Avis Numidica* & *Meleagris* quibusdam, The TURKEY. Hic caudam in orbem expandit *Pavonis* in modum. Collum cum capite plumis nudum est, cute tantum rubra seu purpurascente obductum; *crista* seu caruncula rubra in vertice eminet, quam mas laxare & extendere seu demittere potest infra rostrum. Mas calcaribus caret, & setaceâ in summo pectore velut barbâ à fœmina distinguitur.

Neque hæc neque præcedens avis *Angliæ* aut etiam *Europæ* nativa, sed adventitia est, ex *India* aut *Africa* huc translata; verum cum domesticæ & cicures sint, atque etiam hyemes nostras facile tolerant, & à rusticis quæstus causâ passim aluntur, diuque est quod huc advectæ fuerint, non immeritò nostratibus accensentur.

3. GALLO PAVO *Sylvestris* Novæ Angliæ. A NEW-ENGLAND WILD TURKEY. Gallo-pavone vulgari nigrior est; à quo si non alia in re magnitudine saltem insigniter differt. Sunt enim (inquit *Josselinus* in *Rarioribus Novæ Angliæ*) qui 40, imò 60 libras pendent; qui n

se vidisse & epulatum esse *Gallopavonem*, qui deplumatus & exenteratus ad 30 libras pondere accederet.

4. MITU vel MUTU *Brasilienſum* Marcgr. *Tepe- tototl* Hernand. *Phasianorum* genere est, (inquit Marcgrav.) Hispani etiam pro *Phasiano* habent : nos potius à proprietate illa caudam in orbem expandendi, necnon magnitudine & colore, Pavoni & Meleagridi potius accensemus. Major est Gallinaceo ; pennis per totum corpus nigris, (excepto ventre & sub ano, ubi brunni coloris est) holosericum villosum nigrum in capite, collo & pectore provocantibus. In summo capite pennas habet nigras complicatas in planissimam quasi mitellam, ut nesciens vix possit agnoscere, quas irascens aut etiam alias pro libitu in cristam erigit. *Rostrum* ut in hoc genere incurvum, sesquidigitale, coloris egregiè incarnati, versùs apicem tamen albicat. Libenter in alto sedet, ut *Gallopavones*, scanditque arbores, ut illi : est autem mite & hominibus amicum animal.

5. PAUXI Nierembergii. *Gallina Indica* Aldrov. *Mitu* varietas. Hæc Avis non alia fere in re à *Mitu* Marcgrav. differt, quàm tuberculo illo cyaneo Pyriformi ad Rostrum initium seu radicem. Q. An specie, an sexu solum à præcedenti differat?

6. MITUPORANGA Marcgr. *Gallus alius Indicus* Aldrov. lib. 14. cap. 10. Rostrum minus altum, minusque lunatum quàm in *Mitu* ; ejus extremitas nigra, reliquum totum cute crocea vestitum, qualem & circa oculos habet. Collum & caput nigerrimas habent plumas, instar holoserici splendentes ; & in summitate capitis cristatæ & cochleatim tortas habet pennas usque ad initium colli : has erigere in cristam crispam potest. Reliquum corpus nigrum cui aliquid viridis intermiscetur. Circa anum albas habet pennas : Crura cinerea.

7. *Gallus Indicus alius* Aldrov. tuberculum cerasiforme habet in superiore rostri mandibula ; quo ab hac Ave differt.

8. GALLUS & GALLINA *Guineensis*. The GUINNY HEN or PINTADO. Galline vulgari domesticæ magnitudine par est ; collo tamen longiore & tenuiore figurâ

gura corporis ferè ut *Perdix*. Colore est è cinereo nigricante, maculis albis undique vario. Collum *terquis* niger ambit : caput rubescit. Medio vertici cornu durum è fusco ruffum innascitur. Maxillæ sub oculis cœruleæ implumes, sub quibus appendices rubræ. *Parisienses* observant appendices has seu palearia superiori maxillæ innasci, non inferiori, ut in Gallinis ; & fœminis rubras esse, maribus cœruleas, quo sexus possunt distingui.

Gregarias esse aiunt has aves & pullos communiter alere, etiam non suos. *Meleagrides* Veterum fuisse argumentis non invalidis probant *Parisienses*.

9. *Gallina Sylvestris* MACUCAGUA Brasiliensibus *Maregr.* Magnitudo Gallinæ nostratis ; Rostrum nigrum : Corpus crassum : Cauda nulla. Calcaneus rotundus ut in *Struthione* : Ungues obtusi, grisei. Totum caput & collum punctulatum est obscure flavo & nigro ; sub gutture albicat. *Pectus*, venter & dorsum obscure cinerea. Alæ umbræ coloris per totum, undatæ nigro, præter Remiges pennas quæ totaliter nigræ. Pedes cœrulei. Carnosa admodum est avis. Humi currit, nam pedes inepti sunt ad scandendum arbores.

Gallinaceum genus SYLVESTRE majus,
phytivorum & baccivorum, superciliis rubris
aut coccineis.

A. 1. UROGALLUS seu *Tetrao major* Aldrov,
The Cock of the Wood, or Mountain. Magnitudine ad Gallo-pavonem accedit. Anglia hunc non alit. in Hibernia inveniri dicitur.

A. 2. TETRAO seu *Urogallus minor*, *The HEATH-COCK* or *BLACK GAME* or *GROUS* called by *Turner* the *MOREHEN*. In Septentrionali Angliæ, parte mas *The BLACK COCK*, fœmina *The GREY HEN*, fœtura sive Pullities *The GREY GAME* dicitur. In hoc genere mas rotus niger est, fœmina *Scolopacis* aut *Perdici* colore. Magnitudine Gallinæ non multum cedit. In lateribus
E 3 monti.

54 SYNOPSIS METHODICA

um altiorum frequens est; quin & in plana descendit, inque Ericetis humilioribus invenitur.

A. 3. *LAGOPUS* altera Plinii, *Attageni* Aldrov. seu *Francolino* Italarum similis si non eadem. The RED GAME. Mas *The Gor-cock* & *Moor-cock*, foemina *the Moor-ben*, pullorum agmen *Gor-foul* dicitur & *Peuts*. Hæc nomina in Boreali præcipuè *Angliæ* parte obtinent. Perdix dimidio ferè major est, nec colore multum diversa à *Scolopace*, rubicundior. Summa altissimorum montium juga amat, nec in planities descendit, imò rariùs in latera montium. In *Septentrionalibus* montibus frequens est: invenitur & in *Cambria*.

Cum Clariss. vir *Conradus Gesnerus*, quem *Aldrovandus* etiam sequitur, in nullo Animalium genere foeminam mari colorum varietate & pulchritudine antecire crediderit, præsumpta hac opinione deceptus in utroque *Urogallo* seu *Tetraone*, majore scilicet & minore, diversum sexum pro diversa specie habuit, adeoque ex duabus speciebus quatuor fecit: nimirum ex

- | | |
|---------------------------|---|
| | $\left\{ \begin{array}{l} \text{Mare-----1. } \textit{Urogallum} \text{ majorem.} \\ \text{Foemina----2. } \textit{Grygallum} \text{ majorem.} \end{array} \right.$ |
| 1. <i>Urogallo</i> majore | |
| | $\left\{ \begin{array}{l} \text{Mare-----3. } \textit{Urogallum} \text{ minorem.} \\ \text{Foemina---4. } \textit{Grygallum} \text{ minorem.} \end{array} \right.$ |
| 2. <i>Urogallo</i> minore | |

4. *ATTAGEN* Aldrov. *Francolino* Italarum. Magnitudine & toto habitu ad *Phasianum* accedit Aldrov. Olinia figura & proportionem corporis *Perdicem* cineream referre ait, magnitudine nonnihil superare. Avem hanc præcedenti speciei eandem esse suspicor: obstat locus; nam *Aldrovandus* *Attagenem* suam in *Siciliæ* regionis calidæ montibus satis abundè reperiri asserit: cum nostra juga montium altissimorum Regionum *Septentrionalium* incolat. Verùm responderi potest, montis *Ætnæ* in *Sicilia* partes superiores prope verticem nihilo calidiores sunt nostratibus montibus, cum nivem diutius retineant. Quod

Quodd sicaput *Francolino* cristatum fit ut *Aldrovandus* eum describit, & *pedes* nudi, prout eum depingit tum *Aldrovandus* tum etiam *Olinz*; nostra *Avis* esse non potest, cui *pedes* ad *ungues* usque *plumosi* sunt. Vide *Ornithologiam* D. Willughby.

5. LAGOPUS *avis* Aldrov. *Rhoetis Rabolane* dicta. *Perdix alba* Sabaudis. Color totius, (exceptâ caudâ quæ nigricat, mediis tamen pennis albis) niveus: *Supercilia* rubra: *Pedes* ad *ungues* usque *plumosi* unde *Lagopi* nomen. Adeo per omnia, excepto colore, cum *tertia specie* convenit ut an *specie* ab ea differt an *accidentibus* duntaxat quibusdam merito quis dubitet. *Bellonius* eandem existimat. *Itali* etiam utrumque genus *Francolin* vocant.

Lagopodem alteram *Gesneri* à præcedente specie minimè differre existimo, cum præter *notas* & *maculas* quasdam in *capite* & *reliqua parte* *supina* omnia conveniant.

6. GALLINA *corylorum* Germanis *Hazlehen*. *Gesnero Artagen*. Ad *Gallinæ* magnitudinem accedit. *Tibiæ* ex *anteriori parte* ad *medium tantum*, ex *posteriore* ad *articulos* usque *nudæ* *Digit*i *exteriores* *marginibus* *ferratis* utrinque *extantibus* donatur. *Venter* totus *albet*, *maculis* *nigris* *medium* *plumarum*, nunc unâ in *singulis*, nunc *duabus tribusve areolis* *transversis*, occupantibus. *Mentum* in *marè* *aterrimum*, *linea* *alba* *nigrorem* *cingente*. *Caput*, *dorsum*, *uropygium* *cinerea*, *colore* *Perdicis æmulo*. *Alæ* *ruffo*, *albo* & *nigro coloribus* *variæ*. *Norimbergæ* in *foro* *venales* vidimus.

Hoc genus *Aves* omnes, *Urogalli*, *Tetraones*. *Lagopi* &c. per *æstatem* *baccis* *Vitis Idææ*, *Ericæ*, *Rubi* &c. vescuntur, per *hyemem* *verò* *summitatibus* *Ericæ*, *Abietis*, *aliarumque* *semper virentium stirpium*, ut earum *ventriculos* *difsecando* *invenimus*. Ast *Gallinæ Corylorum* cum *sylvas* etiam non *montosas* *frequentent*, alio *fortè* *viçtus* *genere* *utuntur*, & *Julos* seu *nucamenta corylorum* *esitant*, ut *Albertus* *affirmat*, & unde *nomen* etiam *sumpsisse* *videntur*.

7. PERDIX *Damascena* Bellonii, quam *Aldrovandus* *Lagopodem* alteram *Plinii* existimat. *Perdicibus* *cinereis*

minores sunt, *Dorsi* & colli colore *Rusticulam* æmulantur: *Alæ* quæ corpori junguntur albis, fuscis & fulvis pennis integuntur: Decem verò remiges pennæ cinereæ sunt. *Alarum* pars interior & venter albert. *Torquem* habet in pectore rubro & fulvo flavoque coloribus constantem: *Crura* pennis vestita ut *Lagopus*. An supercilia rubra nuda habeat necne non dicit?

Gallinaceum genus sylvestre minus, superciliis nec nudis, neque rubentibus.

A.1. **PHASIANUS**, *The Pheasant*. Gallinâ paulò minor est, pulcherrimis coloribus. *Caudæ* longitudine & figurâ ab aliis omnibus hujus generis faciliè discernitur, pennæ enim mediæ longissimæ, reliquæ hinc indè ordine breviores ad extimas usque. In mare color ruber seu coccineus *oculos* latè circumquaque cingit. In sylvis degit.

2. **PHASIANUS** *Brasiliensis Jacupema dictus* Marcgr. *Coxolitti* Hern *Gallina* domestica paulò minor est. *Cauda* pedem longa & lata; *Crura* longa. *Plumis* tota *Avis* vestitur nigris, quibus brunni aliquid admixtum. *Capitis* plumas in cristam erigere potest; cingunturque illæ nigræ plumæ aliis albis in ambitu. *Guttur* sub capite & ad sesquidigiti longitudinem in collo nudum est, & rubra cute tectum. *Prona* pars corporis & alarum medietas posterior, plumulis albis & nigris varia. *Superiora* crura & cauda nigra. *Pedes* eleganter rubri. A clamore *Jacu Jacu*, nomen habet.

In *Historia Natur. Insularum Antillarum D. Du Tertre*, avem quandam invenio Phasiani nomine descriptam, in hunc sensum. Pulcherrima est *Avis*, magnitudine *Caponis*, verùm cruribus longioribus elata velut *Pavo*; collo multò quàm *Gallus gallinaceus* longiore. *Rostrum* & *caput* ad *Corvi* accedunt. *Collum* & *pectus* coloris sunt cœrulei splendentis, nec minùs pulchri quàm *Pavonis*. *Dorsum* totum è griseo brunneum. *Alæ* & *cauda* (quæ satis brevis est) nigra.

Cum

Cum cicuratur hæc Avis aliarum Domesticarum se facile Dominum reddit, tum *Gallos Indicos* tum vulgares *Gallos & Gallinas* involans, & Rostri ictibus abigens, interdum etiam trucidans.

Vox seu clamor hujus Avis, nimirum *Caracara*, suspicionem mihi injicit, non aliam eam esse quam *Avem illam* rapacem hoc nomine *Marcgravia* descriptam, cum & hæc fera ac rapax esse videatur aves Domesticas invadens & occidens.

COXOLITLI *Hernand.* magnitudine *Gallo-pavonis*, colore fulvo, à *Jacupema* differt: eadem tamen specie avis esse nobis videtur.

1. *OCCOCOLIN* seu *Perdix montana* *Hernand.* Nostrate major est, rostro & pedibus è rubro candescentibus, totius corporis colore fusco, pallente & fulvo; alis infernè cinereis, supernè pullis, albis & fulvis maculis distinctis, ut & capite & collo.

A. 2. *PERDIX cinerea* *Aldrov.* *The Common Partridge.* *Columbâ* paulo major est, colore ex cinereo ruffo flavescente, maculis ruffis seu rubris transversis in lateribus, caudâ brevi. *Formicis* earumque ovis seu potius aureliis victitat cùmque adolevit granis tritici & aliarum frugum.

3. *PERDIX Damascena* *Aldrov.* Præcedente multò minor est, rostroque prolixiore, alioquin ei persimilis.

4. *Perdix Brasiliiana* *JAMBU dicta* *Pison.* Harum in sylvis litoralibus duæ habentur species; hæ nostratibus minores, illæ pares; utræque pennis per totum corpus obscurè fulvis, verùm fusco mixtis atque maculatis vestitæ.

A. 5. *PERDIX ruffa* *Aldrov.* *Italis & Græcis Coturnice* seu *Coturno.* *Perdix Græca* seu *ruffa* major *Bellonii*, *Caput*, collum, dorsum, uropygium cinerea. *Maxillæ* sub oculis, & mentum ad medium usque gulæ album; in ipso tamen mandibulæ inferioris angulo macula exigua nigra cernitur; Album hoc spatium torquis niger, à naribus inchoatus, & supra oculos productus cingit: ingluviei regio cinerea: *Pectus* inferiùs dilutè è flavo ruffum. *Pedes* rubri. Hæc species *Angliæ* ignota

ignota & peregrina est: aiunt tamen eam in insulis *Fersey* & *Guernsey* Reginae nostrae subjectis inveniri Ingenii mansuetioris est quam cinerea & facile cicuratur. *Perdix* Graeca seu ruffa *Bellonii* magnitudine saltem insigniter differt à *Perdice* ruffa in *Italia* & *Gallia* vulgari, siquidem *Bellonius* cinereae duplam esse scribat: cum ruffa vulgaris cinereae nè sesquialtera quidem sit.

A. 6. COTURNIX, *The QUAIL*. Figurâ corporis atque etiam colore non multum differt à *Perdice*, verum duplo propemodum minor est, cauda perbrevis: *Frumento* vescitur; estque avis migratoria.

7. COTURNIX *Indica* Bontii. Cicuratur *Gallinarum* in modum: *Mares* quoque non secus ac *Galli* pugnacissimi sunt. Colore plumarum *Coturnici* admodum respondet, verum rostrum est paulò longiore: sonum quoque per intervalla edit, ut *coturnices* solent, verum longè diversum à *Coturnicum* voce, & ad *Ardeae stellaris* mugitum accedentem. Frigidæ admodum naturæ est. *Columbae* aut *Turturis* magnitudinem non excedit.

A. 8. ORTYGOMETRA *Aldrov.* An *Rallus terrestris*? *Crex Aristotelis* ex vocis similitudine, *The DAKERHEN*, or *RAIL*. Corpore est ad latera compresso, & *Gallinularum* simili: cruribus etiam longis & supra tibiis nudis, cauda brevi, rostro longiusculo, quibus omnibus notis cum aquaticis avibus convenit. Color testaceus, & *Coturnici* perquam similis, unde nomen.

In *Anglia* rarior est; *Turnerus* nusquam nisi in *Northumbria* vidit & audivit: At *D. Tancr. Robinsonus* se in *Eboracensis* provinciae tractu Septentrionali *Rallus* terrestres sæpius cepisse nobis retulit. In *Hibernia* frequens habetur.

Gallinaceum genus digito postico carens.

A. 1. OTIS seu *Tarda* avis *Aldrov.* *The BUSTARD*. Magnitudine eximia *Gallo-pavonis* æmula, quodque tridactyla sit digito postico carens, tardi etiam volatûs & à terra difficulter se levans, ab aliis omnibus
hujus

hujus generis Avibus abundè distinguitur. *Caput* & *collum cinereum, venter albet* ; *Dorsum* lineis transversis nigris & rufis varium. In campis spatiosis circa *Novum Mercatum* & *Roxton* oppida in agro *Cantabrigiensi*, inque planitie, ut audio, *Salisburiensi*, & alibi in vastis & apertis locis invenitur.

2. *ANAS campestris, Canne petiere Gallorum, seu Tetrax Bellonii Aldrov.* Ornithol. lib. 13. c. 13. Eadem videtur *Stellæ Avi Aldrovand.* *Tardæ* persimilis est, sed duplo minor. *Mutinæ* Italiæ in foro venalem vidimus & descripsimus. Qui plura de hac Ave velit *Bellonium* & *Aldrovandum* consulat.

C O L U M B I N U M *genus.*

COLUMBINI generis Avium Notæ communes sunt, *Figura corporis* peculiaris, *Cuculum* referens ; *Tibiæ* brevès *Alæ*, prælongæ ; volatus pernix ; *Rostrum* rectum, angustum, longiusculum ; *Vox* gemebunda ; bina duntaxat ova una vice ponere, sed sæpius in anno parere ; cibum pullis ex ingluvie sua in os eructare, quod optima ratione à Natura provisum est : ut sci. in ingluvie maceratus & emollitus, (victus enim *Columbis* è granis leguminum & seminibus durioribus est) à pullorum ventriculis faciliùs subigatur & digeratur. Quin & pedes Columbarum omnium, quotquot hætenus observavimus rubri sunt. *Picuipinimæ* tantùm *Brasiliensi* pedes albescunt. *Marcgr.* In *Columbino* genere mas & fæmina laborem incubandi inter se partiuntur.

A. 1. *COLUMBA domestica* seu vulgaris, *Πεστεγέ.* *The COMMON PIGEON, or DOVE, by some called Culvers.* Color plerunque cœruleus aut cinereo-cœruleus, cum purpureo aut rubente in collo splendore, qui pro diverso ad lucem objectu variat. *Dorsum* inferius supra uropygium album. *Cauda* oblonga, nec ramen ultra alas multùm protenditur. Pondus libræ.

Columbarum domesticarum variæ species apud nos in *Angliâ* aluntur.

Domestice

60 SYNOPSIS METHODICA

1. *Domestica majores*, Italis *Tronfi* & *Asturnellati*, nostratibus *RUNTS*. Coloribus non minùs variant quàm domesticæ vulgares. Magnitudine etiam differunt. Sunt enim *majores* Gallinis ferè pares, tardioris volatûs; & *minores*, agiliores magisque volaticæ.

2. *Gutturæ*, Anglis & Belgis *CROPPERS* dictæ, quia ingluviem aëre attracto mirum in modum inflant, ut toto reliquo corpore major evadat.

3. *Tremule laticaudæ*, *BROAD-TAIL'D SHAKERS*, sic dictæ quòd caput & collum ultro citroque perpetuò ferè motitent; & à caudæ pennarum numero quæ non pauciores 26 esse dicuntur. Caudam plerunque cum obambulant erectam tenent *Gallinarum* instar.

4. *Tremule angusticaudæ* seu *acuticaudæ*, *Narrow-tail'd SHAKERS*.

5. *Columbæ tabellariæ*. *CARRIERS*. Columbibus vulgaribus pares sunt aut minores, colore obscurè cœruleo aut nigricante. *Oculi* Accipitrini, circulo laro cutis nudæ, tuberosæ, fursuracæ, albidæ ambiuntur: superior etiam *Rostri* mandibula ejusmodi cutis fungosæ duplici area seu crusta oblonga à capite ultra medium extensa obducitur, Harum usus est ad literas ultro citroque transmittendas.

6. *Cucullatæ* seu *Jacobæ*, Anglis *JACOBINES*, Belgis *Cappers*, quia in occipite seu summa cervicis parte pennulæ fursum reflexæ occiput cingunt, *cuculli Monachalis* in modum. *Rostrum* his breve, oculorum *irides* colore margaritarum.

7. *Turbitæ* dictæ, *TURBITS*, cujus nominis rationem nescio. *Rostrum* his brevissimum, crassum velut *Rubicillæ*, vertex planus, pennæ in pectore utrinque reflexæ.

8. *Barbaricæ* seu *Numidicæ*, *BARBARY PIGEONS*. *Rostrum* præcedentis simile. *Oculos* cutis nudæ tuberosæ fursuracæ circulus latus ambit ut in *Tabellariis*.

9. *Percussores*, *SMITERS*. Hæ inter volandum tam fortiter alas quatunt, ut duorum asserum simul collisionis sonitum superent.

10. *Gyratrices* seu *Vertagi* TUMBLERS. Parvæ sunt, variorum colorum; inter volandum miros motus in aëre exhibent, retrorsum in caput se circumvolvendo, globi aut pilæ projectæ speciem exhibentes.

11. *Galeata*, HELMETS. His *Caput*, cauda, & Alarum remiges coloris à reliquo corpore diversi semper sunt.

12. *Equites* LIGHT HORSEMEN. Spurium genus sunt altero parente *gutturoso*, altero *tabellario*, adeoque participant de utroque, ut patet ex *rostri* tuberibus & gutture inflato.

13. BASTARD-BILS *Anglis* dictæ, id est, *Rostri* spurii præditæ. *Numidicis* majores sunt, *rostro* brevi, *oculis* rubris.

14. TURNERS *Anglis*, *Cirro* à vertice retro dependente, & bifariam jubæ equinæ in modum diviso insignes.

15. FINNIKINS præcedentibus similes, sed minores.

16. MAWMETS quasi *Mahometanæ*, oculis grandibus nigris notabiles, aliàs *Numidicis* similes.

17. SPOTS, quod in *fronte* supra rostrum maculam habent, cui & cauda concolor; à corpore alis albæ.

A. 2. TURTUR, Græcis *Τευγών*, The TURTLE-DOVE. Magnitudine minor est præcedente, colore non multum dissimilis. *Gula* vinaceo colore pulchro tingitur. *Colli* latera perbellè illustrent, ceu torquis quidam, pulcherrimæ plumulæ, apicibus albæ, cætera nigræ.

3. TURTUR *Indicus* Aldrov. lib. 15. c. 9. *Fæmina*, exceptis pedibus, qui rubri sunt; & *rostro*, quod nigricat, tota candida est. *Mas* verò dilutè rufescit. Magnitudo nostrati eadem, vox eadem. *Iris* oculi crocea seu miniacea. *Torquis* tenuis & nigra est & collum circumcirca ambit.

4. *Turtur Indicus* seu COCOTZIN *Hernand.* *Nieremberg.* *Passere* nostro paulò major est. Universum corpus supernè fuscum, plumas tamen singulas nigro ambiente colore. *Alarum* anteriora partim nigra sunt, sed majori ex parte fulvescunt: *cauda* extrema albo & fusco.

62 SYNOPSIS METHODICA

fulco promiscuè colore tingitur. Plumæ quæ infernū corpus vestiunt albæ sunt ; sed in lineas desinentes atras. *Caput* parvum : *rostrum* nigrum. *Cocotli* etiam *Hernand.* huic eadem est.

5. *TURTUR Barbadosis minimus.* *Alaudæ* est magnitudine, & vel eadem præcedenti, vel ei certè simillima, avis. Quin & descriptio *Columbæ sylvestris minimæ Brasiliensis* huic per omnia ferè convenit : ut has tres unam & eandem avem esse suspicer.

6. *Columba sylvestris minima Brasiliensis, PICUIPI-NIMA* *Marcgrav.* *Alaudâ* paulò major est ; *rostrò Columbino* fulco ; *iridibus* oculorum aureis. Totius superficiei supinæ pennæ obscurè cinereæ seu lividæ, oris nigricantibus lunatis. *Remiges alarum* inter volandum ruffæ videntur. *Cauda* è cinereo fusca : *Ventris* pennæ albæ oris lunatis fuscis. *Pedes* albescunt præter normam aliarum.

7. *COLUMBA sylvest.* ex insula *S. Thomæ* *Marcgr.* Magnitudine est & figura nostratium, sed *rostrò* superius adunco, coloris in medietate anteriori tota cœrulei cum albo paucò & flavo mixti, in posteriore sanguinei. *Iris* oculorum cœrulea. *Pennis* tegitur per totum corpus viridibus ut *Psittacus* quidam. *Remiges alarum* è viridi fuscescunt, ut & extremitas caudæ. Sub ano & cauda flavas habet pennas. *Crura* & *pedes* eleganter crocei.

8. *Columba LIVIA* *Gesn. Aristoteli Πελαγός.* *Columbæ* domesticæ specie persimilis est, paulò minor. Plumæ ubique cinereæ, sed in extrema cauda nigrescunt. Reliquam descriptionem apud *Autorem* vide. Parvitate suâ à *Vinagine* præcipuè differre videtur. Qu. Annon eadem sit cum *Columba* nostra rupicola ?

A. 9. *PALUMBUS torquatus, The RING-DOVE, or QUEEST, Φαωά* *Aristoteli* aliisque *Græcis.* Septentrionalibus Anglis *Cushat.* Magnitudine sua, & maculis ad latera colli utrinque albis, ceu torque, à *Columba* vulgari aliisque speciebus differt. *Sylvas* frequentat, & in arboribus nidificat.

A. 10. *OENAS* five *Vinago, The Stock-Dove or Wood-pigeon. Οινάς, Πελαγός.* Magnitudine *Columbæ* vulgari

par aut major, figurâ corporis similis, nec colore multum differt. *Collum* versicoloribus plumis vestitur, quæ prout variè luci obijciuntur, vel purpurâ vel virore splendidissimo nitent, ut nullum sericum æquê. *Pectus* anterius & alæ purpurascente aut vinaceo colore diluuntur, unde & nomen. In utraque *alâ* duplex habetur macula nigra.

A. II. COLUMBA *rupicola*, The ROCK-PIGEON Corpore est exiguo, colore cinereo. In *rupibus maritimis* frequens.

12. COLUMBA *Mexicana* HOILOTL dicta Hernand. Venter & pectus dilutè fulva; supina omnia fusca ac maculis conspersa nigris. *Alarum* & *caudæ* inferior superficies cinerea.

13. *Columba Mexicanæ montanæ maximæ*; domesticis pares sunt, colore subpurpureo, candidis humeris, coccineo *rostrò* & *pedibus*. Hæc etiam *Hoilotl* appellatur.

14. *Ceboilotl*, *Columba sylvestris pennis fuscis* præter eas quæ *pectus* & extremas alas tegunt candidas & pallentes: *irides oculorum* coccineæ.

15. *Tlacahoilotl*, *Columbæ sylv. species*, *Arabicis* dictis quadantenus similis, *rostrò* incurvo, mediocri, rubeoque; prona corporis & alarum parte rubea, supina cœrulea.

16. *Columba minor Jamaycensis*, ventre candido D. Sloane. The *White-bellied Dove*. Hujus descriptionem vide in *Appendice*.

17. *Columba cauda fascia notata*. D. Sloane. The RING-TAIL PIGEON. Hujus etiam descriptionem in *Appendice* dabimus.

18. *Columba minor capite albo*. The *Bald-pate*, D. Sloane. Nobis in *Appendice* describetur.

TURDINUM *genus.*

NOTÆ hujus generis Avium sunt, *Magnitudo* inter *Columbas* & *Alaudas* media, *Rostrum* longitudinis & crassitie mediocris, deorsum modicè inflexum, *Os* intus flavum, *Cauda* longa, *Vitus* è baccis & insectis promiscuus. Hujus autem generis tres species sunt seu genera subalterna; *Turdi*, *Merulæ*, *Sturni*.

A. 1. *TURDUS visciivorus major*, *The MISSEL-BIRD* or *SHRITE*. Pectore est maculoso ut reliqui *Turdi*, maculis majoribus. *Turdu* *visciivorum* minorem, quocum coloribus convenit, multùm superat. Carne minùs est delicata quàm hujus generis reliquæ. Hyberno tempore *Agrifolii* baccis vescitur.

A. 2. *TURDUS visciivorus minor*, seu simpliciter dictus, *Κίχλη*. *The MAVIS*, *THROSTLE*, or *SONG-THRUSH*. Præcedenti similis est, sed minor. Carne inter aves, *Martiale* judice, laudatissima. Nidum interiùs oblinat, inque nudo luto ova ponit. Vere egregiè cantat arboribus infidens.

A. 3. *TURDUS pilaris*. *The FIELDFARE* or *FELDEFARE*. Avis est migratoria & hyeme ad nos advolat, præcedente aliquanto major, capite, collo, uropygio cinerea, dorso obscurè ruffa. A rostro ad oculos macula utrinque nigra extenditur. Caro in cibis commendatur. Gregatim volat.

A. 4. *TURDUS Iliacus*, five *Illas* aut *Tylas*, *The RED-WING*, *SWINE PIPE* or *WIND-THRUSH*. *Turdo* simpliciter dicto magnitudine par, & per omnia ferè similis est; pectore duntaxat minùs maculoso, & alis subrus rubro mali *Aurantii* colore infectis, ab eo differt. Hæc etiam avis est migratoria & gregaria, & unà cum *Turdo pilari* huc commeat.

5. *Turdus Americanus* minor canorus, ex cinereo albus, non maculatus *The AMERICAN SONG-THRUSH*, *MOCK-BIRD* or *NIGHTINGALE*, *Cen*

contlatolli, i. e. *Quadringentæ* linguæ, five *Avis* polyglotta *Hernandez*. *Nieremberg*. Descriptionem vide in *Appendice*. Non facile cicurari aut in caveis incarcerari se permittit. Per totam fere *Americam* invenitur. In *Jamayca* insula observavit & descripsit eruditissimus *Amicus noster* D. Sloane.

6. *TAMATIA Brasiliensis* *Marcgr*. *Alaudæ* est magnitudine, rota punctis lata maculis nigris ut *Turdus* minor. *Venter* albet maculis fuscis: guttur & collum flavescit. *Rostrum* longum, rubrum, superiore mandibula productiore. *Cauda* caret. *Caput* majus quàm pro corporis proportionem, uti & *Rostrum*.

Avis est anomala & singularis, ob magnitudinem & maculas similes ad *Turdinum* genus retulimus.

Cæterùm *Turdi* strictè dicti notæ sunt, color in dorso cinericeus, *Pectus* maculosum: *Merulæ*, color in toto corpore aut maximâ ejus parte simplex, & in plerisque speciebus nigricans. *Sturni* & congenerum, *rostrum* latius & planius seu depressius quàm *Turdis* aut *Merulis*.

7. *TURDUS Zeylanicus auriculatus* *Hellalenia* *Zeylanens*. *Mus. Leyd*.

M E R U L Æ.

A. 1. **MERULA** *vulgaris*, Κόωνος Græcis: *The BLACKBIRD*. Colore undique nigro & *rostro* flavo ab aliis avibus distinguitur. *Avis* est solitaria, (ut nomen *Merulæ* indicat) & summè canora.

A. 2. *MERULA torquata*, *The RING-OUZEL*, or *AMZEL*. *Merulam* vulgarem magnitudine vel æquat, vel excedit, supina parte è fusco nigricans. Infima gula torque albo, *digitum* lato, lunulato exornatur. in montosis *Derbienstibus*, *Eboracensibus* &c. invenitur.

A. 3. *MERULA saxatilis*. *The ROCK-OUZEL*. Præcedenti similis est, sed torque caret. In montosis *Peccii Derbienstis* propè vicum *Hathersfodge* dictum in præruptis rupibus

rupibus è quibus lapides molares excinduntur vidimus plures. Descriptionem vide in Ornithologia D. Willughby. *It is frequent on the high Mountains of Caernarvan-shire and Merionethshire in Wales, where they call it Mwyalchen y graig, quasi dicas, Merula rupicola. I have also seen several of them on a high Hill in Ireland, called by the English, Mount Lemiter, in Irish Stoa Lein. D. Lloyd.* An hæc à præcedente, specie, an sexu tantum distincta sit, aliquando dubitavi, necdum mihi plenè satisfic.

4. PASSER solitarius dictus. Magnitudo & figura corporis Merule. Caput grandius quàm pro corporis mole. Mares colore cœruleo, seu ex cœruleo purpureo undique splendent. Fœmina ex cinereo nigricat. Prona pars tota lineis transversis cinereis, nigris, albidis pulchrè undulatis eleganter pingitur. Rostrum Turdino paulò majus, nigricans; crura, pedes, ungues nigri, & minores quàm in congeneribus.

5. CYANOS seu Cœrulea avis Bellonii; Merula similis est, sed paulò minor, colore undique totius corporis cœruleo. Nidificat in montium summitatibus, ut in Creta, Citharæa, Corcyra, Zacyntho & Eubæa observavit Bellon. in Gallia & Italia non reperitur.

6. Cyanos Indica: The INDIAN MOCKBIRD. A-laudæ vulgaris magnitudine est. Rostro recto, acuto: colore per totum corpus undique cœruleo; caudâ longâ. In Museo Tradescantiano siccatam vidimus. Præcedenti forte eadem est.

A. 7. MERULA aquatica, The WATER-OUZEL, or WATER-CRAKE. Magnitudo paulo infra Merulam vulgarem, Dorsum nigricat cum cinerei mixtura; pectus niveum: Aquas frequentat, & Pisces prædatur. In montosis Septentrionalibus & Cambrobritannicis satis frequens. Quamvis toto corporis habitu & pedum fabricâ aves terrestres referat, sub aquas tamen interdum se demergit.

8. MERULA Brasiliæ Bellonii & Aldrov. Color totius corporis, si caudam & alas excipias, quæ nimirum atræ sunt, adedè intensè rubent, ut omnem alium ruborem

rem superent. *Cauda* longa est: *Pedes* & *ciura* nigra: *Rostrum* ut in *Passere* breve. Nos in *Museo Tradescantiano* avem *Indicam rubram* vidimus *caudâ oblongâ*, *magnitudine* ferè *Turdi* minoris.

9. *MERULA rosea* Aldrov. *Sturnum marinum* vocant *Aucupes*, inquit, & fortè rectè, quamvis maculata non sit. *Merulâ* paulo minor est, *dorso*, *pectore* & *alis* supernis roseo seu carneo colore; *capite* cirrato: *Alis* & *cauda* nigris. *Rostrum* quâ *capiti* jungitur nigro, cætera carneo: *pedibus* ferè croceis. Apparet, inquit, in agris nostris & in fimo versatur.

10. *MERULA Indica pectore cinnabarino*: an *Jacapu* Marcgr.? Hujus pellem suffultam vidimus in *Museo Tradescantiano*: *Magnitudine* erat & *figura Merulæ*. Color in supina parte tota niger, oræ duntaxat plumarum circa uropygium cinereæ aut albidæ. *Pectus* coccineum: *Rostrum* *Merulæ*; *cauda* etiam longa *Merulæ* similis. *Jacapu* Marcgrav. huic *Avi* perfimilis est si non eadem.

11. *MERULA bicolor* Aldrov. duobus potissimum coloribus fusco scil. seu subnigro & luteo rubescente varia.

12. *MERULÆ* congener *ejusdem*, lineâ prope *rostrum* rubrâ.

13. *MERULÆ* congener *alia ejusdem*. Harum *descriptions* videtis apud *Aldrovandum Ornithol.* lib. 16. cap. 12, 13, 14. Priorem pictam duntaxat vidit, nec posteriorem vivam.

STURNI & congeneres.

A. I. **S**TURNUS Aldrov. & aliorum, *Ψάρλας* Jacq: A STARE, or STARLING. *Rostrum* latius est & depressius quàm *Turdis* aut *Merulis*, quâ præcipuè notâ ab iis differt, quibus aliàs *magnitudine* & *figurâ* similis est. *Apices* plumarum in collo & dorso flavescent in mare, in *femina* albicant; aliàs nigricant cum cœruleo quo.

quodam aut purpureo splendore, cui viride interlucet pro vario ad lucem objectu. *Insectis* solis aut carne velci aiunt, non baccis.

2. STURNUS *Indicus* Bontii. *Plumis* cyaneis aut subobscurè cœruleis ac cinereis guttis interstinctus *Sturnum nostratem* refert, verùm *cristam* flavam in cervice gerit, & *caput* nigris, mollibusque ceu holosericeis plumis vestitum est. Humanas voces multo accuratiùs quàm *Psittacus* imitatur.

3. MERULA *saxatilis* Aldrov. *Ruticilla major* Olinæ. *Turdus marinus* Florentinis. *Sturno* æqualis & similis est; *rostro* nigro, *pedibus* ex fusco plumbeis. *Mentum* nonnihil albet. *Prona* pars corporis; albo aut incano, nigro, & subflavo coloribus varia. *Caput* & dorsum fuscum aut subnigrum, apicibus pennularum cinereis. *Cauda* ruffa seu fulva; quæ hujus avis nota characteristica est. Colores aliàs in maribus & fœminis plurimùm differunt. In *Italia* satis frequens est, vidimus & *Vienne Austria*.

4. STURNUS *Indicus* Mus. Leyd.

5. GALBULA seu *Picus nidum suspendens* Aldrov. *Oriolus* Alberto. *Chloreus* Aristotelis ex *sententia* Aldrovandi; *Icterus* Plinii *eidem*. *Turdus* aliquanto major est; *Rostro Turdino*, sed majori & longiori, rubro: *Pedibus* plumbeis, præter alas & caudam, quæ maxima ex parte nigricant, mas ubique toto corpore, pulcherrimo colore flavo spectabilis est, ut colorum elegantia & splendore cum *Americanis* avibus cernet. In *Germania* & *Italia* invenitur. Cum *Turdus* & *Merulis* *Rostri* totiusque corporis figurâ, magnitudine quoque & victûs ratione, convenit.

Aves minores seu AVICULÆ.

AVICULAS voco Aves omnes *Turdus* minores, quæ in genere dividi possunt in *Tenuirostras*, SOFT-BILD BIRDS, quæ *rostra* habent tenuiora, infirmiora, pleræque etiam longiuscula; & *Crassirostras* HARD-BILD BIRDS.

BIRDS, quibus *Rostra* breviora, crassa, duriora & fortiora. *Priores* insectis præcipuè aut fructibus mollioribus victitant; *posteriores* seminibus & granis durioribus, & siccis.

A V E S minores rostris tenuioribus.

HArum multa sunt genera 1. *Alaudæ*, Κορύδαλοι, quarum notæ sunt *Calcaneum* sive digiti postici unguis prælongus, color testaceus terreusve; in sublime evolantes cantillare. Harum species sunt,

A. 1. *ALAUDA vulgaris*, The common FIELD-LARK or SKY-LARK. Color è testaceo & nigro varius, plumulis in ambitu cinereo-ruffis, media parte nigris: *Cauda* longa; Humi nidificat.

A. 2. *ALAUDA arborea*, Tottovilla Olinæ, The WOODLARK. A præcedente aliisque differt, 1. Quod minor ac corpore breviora crassioraque sit. 2. Quod extimæ caudæ pennæ summitatibus suis albicent. 3. Voce seu cantu *Merularum* æmulo. 4. Circulo plumarum albicantium coronæ instar ab oculo ad oculum caput cingentium. 5. Quod extima alæ penna remex, secunda multo brevior sit, quæ in *Alauda vulgari* ei proximè æqualis. 6. Quod arboribus infideat, cum illa terræ plerumque.

A. 3. *ALAUDA pratorum* Aldrov. The TIT LARK! *Alauda* vulgari dimidio ferè minor, viridior est, & minus pulchrè colorata. Arboribus etiam infidet.

4. *ALAUDA cristata major*. Germanis Kommanick! The greater CRESTED LARK. *Alauda* vulgari major est, *rostro* majore & longiore; *capite* cristato, *crista* ex septem, octo, aut etiam decem duodecimve pennulis compositâ. Color dorfi minus pulcher, nec adeò maculis distinctus ac in illa. *Cauda* brevior. Non adeò frequenter in sublime evolat, nec evecta tam longam inibi moram trahit: Tandem non ut illa gregatim volitat.

A. 5. *ALAUDA cristata minor*, The lesser CRESTED LARK. *Alauda* vulgari longè minor est, & apicem pro corporis parvitate longiusculum obtinet, pedesque rubros,

& colorem totius corporis ad fuscum magis vergentem.

A. 6. *ALAUDA minor campestris* D. Jessop. Ab *Alauda* pratorum differt, 1. Quod paulò major sit : 2. minus viridis : 3. *Pedibus* pallidioribus : 4. *Calcaneis* multò brevioribus.

A. 7. *ALAUDA minima Locustæ voce*. *Locustella* D. Johnson, *The TIT-LARK that sings like a Grass-Hopper*. *Regulo* non cristato minor est, supernè è flavo fuscescens maculis subnigris ; subtus ex albo flavescens, summo spinæ alicujus ramulo insidens, corpore erecto, aperto ore, alis paulum explicatis, stridet more *Locustæ* sed sonantius. Nota *Alaudarum* maximè characteristica, & omnibus communis est, *Calcar* seu unguis digiti postici longissimus.

8. *Alauda Indica* Mus. Leyd.

9. *SPIPOLETTA Florentinis, Tordino Venetis*. *Alaudis* minor est, *Ficedulæ* par. *Rostrum* gracile, rectum, acutum, nigerrimum ; pedes etiam nigri. *Calcar* seu unguis posticus prælongus, *Alaudæ* instar. Color in supina parte cinericeus cum quadam viroris mixtura. *Gula*, pectus, venter in nonnullis albescent, in aliis pulchre flavent. *Pectus* autem gutture & ventre in omnibus obscurius est & maculatum. *Calcanei* longitudine ab aliis avibus ; colore atro rostri & pedum ab aliis *Alaudis* differt.

10. *GIAROLA* Aldrov. *Magnitudo Alaudæ*. *Rostrum* rubicundum, intus & in rictus marginibus lutescens. Supinæ partis colore *Coturnicem* exactissimè refert, aut *Gallinaginem*. Verticis finis, collive initium albicantibus plumularum marginibus tanquam coronâ cingitur. *Venter* albus. *Cauda* vix pollicari est longitudine, angustissimis plumulis composita, & ipsa angusta, *Pedes* carnei, *calcaribus* *Alaudæ*. In omnibus ferè, præterquam *caudæ pennarum* colore, cum *Tortovilla* seu *Alauda arborea* convenit.

Secundum Avicularum rostris tenuibus præditarum Genus esto Hirundineum.

HIRUNDINUM notæ characteristicæ sunt, *Caput* grande; *Rostrum* breve; *Oris* hiatus amplus, ad muscas aliâque insecta inter volandum facilius capienda; *Alæ* longissimæ, & volatus pernix, ad eadem acrius insequenda; *Pedes* breves & exigui, nec enim multum incedunt; *Cauda* longa & forcipata, ad corpus expeditius flectendum & circumagendum; *Ova* alba; Hyeme, cum insecta in aere volitantia non inveniuntur, vel in latibula se subducere, vel in longinquas regiones avolare. *Hirundinum* species quatuor observavimus.

A. 1. *HIRUNDO domestica*, The Common, or CHIMNEY-SWALLOW. Χελιδὼν. Pars supina cœruleo saturo seu nigro purpurascēte colore splendet. In Sincipite & sub mento macula albicans obscurè sanguinea. *Pectus* venter & plumæ subalares albicant cum aliquo rubore. *Cauda* valdè forcipata, transversa macularum albarum linea distincta & ornata. In ventriculo dissecto scarabeos invenimus. In caminis nidificat.

A. 2. *HIRUNDO rustica* sive *agrestis* Plinii, The MARTIN or MARTLET. *Caput* ut in præcedente planum & depressum. Supina corporis pars ejusdem ferè cum illa est coloris sed obscurioris & minùs splendentis; prona pars nivea: *Cauda* minùs forcipata est, neque extremæ pennæ proximas longitudinem tantum excedunt. Sub tectorum suggrundiis inque fenestris nidificat, non in caminis, nec nidum construit hemisphæricum & superiore parte totum apertum ut *Hir. domestica*, sed ovatum supernè tectum, rotundo tantum foramine ad latus relicto, per quod ipsa intrat & exit.

A. 3. *HIRUNDO riparia* Aldrov. The SAND-MARTIN or SHORE-BIRD. In *Hirundinum* genere minima est. A præcedente differt quod *uropygium* non ut in illa album est: pedes nudi, non ut in illa ad un-

gues usque plumosi. In *riparum foraminibus* nificat.

A. 4. *HIRUNDO* apud *The BLACK MARTIN* or *SWIFT*. Maxima hæc est inter nostrates, *capite* prægrandi, *oris* hiatu immani, *Rostro* perexiguo, debili, quo cum *Caprimulgo* convenit. *Color* totius corporis, exceptâ maculâ sub mento albicante, pullus cum quadam viroris tinctura. *Crura* brevissima, *Pedes* minutissimi, structuræ singularis, qualem in nulla præterea ave unquam observavimus, *digiti* enim omnes [4] antici sunt; inque digito minimo unicum tantum officulum in reliquis tribus, præter aliarum omnium avium normam, non plura duobus, altero brevissimo, altero longiore. Ob alarum longitudinem & brevitatem *pedum* humo ægrè se tollere potest.

Julius Scaliger hujus generis Avem se vidisse asserit magnitudine *Buteonis*, sed facie ab his nullo modo dissimili: *cruribus* tamen atque unguibus ad prædam & pugnam idoneis, nec minùs *Rostri* aduncitate.

Hirundo marina Aldrovandi hujus generis non est, sed *Laris* annumeranda.

5. *Hirundo Americana*, *Brasilienfis* *TAPER* dicta, *Andorinha* *Lusitanis*, *Magnitudo*, *Volatus*, *Rostrum* *Hirundineum*. *Os* amplum, quod aperire ultra oculorum regionem potest, ut *Ibijau* major, quo cum *Apode nostrate* convenit, ut & alarum longitudine desinentium cum fine caudæ. *Supina* pars tota coloris est fusci cum griseo mixti: *guttur* & *pectus* grisei cum albo mixti. *Venter* albus. *Parum* differt ab *Hirundine apode* nostrate.

6 *HIRUNDO* *Sinensis* *nido eduli* *Bontii*. In tractu inquit maritimo oræ *Sinensis* *Aviculæ* parvæ discolores, *Hirundinum* specie, certo anni tempore, ubi æstus proliferandi eas invasit, è locis *Mediterraneis* ad mare in scopulos meant, & ex spuma maris basin scopulorum alluentis tenacem quandam materiam colligunt, ex qua nidos suos ædificant, in iisque ova ponunt, & pullos excludunt. Cæterum *Chinenses* hos nidos è scopulis avulsos ingenti quantitate per *Indiam* venales ferunt, gulosis in summas delicias: qui eos *Gallinæ* seu *Vervecis* decocto disso-

dissolutos avidè devorant, & *Ostreis*, *Fungis* cæterisque gulæ irritamentis longè anteponunt.

Hoc genus *nidos* aliquoties vidimus in *musæis* curiosorum: sunt autem describente *Wormio*, hæmisphæricæ figuræ, ovi *Anserini* magnitudine, substantia ichthyocolam referente.

TERTIUM *genus Avicularum* **PARI** *constituant,* *Ἀγιδάλαι* *Aristoteli.*

HIS *Rostra* brevía & pro corporum ratione majora quam aliarum tenuirostrarum, nigra. Circa *arbores* plerunque versantur, & de *insectis* quæ ibi inveniunt præcipuè victitant, inque earum foraminibus nident, unde fortè nomen *Anglicum* Titmouse. *Turnerus* cannabino etiam semine vesci prodidit; & *nucibus* quas rostellis suis perforant. *Pedes* omnibus, præter *Parum caudatum* (qui sui generis *Avis* est, à *Paris* longè diversi) plumbei coloris sunt.

Quinque *species* hoc nomine donatas in *Anglia* observavimus.

A. 1. FRINGILLAGO seu *Parus major*, *Ἀγιδάλαι* *Aristot.* The great TITMOUSE or OXE EYE. Magnitudine est *Fringille*; Capite & mento nigro, macula alba insigni in utraque maxilla, nigro cinctâ; reliqua pars supina è viridi flavicat, præter uropygium quod cærulescit: Prona pars corporis lutea est. *Pedes* Plumbei.

A. 2. PARUS *ater* Gesn. The COLEMOUSE. Caput huic nigrum cum macula in occipitio alba; Dorsum cinereo-viride, uropygium viridius. *Pedes* plumbei, à præcedente parvitate sua satis distinguitur.

A. 3. PARUS *palustris* Gesn. Aldrov. The MARSH-TITMOUSE or BLACK-CAP. Caput nigrum, maxillæ albæ; Dorsum virescit; *Pedes* plumbei sunt. A præcedente differt. 1. Quod *major* sit; 2. Cauda majoro; 3. Maculâ albâ in occipitio careat; 4. Prona facies albidior sit; 5. Minus nigri sub mento habeat; 6. Maculis albis in apicibus tegitum alarum prorsus careat.

A. 4.

A. 4. *PARUS cœruleus*, The BLEW-TITMOUSE or NUN. Insignis nota qua à reliquis discriminatur est azureus capitis color circulo albo ceu corolla quadam cinctus. A rostro ad occiput per oculos linea nigra excurrit. Dorsum ex flavo virefcit, prona pars tota lutescit. Pedes plumbei.

A. 5. *PARUS caudatus*, The LONG-TAIL'D TITMOUSE. Vertex huic albicat; collum nigrum est; maxillæ & gula alba. A rostro supra oculos ad occipitium hinc indè linea lata nigra protenditur. Verùm non est cur notas hujus aviculæ characteristicas sollicitè conquiramus, sufficit ad distinctionem caudæ figura, *Pica caudatæ* similis; Pennæ enim extimæ brevissimæ, reliquæ hinc inde ordine longiores ad medias usque quæ omnium longissimæ, differentiâ seu excessu notabili: Cauda pro avis magnitudine longissima est. Pedes nigricant. Nidificat ut *Passer troglodytes*, fornice desuper arcuato, ex eadem cum reliquo nido materia & simili coagmentatione extructo, foramine unico ad latus relicto quo ipsa ingreditur & exeat. Ova inter omnes aviculas numerosissima ponit.

6. *PARUS cristatus* Aldrov. The CRESTED TITMOUSE. Vertex niger fimbriis pennarum albis. Crista ad digiti fere altitudinem assurgit. Alias notas adferre non est opus.

PARUS sylvaticus Gesneri. Non alia avis esse D. Willughby & nobis videtur quàm *Regulus cristatus*.

7. *PARUS Indicus* Aldrov. *Fringillagini* congener videtur, licet maculam illam nigram prorsus non habeat. Tota tribus potissimum coloribus (si oculos excipias quorum *irides* luteæ) constat cœruleo, albo & nigro. Vertex & collum totum dilute cœruleum, pars prona tota candida: Alæ cœruleæ, ut & cauda, quæ totum corpus adæquat, vestitrices dilutiùs, Remiges pennæ intensiùs. Hæc mihi suspecta. Puto Aldrovandum iconem pictam descripsisse. Pedes nigerrimi & exigui, quo à *Paris* differt.

Quartum Avicularum genus MOTACILLAS.

CAUDA his prælonga, quam perpetuò fere motitant, undenomen. Circa aquas præcipuè versantur. Harum duæ apud nos habentur species.

A. 1. MOTACILLA *alba*, The WHITE WATER-WAGTAIL: Corpore ex albo & nigro cinereove versicolore.

A. 2. MOTACILLA *flava*, The YELLOW WATER WAGTAIL. Prona pars corporis flavet, pectore obscuriore: Supina obscurè virescit, medio dorso nigricante. Vertex ex viridi flavicat. Magnitudine & figurâ cum *alba* convenit, & caudæ motitatione ferè continua.

3. MOTACILLA *cinerea*, an *flava altera* Aldrov.? Magnitudo *Motacillæ* vulgaris, Vox acutior & clamosior. Supina pars corporis cinerea. Caput nonnihil fuscescit. Mentum & guttur albo & cinereo varia: Pectus & venter ex albo lutescunt: Uropygium circumcirca intensius luteum. Fluvios lapidosos frequentant, & insectis aquaticis vescuntur.

4. JAMACAII *Brasilens.* Marcgr. Alaudæ est magnitudine; Cauda 4 ferè digitos longa: Caput parvum; rostrum digitale, rectum, nigrum, inferiùs propè exortum cœrulescens. Caput nigrum, ut & collum inferiùs, superiùs luteum. Dorsum totum, pectus, & infimus venter lutea: Alæ nigræ, maculâ in medio albâ: Cauda nigra. Pedes fusci. Ob caudæ longitudinem, & plumarum colores non admodum diversos hanc Avem *Motacillis* subjunximus, an rectè nescimus; cùm de loco, victu, aut caudæ motitatione nihil tradat *Marcgravius*.

Succedant Quinto in loco OENANTHÆ dictæ.

QUARUM Notæ, Pedes nigri, ut & Rostrum; Cauda bicolor, exterioribus, pennis albis.

A. 1. OENANTHÆ five *vitiflora*, The FALLOW-SMICH; Sufflexiensibus The WHEAT EAR, quia messis tempore se ad montes Downs dictos recipit, ubi

ubi *scarabæis* aliisque insectis quæ ibi invenit pinguescit admodum, & in deliciis habetur. Alibi ab *Uropygii* colore **WHITE-TAIL** dicitur ut Italis *Culo bianco*.

Magnitudine *Passerem* superat. *Color* capitis & *dorsi* cinereus cum quadam ruboris mixtura; *uropygium* supra caudam albet. Totus *Venter* rubore diluto tingitur, *Pectus* plus rubet. Supra *oculos* ad *occiput* linea alba extenditur, infra *oculos* in maribus ductus niger ab angulis oris ad aures. *Rostrum*, pedes, unguiculi nigra.

2. **OENANTHE** altera *Aldrov.* Superiore minor est, *Passere* major; pennis omnibus, exceptis alarum remigibus (quæ nigrae marginibus luteis) ex ruffo flavescit, in *dorso* intensius, in *pectore* remissius. Retro *oculos* macula est oblonga nigra, figurâ quodammodo semilunari.

A. 3. **OENANTHE** *secunda* nostra seu *Rubicola*, **The WHIN-CHAT.** *Motacille* est magnitudine. Pars supina xerampelina, maculis nigris seriatim dispositis varia. *Venter* albicat cum aliqua ruffi tinctura, *Latera* & *pectus* summum ex ruffo lutea. Duæ maculae albæ utramque alam insigniunt. A sequenti ave his præcipuè notis distinguitur. 1. Quod pars corporis supina pulchrius sit colorata, plumulis media parte circa scapum nigris, marginibus albis; 2. Quod in utraque ala duas habeat maculas albas; 3. quod ima pars *caudæ* alba sit. 4. Quod *caudæ* tam supra quàm subtus incumbentes pennulae ultra mediam caudam excurrant, & albare penitus contegant & occultent: 5. Ductus albidus à rostro ad occipitium usque protendantur. *Rostrum*, pedes, unguiculi nigri.

A. 4. **OENANTHE** nostra tertia, *Muscicapa tertia* *Aldrov.* *Rubetra* *Bellonii.* **The STONE-SMICH, or STONE-CHATTER, Turnero The MOOR-TITLING.** Magnitudo *Linariae*, caput *nigrum*, ut & collum; ad latera utrinque maculâ albâ notatur, adeò ut torquata videatur. Medium dorsum nigrum marginibus plumarum fulvis, supra *uropygium* macula alba. *Pectus* fulvum aut ex flavo-rubrum; *venter* albet cum aliquo rubore. Macula alba dorso proxima utramque alam in utroque sexu ornat: quæ præcipua est hujus avis
nota,

nota. *Rostrum*, pedes & ungues nigri; quæ nota est omnibus *Oenanthis* communis. In montosis *Pecci Derbiensis*.

A. 5. *OENANTHE nostra quarta*, monticola, *Coldfinch* Germanis dicta. Venter ei albus, *pectus* luteo fuscum: *Caput* & dorsum è fusco seu viridi cinerea: teges caudæ pennæ nigræ. *Alarum* remiges nigræ, verum à quinta omnes fundum versùs albæ. *Rostrum* nigrum, compressum & ferè triangulare. *Pedes* nigri.

A. 6. *FICEDULÆ affinis*, an *Spipola prima*. Aldrov. *The WHITE-THROAT*. *Ficedulæ* est magnitudine, corpore productiore. *Supina* pars corporis ex ruffo cinerea; summum *caput* magis cinereum. *Mentum* album, unde nomen: *Gula* ex albo rubet; *Pectus* etiam & venter imus rubescit sed dilutiùs. *Rostrum* superiùs nigricat, inferiùs albet. *Os* intus flavum. A *Ficedula septima* Aldrov. differt, quòd illi cauda tota unicolor sit, huic extimæ ejus pennæ albæ.

7. *MUSCICAPA prima* Aldrov. *Boarina* Bononiensibus. *Avicula* est oblonga, *rostro* etiam oblongo, ex fusco rufescente. *Supina* pars tota è plumbeo, cinereo, & subluteo colore mixta; *prona* candicat. *Pectus* verò nigris maculis distinguitur. *Alæ* ex nigro lutescente albòque variæ. *Tibiæ* & pedes nigricant.

Aviculæ cauda unicolore variæ.

A. 1. *STOPAROLA* Aldrov. eive perfamilis *Avicula*. Magnitudine & colore *Passerculo femine* similis est, verum corpore longiore & tenuiore. *Supina* pars tota cinerea aut fusca [colore murino] caput tamen maculis nigris conspergitur in vertice, ut recte *Aldrovandus*. *Prona* pars albida: *Gula* & latera nonnihil rufescunt. *Cauda* tota fusca: *Alarum* remiges nigricant, verum interiorum margines lutei. *Rostrum* rectum nigrum, ad nares latiusculum & depressum. *Mandibula* superior secundum longitudinem in angulum assurgit, unde *Rostrum* triangulum videtur, estque inferiore paulo longior, apice adunco; *Rictus* amplius, *Os* intus flavum. *Pedes* exigui nigri, ut & *Aldrovandus* notat. In ventriculo *Sca-rabæi*; *muscæ*, &c. Hortos æstate frequentat in *Anglia*.

Muscis capiendis *Rostrum* comparatum est. In pullis dorsum maculis albis & nigris varium. Aviculam hanc prolixius descripsimus, ut cuius attento ab aliis omnibus facile possit distingui.

A. 2. LUSCINIA seu *Phylomela*, Ἀνδῶν. The NIGHTINGALE. Avis hæc, à cantu nocturno nomen adepta, omnibus seculis notissima est. At qui cantantem internoctu sæpius audiverunt, & vocem ejus optime tenent, plerique tamen formam avis ignorant. Magnitudine est *Carduelis* aut *Ruticillæ*; corpore longiusculo, nulla ferè colorum varietate, aut pulcritudine spectabilis, supina parte totâ dilutè fulvâ, cum aliqua viroris mixtura, ut in *Turdo Iliaco*. Cauda fulvo saturatiore tingitur velut *Ruticillæ*. Venter totus albicat, *Pectoris* & gutturis plumarumque subalarium color obscurior est admixto viridi. *Rostrum* subnigrum. *Pedes* coloris carnei obscurioris. *Os* intus flavum velut *Turdorum*.

A. 3. RUBECULA siue *Eritacus* Aldrov. Ῥεῖσα-
xΘ, *Aristot.* The ROBIN-RED-BREAST, or RUD-
DOCK. Hæc etiam avis ubique ferè gentium notissima, à pectore rubenti denominata, alia præter hanc notam non indiget descriptione. Pars supina tota, ut in *Turdis* cinereo-viridis. Hyberno tempore ad victum quærendum etiam domos subintrat, hominibus velut amica & familiaris.

4. *Rubecula Indica*. Mus. Leyd.

A. 5. RUTICILLA, Ῥοινίλλος Græcis, The RED-
START. *Pectus*, partes subalares, uropygium, cauda ruffa. *Venter* imus albet. *Caput*, collum, dorsum colore plumbeo imbuuntur. *Sinciput* maculâ albâ insigne. Gula & maxillæ sub oculis nigræ. *Rostrum* & *pedes* nigri, *Os* intus flavum.

Tres adhuc alias *Ruticillæ* species tradunt & describunt *Gesnerus* & *Aldrovandus* 1. *Ruticilla Tertia Aldrovandi* cujus descriptio *Gesneriana* cum nostra *Ruticillæ vulgaris* exactè convenit. 2. *Rotschwentzel* *Gesn.* à cauda rubente dicta, ex pictura descripta. 3. *Wegflecklin* circa *Argentorat* dictæ pectore cœruleo imo tamen subruffo ex
flavo,

flavo, ventre cinereo, cruribus fulcis, mento fusco & vario.

A. 6. CURRUCA *Eliotæ*, an *Magnanina* Aldrov. ?
The HEDGE-SPARROW. Magnitudine est *Rubecula* ferè ; Color supinæ partis varius ex nigro & sordidè rufso, mediis plumularum circa scapum partibus nigricantibus, exterioribus sordidè ruffis: *Caput* & collum nonnihil cinerascunt, maculis mediis obscurioribus: Infimum dorsum supra uropygium virescit aliquantulum, & maculis destituitur. Prona pars corporis cinerea seu plumbea, imus tamen venter albicat. Summa Avis hæc terreo & sordido est colore, à cujus aliquali cum *Passere* fœmina similitudine *Passer sepiarius* dicta est, hujus ova colore pulchrè cœruleo tinguntur.

A. 7. FICEDULA *septima* Aldrov. PETTICHA PS Eboracensibus. *Beccafico* Italis. Magnitudine est *Linaria*, corpore breviusculo. Color capitis, dorsi, alarum & caudæ ex cinereo, seu (ut alii) ex fusco viridis. Prona pars tota alba seu argentea, pectore duntaxat obscuriore cum aliqua flavi tinctura. Nullâ ferè colorum diversitate insignis est hæc avicula. *Rostrum* nigricat. *Pedes* cœrulelscunt. In dissectæ ventriculo vinacea aliæque semina inveni.

A. 8. ATRICAPILLA sive *Ficedula* Aldrov. Συγκλῆς & Μελαγκρόρυς Græcis. *The BLACK-CAP*. Parva est avicula, capite summo nigro, unde ei nomen, collum cinereum, dorsum totum obscurè viride. *Pectus* dilutè cinerascit, *venter* imus ex albo flavescit. *Rostellum* nigrum, tenuius quàm *Paro*, *Pedes* plumbei.

A. 9. REGULUS *cristatus* Aldrov. *Trochilus* Plinio & *Aristot* cui & Περίστους & Βασιλλῆς, *The GOLDEN-CROWN'D WREN*. Parvitate sua, & maculâ croceâ seu dilutè coccineâ amœnissimâ (quam *cristam* vocant) in vertice, ab aliis aviculis satis distinguitur. *Collum* & dorsum totum è viridi obscuro flavicant; *Pectus* & venter colore viridi in album languente perfunduntur. In illo nobis descripto Ventriculus infectis plenus erat. In summis arboribus, præsertim *Quercubus* versatur. We found it in Middleton Park in Warwickshire. Mr. Francis Jessop in York.

Yorkshire. *Also we are inform'd it is in some Woods about Oxford.* In agro Cardiganensi Cambria frequens est, nomine Britannico Syvîgw i. e. *Parus chrysocephalus* dicta D. Lbwyd.

A. 10. *REGULUS non cristatus* Aldrov. An *Asilus* Bellonii? an *Luteola* Turneri? Neque hæc, quod sciam, nomen Anglicum invenit. *The small YELLOW-BIRD.* *Regulo cristato* tantillo major est. Tota pars supina præter alas & caudam è fusco seu cinereo virefcit: Prona, v. g. gula, pectus, venter, alba cum levî viroris tinctura: aliàs lutescit. Inter *Salices* plurimùm versatur, perque arbores & frutices continuè reptat, & cantat voce stridula *Locustæ*. Variant coloribus hujus generis Aves; aliæ enim diluriùs, aliæ intensiùs *virent* aut *flavent*.

A. 11. *PASSER troglodytes* Aldrov. Turnero & Bellonio perperam *Regulus*. *The WREN.* Caput, collum, dorsum ex fusco spadicea; Alæ, cauda, Dorsum, lineis transversis nigricantibus varia: medium pectus albidius, inferiùs & ad latera lineas nigras transversas obtinet. Caudam plerumque erectam tenet. Nidus ex mulco constructus ovi in alterum extremum erecti, figuram habet foramine in latere ad ingressum aperto.

Aviculæ nonnullæ Aldrovando aliisque descriptæ, ad superiores referendæ & locis suis disponendæ.

1. *LUSCINIOLA* seu *Rouffette* Bellonii Aldrov. Tom. 2. Pag. 765. An eadem cum *Giarola* Aldrov. rostro rubicundo, colore *Coturnici* simili.

2. *Oenantho* congener Aldrov. *ibid.* p. 764

3. *Spipola prima* Aldrov. quam nostræ *White-Throat*, eandem esse suspicamur.

4. *Spipola altera* Aldrov. Pectore rubicundo maculis fuscis deorsum descendantibus distincto; supinè cinereo, ventre albescente; maculâ retro oculos ad ferrugineum accedente,

accedente. *Oenanthe nostra secundæ* similis est, si non eadem.

5. *Spipola tertia* seu *Boarina*, ex albo lutescens ejusdem. p. 732.

6. *Avis consimilis Stoparolæ & Magnaninæ* ejusdem. Magnitudo *Motacillæ*; *Rostrium* oblongum, acutum, rectum, nigrum; *Pedes* plumbei, supina parte pallidâ; iridibus oculorum albis.

7. *Grifola* Aldrov. *Rostrium* tenue & longiusculum: *Collum* & *pectus* maculis fuscis oblongis deorsum vergentibus interstinguitur. *Venter* totus candicat: supina pars tota fuscescit. *Crua* & *pedes* fusci vel nigricantes.

8. *Glareana* seu *Grien Vogelii* Gesn. Et huic *pectus* maculosum; cum iconem tantum pictam descriplerit *Gesnerus*, nos plura non addemus.

9. *Anthos æqualis Fringillæ, lutescens* Aldrov. Tom. 2. p. 75.

10. *Muscicapa secunda* Aldrov. seu *Borin Genuensium*. *Regulo* paulò major, *Rostro* gracili acuto; colore in supina parte dilutè cinereo; in prona ex albo ad luteum tendente. *Alæ* superiùs leucophææ: *uropygium* album. *Crua* & *pedes* spadicei.

11. *Salicaria* Gesn. *An Silerella D. Brown?* *Avicula* est minima; colore partim fusco, ut parte prona; partim subflavo, ut supina; [voces pronæ & supinæ contraria nobis significatione usurpat *Gesnerus*] partim albicante, ut per latera & circa collum. *Rostro* gracili recto; *crusculis* subruffis.

12. *Ficedula quarta* Aldrov. Supinæ partis color fuscus ad castaneum vergens. *Fœmina* pronè tota albicat; *mas* ex albo ad cinereum vergit. *Alarum remiges* in mare nigræ sunt cum quibusdam intercurrentibus albis; in *fœmina* ad castaneum vergunt; quemadmodum & *cauda*, quæ in mare etiam est nigra. Contra fit in *pedibus*, qui in mare subcastanei sunt, in *fœmina* nigri.

13. *Strapazzino* vulgo Aldrov. *Podex* & *cauda* ferè tota candicant, *capite* & *dorso* luteo ferrugineo, *pennis alarum* seminigris, & semiluteis. Prona pars ex albo

leviter flavescit. *Rostrium* fuscescit. *Cauda* versùs uropygium lutea, cætera nigricat.

Avicule exoticæ omnium minimæ, Marcgravio aliisque descriptæ.

1. **G**UAINUMBI Marcgr. *Guaiminibique* Joanni de Laer, *Gouambuch* Lerio & Theveto. *Tomineio* Joseph à Costa. *Ourissia* i. e. *Radius Solis* sive *Tomineio* Clus. *Hoitzitzil* Hernand. *THE HUMMING BIRD*. *Avicularum* omnium minima est. Parvitate sua & pennarum coloribus cujusvis serici, auri, aliisque metalli splendorem superantibus ab omnibus aliis Aviculis differt. *Alas* tanta pernecitate movere dicitur, ut motus visu percipi nequeat; quin & inter volandum strepitum quendam edere instar *Crabronis* aut *apiculæ*; & à loco in locum tanta velocitate se transferre, ut volans sæpissime oculorum aciem omnino fugiat.

Melle, rore, & florum succo, quem linguis suis longissimis, à natura ad id comparatis, exsugunt, (alarum ope in aëre se per longum tempus librantes velut quietæ) ali dicuntur hæ aves. Verùm cùm ventriculorum musculorum obtineant, nos *muscis* aliisque *insectis* potiùs vesci opinamur. Quòd per totam hyemem obdormiscant, & velut torpidæ & semimortuæ jaceant, à multis proditum invenio. Sit fides penes Autores, mihi certe non persuaserint, cùm in iis regionibus in quibus maxima harum Avicularum copia est, nulla fere hyems sit: & *Marcgravius* eas magno numero in sylvis per totum annum inveniri scribat.

Harum septem species depingit *Fr. Hernandez*, novem describit *Marcgravius*.

1. *Guainumbi* major, *supina* parte viridi; aureo, igneo, flavo intermicantibus; *pronâ* alba; *alis* spadiceis; *cauda* chalybis polita instar cœrulescente.

2. *Guainumbi* major, *supina* parte præcedenti concolore, *pronâ* viridi cum aureo colore splendente; albâ prope anum maculâ.

3. *Guain.*

3. *Guainumbi* minor, *caudâ* longissimâ forcipatâ, *capite* & collo nigro.cœruleo splendente, *dorso* & *pectore* viridi aureo.splendente, *alis* epaticis, *cauda* ex nigro cœrulescente, maculâ prope anum albâ.

4. *Guainumbi* minor, *rostro* incurvo, superiore mandibula nigra, inferiore flava : *supina* parte primæ speciei concolor est ; *prona* ex albo rufescens, *cauda* ex nigro virescente, extremitate alba. *Cruribus* albis.

5. *Guainumbi* minor, *rostro* nigro : *prona* parte nigra cum cœruleo quodam splendore, macula prope anum albâ ; *supina* parte pennis aureo igneo & viridi mixtis coloribus tinctis ornata. *Cauda* eleganter brunnea cui cœruleus transplendet.

6. *Guainumbi* minor, toto corpore aureo, cum igneo dimidio & minimo viridi coloribus mixto splendente, *Alis* nigricantibus ; *cruribus* nigris ; *cauda* versicolore.

7. *Guainumbi* minor, corpore toto cinereo fere, ut *Passer* ; cui hinc inde mirè resplendens rubrum instar *Rubini* perlucet.

8. *Guainumbi* major : *capite* & collo supino rubi colore fulgente, *guttur* & collo prono, aureo politissimo ; imo ventre & initio dorsi nigerdine holosericea, reliquo viridi fusco perfuso : *alæ* fuscis, maculâ prope anum albâ.

9. *Guainumbi* major, toto corpore exceptis alis (quæ ut in plerisque fuscæ) insigni viriditate cum auro transplendente, qualis in secundæ ventre cernitur, tincto. Plenâs descriptiones vide apud *Marcgravium*.

10. *GUIRAGUACUBERABA* Brasil. *Marcgr.* Magnitudo *Carduelis* : Collum inferius, *dorsum*, & ventris extremitas lutea seu aurea : *Caput* superius & collum, dorsi medietas anterior, *alæ* & *cauda* dilutè viridis. Sub gutture ad oculos usque maculam habet magnam, nigram. *Rostellum* rectum, acutum, flavum, superne paulum nigricans : *Crura* & pedes fuscis.

11. *GUIRACOEREBABA* Brasil. *Marcgr.* Magnitudo *Fringillæ* ; *Rostrum* nigrum, acutum & paulum deorsum flexum. *Mitellam* in capite habet è thalassinis pennis. Reliquum caput, prona pars tota cum dorsi medietate posteriore cœruleis vestiuntur pennis lactescentibus.

bus. *A pectore* per initia alarum ad dorsum linea lata cœrulea transit transversim per exortum alarum ; totum autem collum superius cum medietate dorsi anteriore profundè nigris holosericeis vestitur pennis. *Cauda* sesquidigitalis nigra. *Alæ* magnæ, quæ ad medietates laterales flavescent, subtus ferè totæ flavicant. *Pedes* cinna-
barini.

12. JAPACANI Brasiliensibus *Marcgr.* Avis magnitudine *Bemtere* ; *Rostrum* oblongo, nigro, paulum deorsum incurvato : *Oculis* aureis *Capite* nigricante : Reliqua pars supina ex Umbra & nigro mixta. *Cauda* superius nigricans, subtus alba. *Prona* pars tota ex albo & flavo mixta, lineis transversis nigricantibus striata. *Crura* fusca.

13. TANGARA Brasiliensibus *Marcgr.* Magnitudò *Fringillæ* : *Rostrum* rectum crassiusculum, nigrum : *Pedes* ex cinereo fusci. Supra rostri exortum macula nigra. Totum *caput* & collum viride. Initium dorsi instar collaris ambiunt pennæ nigerrimæ ; reliquum dorsum luteum : totus infimus venter egregiè cœrulescit. *Alæ* nigræ, earumque extremitates laterales cœruleæ. Initium alarum exterius thalassinum ; scapulares dorso incumbentes pennæ partim flavæ. *Cauda* sesquidigitalis, pennis nigris, lateralium extremitatibus cœruleis.

14. Hujus alia datur species magnitudine passeris ; *Rostellum* è flavo fusco, latiusculo, acuto. Plumago capitis egregiè miniata ; reliqui corporis cum alis & cauda splendidè nigra. *Cauda* brevis. *Crura* superiora alba, in latere exteriori maculam oblongam miniatam habent. *Pedes* cinerei.

15. QUAUH CHICHIL seu *Avicula capitis rubei* Hernand. *Guainumbi* paulò major, infra candens, superne virescens ex fusco ; *capite* coccineo, *rostro* & *pedibus* atris. Avis est canora.

Aves minores crassis & validis rostris.

A. **GARRULUS** *Bohemicus* Aldrov. *The SILK-TAIL Germanis.* Quam D. Lister Eboraci globo transfixam vidit, magnitudine *Turdum* ferè æquabat. Huic in extremis *alarum* pennis 4 aut 5 apices parvi, coccinei, nudi, minimè plumis vestiti. In extrema *cauda* limbus latus luteus instar corticis citri, unde nomen *Germanicum*. Cætera maximam partem *Lanium* colore refert. Adde ex *Aldrovando* *Rostrum* nigerri- mum esse, magnitudine *domestici Passeris* : Caput more *Alaudæ cristatæ* apice retro vergente insignitum esse, colore rostrum versùs subcastanei diluti ; retro verò cinerei, ad fulcum inclinantis. Ob parvitatem suam, & *Rostrum* crassitiem huc potiùs quam ad *Garrulos* referendam duxi hanc avem, quamvis *Aldrovandus* fructibus eam vesci, & præcipuè uvis inhiare scribit, cùm hujus generis aves seminibus potiùs delectentur. Nemini ergo de hac re li- tem moveo.

A. 1. **COCCOTHAUSTES** *vulgaris*, *The GROSSE-BEAK, or HAW-FINCH.* Caput huic sed præcipuè *rostrum* majus quàm pro corporis mole, unde nomen *Anglicum*, nec alia characteristica opus est. Rariùs, nec nisi per hyemem, in *Angliæ* videtur.

2. **COCCOTHAUSTES** *Indica* Mus. Leyd. Q. an à sequenti diversa sit ?

3. **COCCOTHAUSTES** *Indica cristata* Aldrov. *The VIRGINIAN NIGHTINGALE.* *Merulæ* par est aut paulò minor. *Torquis* niger oculos & rostrum cingit. *Rostrum* autem quale vulgari aut paulò brevius. Caput cristâ fastigiatâ insigne, quam sæpius motitat, tam versùs rostrum, quàm versùs caudam. Color totius pulcherrimè coccineus, in capite & cauda dilutior.

A. 4. **CHLORIS** Aldrov. *The GREEN-FINCH.* *Passere domestico* major est, *Coccothrauste* minor : *Rostrum* hujus rostro simile, infundibuli figurâ, sed multò minus. *Supina* pars corporis viridis ; *Pectus* ex luteo viride.

Venter albet. In *sepibus* nidificat. Seminibus *raporum*, *carduorum*, *lapparum*, & lubentissimè *Cannabis* vescitur.

A. RUBICILLA seu *Pyrrhula* Aldrov. The BULFINCH, ALP, or NOPE. *Caput* grande, *Vertex* niger. Pulcherrimus miniaceus color in *mare pectus*, *gulam*, & *maxillas* ad oculos usque illustrat. *Supina* pars corporis cinerea cœruleâve cum aliqua ruboris tinctura. Lubentissimè vescuntur arborum gemmis, unde non leve hortulanis detrimentum inferunt.

Rubicilla Americana, GUIRA TIRICA Brasiliens. *Marcgr.* Magnitudo *Alaudæ*, *rostrum* superius fuscum, inferius album sive incarnatum: *Crura* cinerea. Totum *caput* cum gutture & colli inferiore ac media parte egregiè sanguinei sunt coloris. *Oculi* cœrulescunt. *Latera colli*, totum *pectus*, ac infimus *venter* alba. *Collum* superius nigricat albo pauco admixto. *Dorsum* & initium alarum griseum; reliqua pars ut & *cauda* nigra. *Oræ laterales* in *alis* albæ.

A. LOXIA, The SHELD-APPLE, or CROSSEBILL. Colores ter in anno mutare dicitur. *Rostrum* contra omnium aliarum avium normam, ab utraque parte recurvum est, mandibulis versùs lummitatem se decussantibus. Avis est voracissima; seminibus *cannabis*, & *Abietum* nucleis gaudet. Aiunt eam uno vel altero rostri ictu pomum integrum confestim per medium dividere, ut ejus nucleis seu seminibus vescatur. Per *Autumnum* interdum sed rariùs in *Angliam* venit, non tamen apud nos perennat aut nidificat.

A. PASSER domesticus ΣΤΕΡΕΟΣ, The HOUSE SPARROW. Hæc avis ubique gentium vel nomine solo satis nota, colore est testaceo, terreôve. *Mari caput* ex fusco cinereum, *mentum* nigrum, supra oculos duæ utrinque maculæ parvæ albæ. Salacissima esse dicitur, & brevius ævi. *Frumenti* granis lubentissimè vescitur, unde & segetibus infesta est.

Passerum, præter vulgarem, 16 species exhibet & describit *Aldrovandus*: quorum lemmata duntaxat dabimus.

1. *Passer stultus Bononiensium* ; colore undique flavescente, maculis ruffis oblongis deorsum descendentibus ubique confusus.

2. *Passeribus congener Aldrov. lib. 15. cap. 17.* Supina parte rufescente, prona candida, maculis subruffis oblongis deorsum descendentibus ubique depicta.

3. *Passer maculatus sive tricolor Aldrov. lib. 15. cap. 13.* Colores sunt albus niger & subflavus.

4. *Passer Albicilla Aldrov. lib. 15. cap. 14.* Cauda ex cinereo candicat, cætera *Passeri domestico* ferè similis est.

5. *Passer Illyricus Aldrov. lib. 15. cap. 21.* Hunc tantum depictum vidit *Aldrovandus*. *Passere domestico* major est, colore alioquin ei similis.

6. *Passer torquatus Bellonii.* *Passere vulgari* corpore & rostro major oculos sub supercilio torque alba ambiente.

7. *Passer pusillus in Juglandibus degens Bellon. Friguet Gallis dictus*, omnium minimus.

8. *Passer Indicus caudatus porphyromelas Aldrov. lib. 15. cap. 28.* cauda 5 digitorum, & alarum remigibus nigerimis, reliqua parte supina purpurea.

9. *Passer Indicus macrouros, rostro miniativo Aldrov.*

10. *Passer Indicus macrouros alius Aldrov.*

11. *Passer Indicus brachyuros Aldrov. lib. 15. cap. 24.*

12. *Passer brachyuros nostras Aldrov.* toto corpore flavescente; prona tamen parte magis albicante; Rostro intensius luteo.

13. *Passer erythromelas Indicus sine uropygio Aldrov.* toto corpore & alarum principiis coccineis, reliquo alarum atro. *Passer Americanus Tijepiranga Brasiliensis* in omnibus ferè convenit cum hac ave, præterquam quòd uropygio & caudâ donetur: Verum Avem ex imagine picta descripsit *Aldrovandus*, & fortasse Avis quæ pingebatur cauda & uropygio mutila fuit.

14. *Passer Indicus cyanerythromelas sine uropygio Aldr.* Harum icones pictas descripsit *Aldrovandus*.

15. *Passer montanus in Stiria & Corinthia frequens nobis observatus.* Mentum nigrum, item macula ad aure

res utrinque nigra. *Caput* ex fusco rubet. *Torquis* albus collum ad medium ferè & maculas ad aures cingit. *Cætera Passeri vulgari* similis.

16. *Passer sylvestris* Aldrov. lib. 15. cap. 16. *Vertex* ut in præcedente ferrugineus ad cinnabarinum tendens: *oculorum* ambitus albus. *Mentum* & collum inferius lineæ transversales nigriusculæ percurrunt.

PASSERCULUS ZEYLANICUS *arvensis guttatus*, *Wikurulla* Zeylanensis, i. e. degens in agris oryzæ confitis *Mus Leyd.*

Idem alterius coloris.

A. FRINGILLA, *The CHAFFINCH*. *Passere* tantillo minor est, *cauda* satis longa. *Caput* in mare cœrulescit, at quòd naribus contiguum est nigricat. *Dorsum* rufum cum cinerei aut viridis mixtura: *Pectus* rubet: *Venter* sub *cauda* albicat. In *sepibus* nidificat; èstque apud nos in *Anglia* frequentissima.

A. FRINGILLA *montana* seu *Montifringilla*, 'Θεοπίστη Aristot. *The BRAMBLE, or BRAMBLING, or MOUNTAIN FINCH*. *Supina* pars ad medium dorsum Sturni est colore, è nigro splendens, plumarum marginibus ruffo-cinereis; infima pars *dorsi* circa uropygium alba. *Gula* è flavo ruffa, *pectus* album. Plumæ ponè anum subruffæ. Plumago sub basi seu flexura alæ pulcherrimè flavet, supra Mali aurantii colore imbitur. Remiges alarum nigræ, maculâ albâ notatæ. *Rostrum* nigrum. Pondus & magnitudo præcedentis.

A. MONTIFRINGILLA *calcaribus Alaudæ* seu *major*. *The great pied MOUNTAIN FINCH, or BRAMBLING, Aucupibus Eboracensibus, SEA-LARK*. *Alaudæ* vulgari magnitudine par est. *Vertex* è fulvo seu fusco rufescens, castanei fere coloris. Rufescunt etiam collum superius, *pectus* (sed dilutiùs) uropygium, & latera: reliqua pars *prona* alba. *Supina* pars è nigro & ruffo-cinereo eleganter variegatur, mediis plumularum partibus nigris, lateralibus è cinereo ruffis. In lummis alis & imo dorso rufescit magis. Alæ nigræ cum macula in medio alba, seu spatio lato albo. *Rostrum* luteum apice nigricante. *Pedes* & ungues nigerrimi, postico prælongo

longo ut in *Alaudis* : quæ nota sola ad distinctionem sufficit.

In *Septentrionalibus* montosis, sed rariùs, occurrit. *D. Willughby* in agro *Lincolniensi* eam occidit. In agro *Eboracensi* sæviante bruma sat copiosè capiuntur.

Aviculæ Brasilienses PASSERI aut FRINGILLÆ affines.

TIJEPIRANGA secunda species *Marcgr. Passeris* est magnitudine : pennis per totum corpus ex cinereo cœrulescentibus : *Alæ* quodammodo ad thalassinum colorem accedunt. In ventre albicat. Crura & rostrum, (quod ipsi *Fringillæ* simile) cinerea.

2. **GUIRANHEEMGATU** *Marcgr.* Magnitudo *Passeris* : Caput superius & guttur luteum : reliqua pars prona flava. *Alæ* ex virescenti & flavo mixta & fusco distinctæ : Crura fusca. Egregiè cantat ut *Fringilla*. Possent hæ aves ad *Passeres* referri, quo & in *Ornithologia D. Willughby* eas retulimus.

3. **SAYACU Brasiliens.** *Marcgr.* Magnitudo *Fringillæ* : Color in toto corpore è cinereo & thalassino mixtus, in dorso splendens. Rostrum & Oculi nigri.

4. **GUIRAPERA Brasiliens.** *Marcgr.* *Alaudæ* est magnitudine ; Rostrum brevi, crassiusculo, nigricante ; supina parte, & infimo ventre obscurè flavo : prona pars reliqua nigra. Cauda & alæ fuscae seu nigricantes, laterali extremitate thalassina. Pedes obscurè cinerei.

5. **TIJEGUACU PAROARA Brasil.** *Marcgr.* Magnitudo *Alaudæ* : Rostrum breve, crassum, fuscum, infernè albicans. Caput superius, item guttur & collum inferius in mare sanguinea, in fœmina flava, sanguineo punctata : reliqua pars supina cinerea : Alarum & caudæ pennæ fuscae oris albescentibus. Latera colli, & prona pars corporis alba. Pedes fusci.

A. I. **CARDUELIS**, an *Χρυσόπτερος* *Aristot.* ? *Anglicè* recentioribus *Græcis*, The GOLD-FINCH or THISTLE-FINCH.

FINCH. *Rostrum* coniforme figurâ, albidum. *Passere* minor est. Color verticis niger, maxillæ albæ, Occipitium etiam albicat. A vertice ad collum fere producta linea lata nigra alborem terminat. Basin rostri annulus coccineus ambit. Ab oculis ad rostrum hinc inde ductus niger extenditur. Collum & dorsum antè ex rufo fulva vel cinerea. Uropygii, pectoris, laterum idem color sed dilutior. *Venter* albus; *Alæ* & *cauda* nigræ, apices tamen pennarum principum in utrisque albi. *Alæ* ductu pulcherrimo flavo transverso insigniuntur, unde *Aurivittis* nomen *Aviculæ* inditum. *Carduorum* seminibus vescitur hyberno tempore.

2. *Cardueli congener* Aldrov. Major *Carduele*; *Rostro* fasciola crocei coloris cincto. *Alæ* nigriores quàm in aliis; quòdque in illis lutei est in hac ferè pallefcit, Fortè *Spurium* aliquod genus est.

3. ACATECHICHICTLI seu *Avis confricans se ad Arundines* Hernand. *Carduele* paulo minor est, desuper è fusco virescens, subtrus pallefcens ex albo. Cantillat ut *Acanthis*, & simili utitur alimonia.

4. COZTOTOTL seu *Avis pallida Mexicana* Hernand. *Canariensis* *Avis* magnitudine est, tota lutea, extremis tamen alarum partibus nigris. Cantu *Carduelis* imitatur.

Aviculæ crassirostræ minimæ.

Linariæ notæ sunt, 1. Magnitudo infra *Fringillas*: 2. Color ex cinereo & fusco mixtus aut varius. 3. *Cauda* nonnihil forcipata. 4. Extimæ caudæ pennæ marginibus tantùm albæ, 5. *Cantus* suavissimus.

A. 1. LINARIA vulgaris, The COMMON LINNET. Caput ex cinereo & nigro varium est, Dorsum ex nigro & rufo. Pectus albet, inferior *Venter* circa podicem flavicat. Prolobi regio seu infima gula pulcherrimè rubet, fimbriis pennarum luteis seu luteo-ruffis. Lini semine vescitur unde nomen, sed & *Cannabis*, & *Cardui*, & *Phala-*

Phalaridis, & *Milii*, unde & *Miliaria* nonnullis dicitur. Pedum color obscurè fuscus seu nigricans.

A. 2. LINARIA *rubra major*, The GREATER RED-HEADED LINNET. Præcedente aliquanto minor est. & verticis colore rubro, minùs tamen splendente, insignis. Pectus rubicundo colore tingitur.

A. 3. LINARIA *rubra minor*, The LESSER RED-HEADED LINNET. Præcedente minor est. Syncipus colore rubro seu miniato splendente insigne. A præcedente differt, 1. Quòd, ut diximus, minor est : 2. Quòd rostro minore & acutiore. 3: Quòd fœmina cum mare colore verticis rubro aliquatenus conveniat, secus quàm illius fœmina, quæ hâc notâ caret. 4. Quòd pedes huic nigriores. 5. Quòd caudæ pennarum margines angustius albicent. 6. Quòd alarum pennæ secundi ordinis albicent, & lineam albam ad alas transversam efficiant. Tandem 7. Quòd avis hæc gregaria sit, non item illa.

A. 4. LINARIA *montana*, The MOUNTAIN-LINNET. Præcedente duplo major est. Rostrum ejus simile, multo sci. pro corporis proportione minus quàm secundæ speciei. Color *Linariæ* vulgaris, Uropygium duntaxat pulcherrimo colore miniaceo splendet. Cauda prælonga ; Pennarum ejus omnium præter medias duas margines tam interiores quàm exteriores albet.

A. 5. SPINUS sive *Ligurinus* Aldrov. The SISKIN. Caput ei nigrum : Corpus supinum viride, scapi tamen pennularum in dorso nigricant. Uropygium è viridi flavicat ; Gula item & pectus, sed pallidiora sunt. Venter albus. Plumæ sub cauda flavescent, maculis fuscis oblongis secundùm scapi ductum pictæ. Area transversa lutea alas distinguit. In caveis alitur cantûs gratiâ. Caudæ mediæ duæ pennæ nigræ, reliquæ media plus parte pulcherrimè flavent summitatibus nigris.

6. PASSER CANARIENSIS. Magnitudo *Pari* vulgaris : Rostrum album, parvum, acutum. Alarum & caudæ pennæ totæ virides : exiguo sanè discrimine ab Aviculis quas Germani Citrinas vocant, aut iis quas Zise-las Germani, Itali Ligurinos, nisi quòd paulo major est, quàm utraq; illarum, huic aspectu similior, illa nonni-
hil

hil viridior. *Gesn.* Mas à fœmina differt, quod *pectus* & venter & capitis pars superior quæ rostro adjacet illi magis lutea sunt.

7. CITRINELLA seu *Thraupis*, *Verzellino* Romæ, *Citril* Viennæ. A *Spino* seu *Ligurino* & *Serino* differt
1. *Collo* cinereo. 2. *Prona* facie tota viridi. 3. *Caudâ* nonnihil forcipatâ. 4. Quòd nullas in lateribus maculas habet. *Circa Romam* frequens est.

8. SERINUS *Gesn.* Viennæ Austriæ *Hirngrill* Aldrov. lib. 18. cap. 20. *Dorsum* nonnihil rufum mediis plumularum partibus nigris. *Caput* luteum, *Uropygium* è viridi pulchrè flavet : *Pectus* luteo viride ; *venter* albus ; latera maculis nigris oblongis varia. *Rostrium* brevius & validius quàm *Citrinellæ*, extremitate acutum.

SPINUS seu *Ligurinus* à *Serino* & *Citrinella* differt. 1. *Corpore* tantillo majore. 2. *Rostro* longiore. 3. *Capite* nigro. 4. *Cauda* brevior & dimidia plus parte lutea. 5. *Areâ* in alis luteâ.

9. AVICULA AMADAVADÆA *Rostro* *Fringillæ*, *calcaribus* *Alaudæ*. *Regulum* cristatum magnitudine vix superat. *Rostrium* *Fringillæ* rubrum, superiore *mandibula* supernè nigra. *Supina* pars corporis fusca, circa *uropygium* obscure miniatæ. *Remiges alarum* nigræ, ut & *caudæ pennæ*, mediæ longiores, exteriores ordine breviores. *Maculæ* albæ rotundæ exiguæ in alarum *remigibus* & *vestitricibus*, in aliis plures, in aliis pauciores. *Pectus* & *venter* nigricant, *Pedes* albi.

10. PETRONIA marina *Bononiensibus* dicta. *Oenanthe congener* Aldrov. lib. 17. cap. 38. Ab aliis omnibus *aviculis* hæc distinguitur. 1. Quòd circa *mediam gulam* *maculam* flavam pulcherrimam obtinet. 2. Quod *singulæ caudæ pennæ* interiore *marginem* statim sub apice *maculâ* rotundâ albâ insigniantur ; aliàs nigricant, extremis *ramen marginulis* subviridibus. 3. Certissima nota ab *Hortulano* distinguitur, quòd *Rostrium* ei longè majus & viridius sit, & *Chloridis* *rostro* æquale.

12. TEITEI Brasiliens. *Marcgr.* Magnitudo *Rubeculæ* : *rostrum* breve, crassiusculum, nigrum. *Supina* pars tota nigra cum purpureo seu cœruleo splendore : *prona*
pars

pars tota lutea. Ad exortum Roſtri ſuperioris poſt nares maculam habet luteam. Crura & pedes fuſci. Faminae totius color viridis.

A V E S tuberculo, ſeu eminentia dura in ſuperiore roſtri mandibula donatæ.

A. 1. **EMBERIZA** alba Geſn. *Alaudæ congener* Aldrov. An *Calandra* ejuſdem & Bellonii? *Cenchræmus* Bellon. The BUNTING. *Alauda* vulgari major eſt, colore non multum diverſo; vel potiùs teſtaceo terreove. Mentum, pectus, venter ex luteo albeſcunt. Gula maculas habet nigras oblongas. Roſtrum grandiuſculum, tuberculo magno in ſuperiore mandibula. Latera mandibulæ inferioris altiora ſolito in angulum quendam aſſurgunt.

A. 2. **EMBERIZA** flava Geſn. *Hortulanus* Bellon. *Lutea* alterum genus Aldrov. *Chloris* ſeu *Lutea* *Ariſtoteliſ* Turn. The YELLOW HAMMER. *Fringillæ* vulgari æqualis eſt. Colore luteo quo perfunditur & ſingulari roſtri figura, facilè cognoscitur. Tegetum dorſi & ſcapularium pennarum mediæ partes nigricant, margines ex viridi ruſcunt. Humi nidificat.

A. 3. **PASSER TORQUATUS** in arundinetis nidificans. An *Passer Arundinaceus Turneri* Aldrov.? The REED-SPARROW. Magnitudine eſt *Fringillæ*; Roſtro cum præcedentibus convenit. Caput nigrum: maxillæ circa oculos ruſſæ: Cervicem torquis alba ambit, quæ ad angulos oris utrinque protenditur. Mentum & gula nigra; pectus & medius venter albeſcunt. Pennæ dorſales & alarum veſtitrices ex ruſſo & nigricante variæ. Uropygium ruſſum cinereo admixto. Pedes è carneo nigricant.

4. **LUTEÆ** primum genus Aldrov. *Cirlus* eidem dicta. *Zivolo* Olinæ à voce *Zi Zi* quam frequentiffimè repetit. Magnitudo *Passeris*, Roſtrum breve craſſum: Pectus & venter ſubflava maculis fuſcis conſperſa. Supina pars tota

rota ex testaceo ad fuscum tendit. *Mas* plus lutei natus est in capite & circa collum.

5. *CIRLUS Stultus* Aldrov. lib. 18. cap. ult. Luteis superiùs descriptis magnitudine par est, eadem prorsus figurâ & formâ. *Capitis* novissima pars superior, & dorsum totum ferrugineum nigris maculis satis amplis interstinctum. *Prona* pars tota itidem ferruginea. *Remiges* alarum & cauda subnigra, oris ferrugineis. *Alis* maculæ albæ nonnullæ insunt.

6. *HORTULANUS* Aldrov. Venetiis *Tordino* à maculis consimilibus. *Emberizæ* flavæ æqualis & similis est. *Rostrum* breve, in mare rubescens. *Gula* & pectus cinerea, reliqua pars prona ad caudam usque ruffa: *uropygium* intensius ruffum. *Maribus* pectora rufescunt, macula sub rostro flava; *Caput* cinereo-viride. *Dorsi* tegum mediæ partes nigræ, exteriores vel ruffæ vel cinereo-virides.

A *Passere torquato* differt, 1. *Loco*, cùm *Passer torquatus* inter *Arundines* plurimum degat. 2. *Colore*; nam *Hortulanus* magis ruffus est, nec torquem ullam habet, quâ ille donatur: *Præterea* maculam flavam sub gutture obtinet, quâ ille caret.


Sex hujus *Avis* seu *Species*, seu varietates proponit *Aldrovandus*.

1. *Hortulanum flavum*, pennarum alæ remigum extremitatibus albis. 2. *Hort.* totum candidum. 3. *Hortulano congenerem*, *Capite* ex cinereo flavicante; *collo* cinereo nigris maculis punctato; *ventre* & *cruribus* pedibusque totis croceis &c. 4. *Hortul.* *collo viridi*, *rostro* rubicundo, *cruribus* cinereis, cætera nigricante. 5. *Hortul.* *albicillum*, toto etiam corpore pallidiore. 6. *Hortul.* *Sipolæ congener*, *rostro* longiusculo; *pedibus* fuscis; toto item corpore fuscescente, *pectore* & alarum extremitatibus albis. Hæc *Avis* cum *rostro* sit longiusculo ad *Avicularum tenuirostrarum* genus pertinet.

AVES AQUATICÆ,

Et primò FISSIPEDES quæ circa aquas versantur, iis tamen non innatant.

1. Maximæ, singulares & sui generis.

A. 1.  R U S, Γέρας, The Crane. Ex Europæis in Aquaticarum Fissipedum genere maxima est, collo & cruribus longissimis, caudâ brevissimâ; colore cinereo. Capitis vertex pilis potiùs quàm plumagine vestitur. In occipitio areolam habet lunulatam nudam, aut raris pilis obsitam, rubicundam. Ductus, seu mavis lineæ latæ albæ binæ, à singulis oculis singulæ, retrorsum tendentes coeunt ad verticem maculæ cujusdam triangularis cinereæ in suprema cervicis parte, infra lunulam sitæ, & deinde ad pectus continuantur. Guttur & cervicis latera nigra. Aspera arteria sternum ingreditur, ibique variè reflectitur, ut in *Cygo fero*. In palustribus *Lincolniensibus* & *Cantabrigiensibus* magni horum greges hyberno tempore inveniuntur. Carne est satis sapida & salubri, nec enim *piscibus* vescitur, sed *granis*.

2. G R U S *Indica*. Præcedente minor est, ejusdem cinerei coloris: *Rostro* longiore. Præcipua differentia est, quòd summum caput à rostro ad verticem cute scabrâ, rubrâ, raris pilis obsitâ insigniatur. In Ornithotrophio Regio in *Parco S. Jacobi* hanc vidimus. Hæc est (ut puto) *Toquilcoyotl Franc. Hernandez*.

3. G R U S *Balearica* Aldrov. Nonnullis, & fortasse rectiùs, *Pavonis* genus habetur, nam ipso *Aldrovando* fatente & vocem & mores *Pavonis* imitatur. Figurâ corporis *Ciconiæ* similis est, *rostro* tamen brevior non *Ciconiæ* tantùm sed & *Gruis* *rostro*. *Cristam* habet in capite rotundam, densam ex setis, *Porcinis* similibus, quaquaversum diffusis, compositam, colore spinularum *Erinacei* res

vulgaris. In maxilla utraque macula alba lineâ rubrâ in summa parte terminata. Remiges alarum pennæ minores albæ, aliàs tota avis nigra est. Sub *rostro* rubra ex-crescentia velut *palea* quoddam utrinque dependet. *Tibiæ* longæ. In regionibus propè *Caput viride* reperiuntur. Hanc etiam in *Ornithotrophio Regio* vidimus.

4. JABIRU Brasiliensium *Marcgr.* Belgis *Negro*. Magnitudine *Cygnum* superat: collo longo 14. dig. crasso; *rostro* nigro, recto, superius versus extremitatem paulatim incurvato, 11. dig. longo $2\frac{1}{2}$ lato. *Linguâ* caret. *Crura* longissima, 2 pedum, nigricantia, supra genua nuda; Totâ Avis alba *Cygni* instar. *Collum* fere totum nudum; hujusque medietas cum capite cute nigra tegitur, reliqua albâ. *Rostrum* in *Museis* curiosorum sæpius vidi.

5. JABIRU GUACU *Petiguaribus* Nhandu apoa *Tupinambis*: Scurvogel *Belgis*. *Rostrum magnum* $7\frac{1}{2}$ digitos longum. Caret *linguâ*. In summo capite mitra nigerit osseam, coloris albi & cinerei mixti. *Caput* & dimidia pars colli (quod 10 dig. longum) nuda, cute squamosâ cinereâ tecta. Magnitudo *Ciconiæ*: *Cauda* brevis nigra; alarum etiam pennæ remiges nigræ, cætera tota avis alba. A collo longiusculæ pennæ propendent. *Crura* longa.

6. CARIAMA Brasiliensibus *Marcgr.* Magnitudine est *Ardea*. In capite ad rostri exortum *cristam plumatam* gerit nigram cinereo mixtam. *Rostrum* breve, ex obscuro flavo fuscum: *irides* oculorum aureæ: *Crura* longa. Totum corpus pennis vestitur griseis seu cinereis fusco undatis, ut in *Falconibus*. *Extremæ alæ*, & *cauda* fusca, obscure flavo & griseo undata. *Cauda* demissa. Clamor Gallo-pavonis. Grui *Baleariæ* dictæ congener est.

7. ANHIMA Brasiliensium *Marcgr.* *Cygnus* major est, & *Rapacium* genere, *rostro* nigro, paulum adunco: *iridibus* oculorum aureis. In capite propè rostri exortum cornu gerit erectum, antrorsum incurvum, duum digitorum, rotundum, albicans. *Alæ* amplissimæ; in cujusque antica parte duo *cornua* recta, triangulata, ex ipso osse enata obtinet. Vertex plumulis albis & nigris variegatus est: guttur & superior pars colli nigricat, inferior ejusdem medietas & *pectus* variegantur pennis albis nigris

gris & cinereis : *Venter* inferior albus. *Dorsum* & *latera* cum *cauda* & *alis*, exceptis *oris* extremis, nigra.

*Aves aquaticæ fissipedes piscivoræ, ranivoræ
& serpentivoræ.*

A. 1. **CICONIA** *alba*, *The white Stork*. Πέλαγος Græcis. In littoribus nostris interdum sed rarius cernitur ; apud nos non nidificat. D. *Tancr. Robinsonus* se templis Cathedralibus Ciconias insidentes sæpius vidisse affirmat. *Ardeâ* cinereâ major est, collo tamen brevior & crassior. *Caput*, *collum*, pars corporis anterior, & *venter* alba : *Uropygium* & pennarum alæ partes inferiores nigræ, unde alis contractis (sub quibus *cauda* alba brevissima occultatur) pars dorsi inferior nigra apparet. *Rostro* & *pedibus* est miniaceis, unguibus latis, humanis similibus. *Rostro* autem crepitat creberrimo mandibularum ad se mutuo appulsu. *Ranas* & *cochleas terrestres* libenter esitat : *Serpentes* etiam vorare dicitur.

2. **CICONIA** *nigra*. Præcedenti æqualis est. *Collum*, *caput*, *dorsum*, *alæ* nigræ, splendentes, cum aliqua viridis mixtura ; colore ei non absimili qui in *Corvis marinus* cernitur : *Venter*, *pectus* & *latera* alba. *Rostrum* viride, ut & *tibiæ*, ad *genua* nudæ. Verùm *Joan. Faber*, *Notis in Animalia Novæ Hispaniæ*, gratissimum esse ait in oculorum orbita, in toto *rostro*, in cruribus *pedibusque* puniceum & minium Antiquorum sive Cinnabrium nostrum æmulantem ruborem. In quo diversa ejus *Ciconia nigra* ab Ave nobis *Francofurti* visa & descripta. Nostra forte junior erat. *Rostro* crepitat ut præcedens.

3. *Ciconia Americana*, MAGUARI Brasiliensibus *Marcgr*. Figura & magnitudine *Ciconiæ* similis est, & ex parte etiam colore. *Pedes* quoque rubri ut *Ciconiæ* nostratis : *Caudâ* pariter brevi est & albâ. *Caput*, *collum*, totumque corpus albis vestitur plumis. *Alæ* in exortu albis integuntur pennis, sed prope *dorsum* nigris : nigredini autem persplendet viriditas. *Rostrum* ab exortu ad mediam

H

partem

partem ex viridi flavescit, reliqua ex cœruleo cinerea. *Roſtro* crepitat ut *Ciconia* noſtras.

IBIS nigra Bellonii. *Corpore* eſt *Elorii*, aut paulò minor : *Capite Corvi aquatici* : *Roſtro* qua capiti jungitur pollicis craſſitiem ſuperante, ſed per extremum mucronato, & incurvo nonnihil, atque fornicato, & omnino rubente, ut & cruribus quæ longa ſunt & *Ardeæ ſtellaris* ſimilia. *Collum* etiam oblongum *Ardeolæ* inſtar habet.

Ægyptiis utiliſſima eſt ad *ſerpentes*, *locuſtas* & *bruchos* delendos quibus regio illa præcipuè infeſtatur.

ARDEARUM genus.

A Rdeæ piſcivoræ ſunt, unde & *roſtris* longis, validis, acutis ad piſces feriendos donatæ; *crura* iis prælonga ad aquas altiùs ingrediendum; *digiti*, præſertim poſticus, longiſſimi, ut in fluviis firmiùs ſtare poſſint : *ungues* validi & adunci, medio ab interiore latere ſerrato, ad anguillas aliâque lubrica firmiùs retinenda. Certiſſima autem *Ardearum* nota, quâ ab aliis omnibus Avibus diſtinguuntur, eſt inteſtinum cœcum ſingulare, ut in *Quadrupedibus*, cùm pleræque aliæ geminum habeant.

A. 1. ARDEA cinerea major, *The common Heron*. *Epwadès*. *Vertex* albus; ab occipitio criſta nigra longa dependet. *Gula* alba, maculis nigris pulcherrimè picta. Color totius varius è cinereo, albo, nigro, flavicante, in quibus eminet cinereus. *Arboribus* inſidet, inque iis *nidificat*. *Roſtrum* è viridi flavicat : *Crura* & *pedes* virides. Sedet capite inter armos adducto, collo intorto. *Piſcibus* præcipuè & *ranis* victitat, nec tamen herbas averſatur, nam in diſſectæ ventriculo *Lenticulam paluſtrem* invenimus.

2. ARDEÆ cinereæ tertium genus *Aldrov*. Cùm nullam notam inſignem habeat, quâ à cinerea majore certò poſſit diſtingui; deſcriptio ejus integra videatur apud ipſum, vel in Ornithologia D. *Willughby*.

3. ARDEA

3. ARDEA cinerea minor, Germanis Nycticorax. The lesser Ash-coloured HERON or NIGHT-RAVEN. Ardea cinerea vulgari minor est multò & collo brevior. Dorsum & vertex nigra; Collum cinereum: Gula & venter sublutea. Rostrum nigrum. à rostro ad oculos linea alba extenditur. Ab occipite tres plumulæ seu cirrhi, 5 dig. longi retrorsum dependent. Alæ & cauda cinereæ. Pedes ex flavo virescunt. Nycticorax vocatur quoniam inter noctu clamat voce absone & tanquam vomiturientis.

A. 4. ARDEA alba major, The great WHITE HERON, A cinerea majore differt, 1. Colore undique candidissimo, & planè niveo. 2. Magnitudine, quâ illi cedit. 3. Longitudine caudæ. 4. Quodâ cristâ careat. Hanc in Angliâ D. Johnson observavit.

5. ARDEA alba minor seu Garzetta Gesn. & Aldrov. Ab alba majore differt quod longè minor sit, quodque cristam habeat, quâ illa caret.

6. Ardea alba minor, tertia Aldrov. Præcedente minor est sed carnosior. Vertice & cervice crocea, pectore quoque, sed remissius. Collum quàm in aliis Ardeis brevius.

7. Ardea hæmatopus seu Cirris, Virgilii Scaligero: Aldrov. Ardearum fere minima est, collo admodum brevi, tota ferè ex croceo ad colorem Castaneæ vergens, pronè intensius, supinè & super alas remissius. Cauda tam exigua, ut eâ prorsus carere videatur. Rostrum ad caput cœruleo-viride, extremum atrum. Crura & pedes saturatè rubri.

8. Ardea quam SGUACCO vocant in vallibus dictis Malalbergi Aldrov. Caput cirratum: Rostrum brevius sed robustum: magnitudo præcedentium par. Color ex luteo ferrugineus: Caput totum collumque luteo, albo & nigro variant, Pronè ad ventrem candicat, quemadmodum etiam cauda, & potior alarum pars.

9. Ardea vulgò SQUALIOTTA dicta Malalbergi Aldrov. Rostro est luteo, in extremo nigricante, cauda brevi, pedibus viridibus. Apex capitis 30 pennis constat, quarum mediæ albæ sunt, extremæ nigræ. Sunt & in tergo ejusmodi elegantes pennæ, coloris rubicundi, radicibus albis.

10. *Ardea minor alia*, rostro arcuato Aldrov. Ad *collum* & *pectus*, quod nigris maculis, ut in *Ardea*, deorsum descendentibus conspersum cernitur, albicat. Cætera *Avis* tota *leucophæi* coloris est, pronè remissioris, supinè intensioris.

A. II. ARDEA *stellaris*, The BITTOUR or BITTERN. Color totius corporis varius est ex ruffo & nigro, seu potius ruffus nigris lineolis & lituris variegatus. *Pedes* virides. *Rostrum* ad basin crassum, paulatim in mucronem acutum tenuatur. *Septentrionalibus* Anglis The MIRE-DRUM dicitur à mugitu, qui à longinquo exaudiri potest. *Aristoteli* 'Ορνὸς i. e. piger à segnitie & tardio volat, nec immeritò, dicitur. In *Funcetis* & *Arundinetis* latitat. Vox mugitum referens Avem hanc ab aliis omnibus nobis cognitis abunde distinguit. Magnitudo *Ardeæ cinereæ* vulgaris.

12. ARDEA STELLARIS *tertium genus* Aldrov. *Epidauro* missa undique sibi concolor erat, nempe subruffa, pronè minùs, supernè magis.

13. ARDEA STELLARIS *major seu rubra* Aldrov: Spuriuni genus esse videtur inter stellatam & cineream, quamvis ad hanc magis accedat; unde rectiùs inscriberetur, *Ardea cinerea pectore & lateribus ruffis*: *Dorsum* obscuriùs cinereum: Ad *scapulas setæ* longiusculæ ruffæ. *Vestitrices* minores *Alæ* pronæ ruffæ, *femora* ex albo ruffa: utrinque juxta pectus *areæ* latæ ruffæ: in quarum medio ad latera colli *linea* lata nigra: imum collum ruffum. In reliquis cum *Ardea cinerea* convenit.

ARDEÆ EXOTICÆ.

14. SOCO *Brasiliensibus* Marcgr. Toto habitu *Ardeam* referre videtur; magnitudine *Ardeæ* minoris, *cauda* brevi. *Caput* & *collum* brunnis quibusdam pennis, sed quæ punctulis nigris variegatæ sunt, vestiuntur; *Venter* quoque ad eundem modum. Sub *alis* denique nigro & albo variegatæ sunt pennæ.

15. *Ardea Brasiliensis* COCOI dicta Marcgr. Magnitudo *Ciconiæ*; *Rostrum* 6. dig. longum: *Irides* oculorum aureæ; *cutis* circa oculos cinerea: *Guttur* & totum collum

lum alba sunt : Summitas *capitis* & latera nigra cum cinereo mixto. Ejusdem coloris *cristam* pulchellam gerit, è qua duæ elegantes plumæ deorsum posterius dependent, 5^t dig longæ, nigro cinereæ. Anterius collum secundum longitudinem maculatum est plumis è nigro & cinereo mixtis. In *colli* parte anteriore & inférieure elegantes habet plumas, longas albas, subriles propendentes, (in dorso cinereas) quas in pileis gestare solent. Supina pars reliqua, dorsum, alæ, cauda, dilutè cinerea.

16. ARDEA *Brasiliensis* *rostro serato, cinereæ similis* Marcgr. *Anati domestica* par est aut major ; *Rostri* medietate anteriore tam superius quam inferius dupliciter serrata, 4 $\frac{1}{2}$ dig. long. *Irides* oculorum aureæ. Totum *caput* & *collum* superius pennas habet longiusculas, pallidè flavas, nigro undatas. *Collum* inferius, *pectus*, & *infimus venter* plumas habent albas fusco undatas, *dorsum* & *alæ* fuscas flavo undatas. Alarum remiges è nigro & cinereo æquali parte mixtæ sunt, extremitatibus albis : *Caudæ* pennæ transversim albo lineatæ.

17. GUIRATINGA *Brasiliensibus*. *Gargæ Lusitanis*, *Ardeæ* species *Marcgrav.* *Albardeolæ* est magnitudine & figura : *Rostro* recto acuto, flavo, 4. digit. longo. Per totum corpus albissimis vestitur pennis, in *collo* elegantissimis plumulis albis. Avis hæc à quarta specie seu *Ardeæ* alba majore *Europæa* nulla fere in re, excepta magnitudine. differt.

18 ARDEOLA *Brasiliensis* Marcgr. *Columbæ* magnitudine vix par, *collo* longissimo (7. dig.) Ad basin rostri cutis melini coloris. *Caput* supernè coloris est chalybei, pennis pallidè fuscis inspersis. Totum *Collum*, *pectus* & *venter* infimus plumis albis & leucophæis velut variegatus. *Dorsum* nigrum, & ex parte chalybeo-fuscum, cerei coloris pennis admixtus. *Alarum* pennæ longæ virentes, in extremitate maculam habent albam ; reliqua superficie ex fusco, chalybeo, cereo & leucophæo eleganter variegata. *Pedes* melini.

In omnibus hisce *Ardeis* *Rostrum* longum est, rectum, acutum, inferius ad exortum aut flavum, aut flavo-viride, extremo nigrum. *Crura* superiora ad mediam par-

tem nuda: Oculorum irides aureæ: Cauda brevis, nec ultra alas extensa.

19. ARDEÆ congener *Aldrov.* seu *nigra*. Licet collo sit quàm *Ardeæ* longè brevior, reliquo tamen corporis habitu *Ardeam* exprimit. Color ubique uniformis, nigricans, excepto collo, quod albo torque circumdatum, & *rostre* quod luteum est, & extremo nigrâ maculâ, tam infima quàm superna patte, notatum.

20. ARDEOLA *litoralis variegata* Mus. 1 eyd.

21. XOXOUKQUI HOACTLI, *Hoc-tien*, seu *Ardea* cinerea minor *Mexicana* cristata. *Crista* septem purpurascensibus plumis constat. Nomen invenit à voce, sonat enim *Hobo*. *Rostrum* serratum nigrum. *Hernand.* cap. 6. & cap. 126.

22. *Ardea* MEXICANA minima candidissima. HOITZILAZTATL dicta *Hernandez*. *Rostrum* est purpureo, ad exortum luteo, pedibus pallidis & purpurascensibus cruribus.

1. Platea sive Pelecanus *Aldrov.* Leucorodius seu Albardeola aliis, Belgis *Lepelaer*. The PELLICANE or SPOONBILL. Colore totius corporis, Cygni instar, candidissimo. Figura *rostri* plana & depressa, prope extremitatem in circularem ferè figuram dilatata ad similitudinem cochlearis; & magnitudine insigni *Ardeam cineream* superante ab aliis avibus abundè distinguitur.

2. TLAUHQUECHUL seu Platea Mexicana *Hernandez*. *Nicremberg*. Specie similis est præcedenti, sed coccineo pulcherrimoque universi ferè corporis colore, aut ex albo rubrescenti, depili penè capite candentique cum universo ferè collo & parte pectoris, & fascia nigra latiuscula caput à collo distinguente. *Rostrum* latum & circa finem obrotundum cinereumque.

3. Platea Brasiliensis AIAIA dicta, Lusitanis Colherado *Marcgr.* Magnitudo *Anseris*: Figura *Plat. Europææ*. Tota alba est, sed in dorso & alis dilutè incarnati coloris persplendentis. *Rostrum* album. Præcedenti eadem esse videtur.

*Aves aquaticæ fissipedes mediæ magnitudinis
& minores,*

I. Rostris longissimis curvis.

A. 1. **NUMENIUS** five *Arcuata major*, The CURLEW. Magnitudine ad *Phasianum* accedit. Color ex cinerascens & nigro varius, nos Grey vocamus seu griseum. Carne habetur delicata. In maris littoribus arenosis invenitur.

A. 2. **ARQUATA** minor nostras, a WHIMBRELL, Venetiis *Taraniolo*. In arenosis ad *Tesæ* fluvii ostia frequens. Præcedente dimidio minor est, *rostro* plus digito brevior; *vertice* obscurè brunneo absque maculis; *Dorso*, quatenus alis tegitur, albo, secus quàm in illo; in univèrsum toto corpore obscurior est seu magis fusco.

Gallinulam phæopum Gesn. Aldrov. l. 20. c. 40. cum hac Ave eandem esse suspicor:

Gallinula phæopus, altera, seu *Arquata* minor Gesneri, quin cum nostrate *Arquata* minore eadem sit minimè dubito, cùm & nomina & descriptiones conveniant.

3. **FALCINELLUS** Gesn. & Aldrov. Magnitudine & tota fere corporis specie *Ardeam* refert. Caput, collum, dorsum, pectus, venter, femora, uropygium coloris sunt spadicei ad fuscum tendentis; sed collum & pectus etiam maculis quibusdam fuscis oblongiusculis resperguntur. In medio dorso macula quædam est coloris viridis obscuri, qui color etiam in alis & cauda conspicitur. Rostrum subnigrum est, valdè longum & anteriùs falcatum. Pedes rostro concolores. Ad *Ibidem* accedit.

4. **CURICACA** *Brasilensium* Marcgr. Masarino Lusitanis. Numenio similis est, magnitudine Anseris: Pedibus rubris; Rostro incurvo, 6. dig. longo, coloris ex igneo fusci. Caput & collum plumas habent albas cum flavo mixtas. Circa oculos & sub origine gutturis cutis nigra. Totum corpus nigris pennis vestitur, excepto dorso, ca-

pite & ventre, ubi cineræ obscuræ ; & in medio alarum albæ cano mixtæ ut in *Ciconiis*.

5. *ACACALOTL* seu *Corvus aquaticus* *Hernand.* *Nieremberg.* *Rostrum* arcûs instar incurvum est, duos palmos longum, cyaneum. *Caput*, *collumque* pennis fuscis, albis, ac viridibus teguntur, ac paulisper flavescensibus. *Plumæ* infernæ fuscae insertis rubris, superiores verò promiscuè purpureæ, subnigræ, virides atque splendentes. Ab externis oculorum ungulis usque ad rostrum uncia unius intervallo deplumis & glabra est pellis, virescensque ex albo.

6. *GUARA Brasiliensibus* *Marcgr. Numenius Indicus* *Clus. exot. Magnitudo* *Albardeolæ* : *Rostrum* ensis *Polonici* figurâ longum & incurvum. *Crura* longa & tenuia, ex albo grisea, uti est & *Rostrum*. Tota avis vestitur pen- nis elegantis coloris coccinei : *Remiges* duntaxat alarum nigras habent extremitates. *Clusi* avi crura & rostrum pæne ut ochra flavescabant. Primùm exclusa coloris est nigricantis, & coccineum illum colorem ætate paulatim acquirit.

7. *GUARAUNA Brasiliensibus* *Marcgr.* *Magnitudi-* ne est *Jacu*, *Rostro* recto, paulò deorsum inclinato, flavo, extremo fulco. Tota pennis vestitur fuscis, multâ umbrâ mixtis, *Caput* autem & *collum* albo punctulatum, ut in *Jacu*.

II. Rostris longissimis rectis.

A. I. *SCOLOPAX, Gallinago maxima*, The WOOD- COCK. *Perdice* tantillo minor est ; supina parte è ruffo, nigro & cinereo variâ, pulcherrimo aspectu. *Pectus* & *venter* cinerea lineis transversis fuscis. Autumno ad nos advolat, & per totam hyemem hîc moratur. Vere primo iterum discedit. *Sylvas* præsertim humidas & rivu- los ad sepes frequentat. Apud nos interdum nonnullæ lociis discedentibus casu aliquo relictæ nidificant & pari- unt. Carne habetur delicata, & cruscula præcipuè com- mendantur. Ob stoliditatem infamis est hæc avis, adeò ut *Scolopax* Anglis pro stolido proverbialiter accipiatur.

A. 2. GALLINAGO minor, *The SNIP^e, or SNITE.* Magnitudine *Scolopace* duplo minor est, colore non multum diversa, verum in dorso pulchrius colorata in scapularibus pennis colore vario ex nigro & subrufo viridi ferriceo interlucente, *Pectus & venter* fere tota alba. In *palustribus* & circa *rivulos* versatur.

A. 3. GALLINAGO minima seu *tertia* Bellonii, *The GID, or JACK-SNIPE, or JUDCOCK.* Gallinaginis minoris subdupla est, unde Gallis *Deux pour un* dicitur. *Uropygii* color cœruleo-purpureus splendens, ei qui in *Sturni* dorfi cernitur simillimus. Pennæ scapulares interiore limbo cœruleo splendente colore nitent, absque ulla tamen purpuræ mixtura.

A. 4. BARGE seu *Ægcephalus* Bellon. *Fedoa* Gess. *The YARWHELP, or YARWIP, Scolopaci* similis est & æqualis, aut tantillo major. *Caput* ex rufo cinereum, mediis sc. plumularum nigris. *Dorsum* rufo nigro & albicante coloribus varium, mediis sc. pennularum nigris, marginibus ex albo rufescentibus. *Pectus* sordide albicat; in mare lineis nigris transversis depictum. In ave quam descripsi *uropygii* seu dorfi infimi regio maculâ albâ triangulari, vertice caput spectante, insignis erat. In *maris litoribus arenosis* versatur, & victum quaerit.

A. 5. FEDOA nostra secunda seu *Totanus* Aldrov. *The GODWIT, or STONE-PLOVER.* *Uropygium* albo torque seu annulo cinctum, ut in *Pygægo* Accipitre. Differt à præcedente 1. Colore *caudæ*, cujus pennæ in illa *azeolis* transversis albis & nigris alternis variæ; in hac ima parte & pinnulis exterioribus albæ exteriores interioribus ordine magis magisque, mediis duabus penitus nigris. 2. Colore *dorfi* & partis supinæ, quæ in hac varia est, in illa unicolor. 3. Magnitudine, quâ ab illa deficit.

A. 6. FEDOA nostra *tertia*, *The STONE CURLEW* Cornubiensibus. Differt à superioribus, quoddam *rostrum* habeat brevius tenuiusque quàm illarum utraque.

A. 7. HÆMATOPUS Bellonii. *Pica marina* Gallorum & Anglorum, *The SEA-PIE.* *Rostrum* triunciale, rubrum,

rubrum (uti sunt & pedes) ad latera compressum, Digito postico caret. Color totius ex albo & nigro varius, unde Picæ nomen. Patellis victitat, ad quas subruendas rostrum valde accomodum nacta est. In litoribus maris Occidentalibus frequens habetur.

A. 8. *PLUVIALIS* major Aldrov. *Limosa Veneto-*rum Gesnero; item *Glottis* eidem & Baltnero. *Rostrum* nigrum $2\frac{1}{2}$ digitos longum. Color *supinæ* partis ex fusco & cinereo albicante varius [Gray] *Prona* pars tota alber, ut & infimum dorsum seu uropygiam. *Cauda* lineis albis & fuscis alternis undulatis varia. *Crura* longissima, colore inter viridem & lividum medio. In *Dunelmensis* Episcopatus *maritimis* observavit D. Rad. Johnson, amicus noster singularis non ita pridem defunctus, totius Historiæ Naturalis peritissimus.

9. *HIMANTOPUS* Plinii Aldrov. lib. 20. cap. 30. *Prona* parte tota candicat; *supina* nigricat. In collo tamen superno maculæ sunt nigræ, deorsum vergentes. *Crura* femorâque mira longitudine, admodum gracilia & debilia, eoque debiliora ad insistendum, quod *pedes* digito postico careant, & anteriores pro pedum longitudine breves sint. *Pedes* & *crura* sanguinea, *ungues* nigri. *Rostrum* nigrum, palmum & ampliùs longum.

10. *Crex Bellonii*. Cruribus ut *Chevalier* Gallis dicta, i.e. *Limosa*, longis est, major tamen illâ, *Elorio* minor; *rostro* etiam longo & nigro, nigris quoque tibiis & toto capite; *Collo* tergo & pectore candidis, superiores aliæ corporis partes ad cinereum tendunt. *Alæ* subnigræ sunt, quas prope costas linea alba utrinque transversim secat. *Circa* Nilum *Bellonius* vidit; & *Aristotelis* *Crecem* inde esse conjicit, quod dum clamat *Crex Crex* sæpius repetat.

11. *Totanus* alter, an *Totanus* Gesneri Aldrov.? An *Callidrys* rubra *Bellonii*? *Pedes* è flavo rubent: *Rostrum* brevius nonnihil quàm *Pluvialis* majoris Aldrov. superiùs traditæ: *Collum* & *caput* è fusco cinerea, supra oculos linea alba, cætera cum illa convenit. Fortè sexu duntaxat differt. *Callidrys* rubra *Bellon.* ab hac differt quod *collum* & *pennæ* sub alis & uropygio cinereæ sint, quodque in temporibus utrinque maculæ binæ nigræ, quæ ceu umbram

umbram præbent superciliis, quæ & ipsa maculâ albâ insignia sunt.

Aves circa aquas versantes, rostris mediæ longitudinis.

A. 1. **TOTANUS** *Gesn.* Item *Gallinula erythropus* major ejusdem. *The RED-SHANK, or POOL-SNIPE.* *Vannello* minor est, ad *Pluvialem* accedens. *Color* supinæ partis ex fulco cinerea aut virescens : *Gula* albo & nigro varia, lineis nigris secundum longitudinem pennarum ductis. *Prona* pars alba. *Cauda* & pennæ eî proximæ lineis albis & nigris transversis cymatili ductu variæ. *Rostrum* duos digitos longum, ad exortum rubrum, versus extremum nigricat. *Pedes* pulchrè rubent, unguiculis nigris. In *arenosis* maris litoribus ubique circa *Angliam* frequens.

2. **GAMBETTA** *Aldrov. lib. 20. cap. 26.* *Totano* *Gesn.* affinis est : *Vanello* aliquanto minor : *supina* parte ex fulco cinerea seu grisea, colore *Anatum* *fœminarum* aut *Arquatæ*. *Pedes* & *crura* longa lutea : *ungues* nigri. *Rostrum* quàm *Totani* brevius, colore aliàs simile. *Cauda* *femipalmaris* quàm *alæ* complicatæ excedunt & occultant.

A. 3. **AVIS PUGNAX** *Aldrov. The RUFFE, Anglice* dicta, à plumarum longiorum torque sub capite gulam cingente ; *fœmina*, *The REEVE* dicitur. *Rostrum* præcedentis simile : cui & *Avis* magnitudine respondet, pondere quincunciali. Mira est in maribus colorum diversitas, ut nè duæ per omnia sibi mutuò similes inveniantur. Post pennarum defluxum media æstate omnes similes esse aiunt. *Mares* admodum pugnaces sunt, nec desistunt antequam hic ab illo occidatur. *Supina* pars in fœminis cinereo, albo & nigro coloribus varia : *prona* tota albicat. In palustribus *Lincolniensibus* æstate circa *Crowlandiam* nidificat.

A. 4. OEDICNEMUS Bellonii. *Charadrius* Gesn. Aldrov. The STONE-CURLEW. *Avis* est majuscula, pondere sesquilibrali; *Rostrum* recto, duos digitos longo, extremo acuto, ad nares usque nigro, inferius luteo. Sub oculis area est nuda, flavo-viridis. *Pedes* lutei; digito postico carent. *Tibiae* infra genua admodum crassae sunt, unde *Oedicnemus* Bellonio nominatur. Color *Arquatae* simillimus, unde STONE-CURLEW *Norfolciensibus* dicitur, apud quos circa *Thetfordiam* invenitur. *Bellonius* cum primò versaretur in *Anglia* eam observavit.

A. 5. CANUTI *avis* i. e. KNOT *Lincolniensibus*; an *Pilvenckegen* Aldrov.? An *Callidrys nigra* Bellonii? Pondus $2\frac{1}{2}$ unc. Color capitis & dorsi ex cinereo fuscus. Linea transversa alba alas distinguit. *Rostrum* sesquidigitale nigrum. *Pedes* virescunt; *Ungues* nigri. Caro in deliciis habetur.

A. 6. TRINGA minor, The SAND-PIPER, *Eboracensibus*. An *Cinclus secundus* seu minor Aldrov.? *Gallinula hypoleucos* Gesn. Pondere ad duas uncias accedit. Collum medium cinerascit, aliàs supina facies tota ex fusco viret, lineis transversis obscurioribus pulchrè variegata. Caput pallidius, lineis non ad pennulas transversis sed secundum scapi longitudinem ductis. Latera, pectus, venter alba. *Rostrum* summum ex fusco nigricat, imum albicat. *Pedes* pallidè virescunt. In *maritimis*.

A. 7. TRINGA Aldrov. *Cinclus* Bellon. Magnitudine *Merulam* æquat, vel etiam superat. Color supinae partis in fusco subviridis, & Serici instar splendens. *Pennae* scapularum & interscapulii, necnon alarum remiges corpori proximæ, & vestitrices pleræque punctulis albis crebris ad margines pinguntur. *Cauda* incumbentes pennæ nivæ. Gula alba maculis fuscis: *Pectoris* autem & ventris totius, color niveus. *Rostrum* sesquidigitale, obscurè viride, rectum, ad latera compressum. *Pedes* è livido virescunt. *Ungues* nigri. *Ala* notha interior nigricat, lineis albis crebris obliquis in angulum obtusum ad scapum coeuntibus perbellè depicta.

8. *TRINGA* *tertia* Aldrov. Giaroncello & Pinirolo *Italica dicta*. Huic *Rostrum* quàm superiori multò nigrius & aliquanto brevius. Eadem est corporis specie, coloribus tantùm aliquid evarians : nam cùm utraque colore præsertim fusco & castaneæ sit in *capite* collo, tergo, aliisque ; illa in omnibus his partibus plus fusci, hæc plus alterius coloris obrinet.

9. *GALLINULA melampus* Gesnero Aldrov. lib. 20. cap. 45. *Rotknuffel* Baltner. Colore est ruffo vel subrubicundo cum maculis fuscis in collo & circa oculos. Corpus fuscum est cum maculis quibusdam sordidi coloris. *Alas* maculæ albæ distinguunt. *Rostrum* & pedes nigri. Diversa videtur avis quàm Aldrovandus *Giarolæ* nomine pro hac describit : cujus descriptionem vide.

10. *GALLINULA erythra* Gesn. quàm Germani *Matkern* vocant. *Matknelzel* Baltner. Etsi corpus totum ferè rubicundum sit (*ventrem* albicantem rubro tamen subruffum & crura leucophæa excipio) obscurior tamen is rubor in *dorso* est, & maculis nigris interceptus, clarior in alarum aliquot pennis in quibus longissimæ ad rubricæ fabrilis colorem accedunt In *collo* inferiùs puncta quædam albicant. *Rostrum* nigricat non abique rubore.

A. 11. *ARENARIA* nostra i.e. *SANDERLING*, aliis *CURWILLET*. *Tringam* minorem magnitudine nonnihil superat, *rostro* digitali, recto, nigro, gracili, *Gallinaginis* simili. *Crura*, pedes, unguiculi nigri, & quod præcipuè notabile est, digito postico caret. *Caput* parvum. *Supina* pars tota ex nigro & albo vel cinereo varia pulchram speciem exhibet. *Venter* & partes subalares nive candidiores. Linea alba transversa in alis expansis supinis cernitur, qui in apicibus pennarum secundi ordinis hæret. In *maris litoribus arenosis* degunt, & gregatim volant. Avis est *tridactylos*, quâ notâ ab aliis distinguï facilis.

A. 12. *DUNLIN* *Septentrionalium* Anglorum D. Johnson. Descriptionem vide in Historia D. Willughby. *Venter* medius nigrescit, albo undulatus. Pars *supina* tota ruffa, maculis nigris majusculis ubique interstincta

cum modico albo. *Gallinagini* minimæ par est. *Rostrum* & pedes nigra : posticus digitus brevissimus. Q. Annon hæc avis eadem sit proximè sequenti ?

A. 13. CINCLUS prior Aldrov. *Schæniclos* seu *Funco* Bellonii, quam *Galli* Alaudam marinam vocant. The STINT, in *Suffex* The OX-EYE. Alaudæ vulgari æqualis est aut tantillo major. Figura *Gallinaginis*, rostro etiam simili, sed nigro, $1\frac{1}{4}$ digit. longo. Pedes fusci seu è nigro virides. Color in supina parte, exceptis alarum remigibus & primi ordinis vestitricibus, cinereus seu rufus, maculis nigris in mediis plumulis varius. In hac & prædictis hujus generis avibus alæ longæ sunt, ad extremam caudam cum complicantur pertingentes. Pennæ alarum rectrices ima parte quatenus vestitricibus occultantur albæ, cætera fusæ. Circa *maris litora* plerumque versantur & gregatim volant.

14. CINCLUS tertius Aldrov. Eisdem est coloribus cum præcedente, nisi quòd caudam habet albam, & lineis nigris transversim secantibus ornata; eadem etiam corporis specie & conformatione. Rostro differt. Illa enim ferè æquale habet, hæc quæ capiti jungitur crassiusculum, & sensim deinde magis magisque attenuatum. Crura etiam aliquanto longiora & crassiora obtinet.

15. CHIQUATLI sive *Noctua* Hernand. *Rusticula* nostrati par est, rostro longo, tenui, & pullo. Inferiora corporis pallida sunt, nigris quibusdam plumis circa *collum* interfertis; cætera ex fulvo fusco & cinereo permixta. *Irides* oculorum luteæ. In *montibus* versatur & humipeta est,

Aves aquaticæ fissipedes circa aquas versantes
rostris brevibus; *Insectivora*.

A. 1. CAPELLA sive *Vannellus*, The LAP-WING;
& alicubi BASTARD PLOVER. *Septentrionalibus* à sono vocis ficto nomine, The TEWIT.
Avis

Avis hæc ubique notissima & passim obvia est. *Columbæ domesticæ* magnitudine, *rostro* brevi recto digitali. *Caput* crista insigne. Coloribus pulchris ornatur: in *capite* supra cristam nigro.; item in gula & summo pectore, qui color torquem dimidiatum seu lunulam refert. *Maxillæ* albæ, *venter* quoque & pectus: sub *caudâ* pennæ pulchrè spadiceæ. Medium dorsum & scapulares pennæ amœno virore splendent: purpurea utrinque macula juxta alas. Vestitrices etiam alarum superiores purpureo, cœruleo, viridi, coloribus variè commixtis nitent; inferiores albescent. In *palustribus* & *aquosis* invenitur, nidificat autem humi in campestribus siccioribus.

A. 2. PLUVIALIS *viridis*, The GREEN PLOVER. Magnitudine est *Vannelli*. Color in *supina parte* tota niger, maculis luteo-viridibus crebris pulchrè respersus. Media *sci. cujusque* plumulæ pars nigricat, oræ circumcirca maculis luteo-viridibus pinguntur. *Rostrum* rectum nigrum digitale. *Pectus* varium ex fusco & flavo-viridi: *Venter* albus. *Pedes* nigri. Quid plura? *Digitum* postico caret, quod ei ad distinctionem à reliquis sufficit. *Caro* delicatissima habetur hujus & sequentis.

A. 3. PLUVIALIS *cinerea*, The GREY PLOVER. Hujus etiam caro non in minore æstimatione est. *Rostrum* nigrum, digitali plus longitudine. *Pedes* sordidè virefcunt. Magnitudo priori par. *Caput*, dorsum, teges alarum plumæ nigricant, apicibus ex cinereo viridibus. *Mentum* album. *Gula* lineolis seu maculis oblongis fuscis distinguitur. *Pectus*, venter, femora alba. *Cauda* areis seu spatiis transversis albis & nigris varia.

A. 4. MORINELLUS *Anglorum*, The DOTTERELL. Pluvialis cinereæ propemodum colore, verùm ea multò minor est, ut quæ 4 tantùm uncias pendeat; postico insuper digito caret, quo illa donatur. Stulta admodum avis esse creditur ad proverbium usque & imitatione capi. *Rostrum* Pluvialium, rectum, nigrum, digitale ferè. *Caput* maculis albis & nigris pulchrè variegatum. *Dorsum* ex cinereo & nigricante varium, plumis singularibus media parte circa scapum nigricantibus circum

112 SYNOPSIS METHODICA

circum oras cinerascens. *Uropygium* & collum cinerascunt magis. *Pectus* & alarum inferior facies fortidè flavicat, *venter* albet.

Hæ *Aves* bis in anno, *Aprili* sci. & *Augusto*, loca *paludosa* relinquunt, & in campos montosos gregatim se recipiunt. Transmigrationis autem causa ex victu petenda est. Nam tum temporis cibi quoddam genus ibidem reperiendum appetunt: quod ut certò scirem, plurium ventriculos dissecui, inque iis maximam partem *Scarabæos* quosdam minutos & nigricantes inveni, at inter alia & *Cossos* & *Cochleas* terrestres exiguas adverti. *D. Lister.*

A. 5. *MORINELLUS* marinus *D. Brown.* An *Cinclus* *Turneri*? *The TURN-STONE, or SEA-DOTTREL.* *Avem* hanc in maritimis *Cornubiæ* vidimus. *Rostrum* rectum, nigrum, digitale, à basi crassiore in acutum apicem sensim tenuatum, nonnihil depressum, firmitus quàm in *Gallinagineo* genere. *Supina* partis totius (medio dorso excepto quod albet) & summi pectoris color fuscus, mediis plumarum nigris aut nigro purpureis, oris cinereis aut ex ruffo albidis. Secluso pectore prona facies tota nivea. In ipso *uropygio* macula nigra transversa grandis. Juxta commissuram brachii cum cubito in alis macula alba habetur. *Caudæ* pennarum inferior medietas alba, superior nigra. *Crura* breviora, colore croceo.

A. 6. *CHARADRIUS* sive *Hiaticula*, *The SEA-LARK.* Magnitudine *Alaudam* vulgarem nonnihil superat. *Rostrum* digito brevius, inferiore medietate aureum, summâ parte nigrum. Hujus basin areola nigra cingit, quæ deinde ab angulis oris per oculos ad aures usque producit, tandèmq; caput medium transversim obit, lineam latam vittamve albam ab interiore unius oculi cantho ad alterius interiorem ductam circumambiens. *Occiput* cinereum: *mentum* album: *Collum* duplici torque cingitur, superiore albo, inferiore nigro. *Dorsum* & alarum tegetes minores cineræ. *Pectus* & *venter* alba. *Alæ* nigre, lineâ longâ transversâ albâ. *Pedes* pallidè flavi, ungues nigri. *Digito* postico carer.

Avicula

Avicula hæc *Americæ* cum *Europa* communis est, & *Matuitui* nomine à *Marcgravio* describitur.

A. 7. *Funco* prima *Aldrov. lib. 20. cap. 55. Magnitudo* *Passeris*: *Rostrum* nigrum, canaliculatum, durum, extremo aduncum: *Capite* supernè, *cervice*, *ventre* colore *castanearum collo* prono & *pectore* albicante. *Reliquæ* corporis partes è fusco ad nigrum tendunt.

Aves aquis innatantes fissipedes, & primò
Gallinulæ, quarum digiti nullas habent
membranas appensas.

GALLINULARUM notæ sunt caput parvum, *Rostrum* breve & modicè inflexum: *Corpus* ferè adductum, gracile & ad latera compressum. *Alæ* breviusculæ, concavæ, & *Gallinaceis* similis; *Cauda* perbrevis, *Crura* longa; *Digit*i longissimi; *volatus* breves.

A. 1. GALLINULA *chloropus* major *Aldrov. The COMMON WATER-HEN, or MORE-HEN. Mas* 15 uncias pendebat, *Fœmina* 12. *Rostrum* digitale, *Mandibula* inferior ad angulum usque ex albo flavescit, indè rubescit. *Superior* minus flavescit in extremo, sed per nares ad calvitiei in vertice rotundæ extremum rubet. Rubor ubi desinit in *rostro* tanquam cera superinducta abradi potest. *Pedes* virescunt. Ab exortu *alæ* in ejus basi linea alba per totam longitudinem ad extremas usque pennas procurrit. *Dorsum*, & alarum vestitrices *pennæ* ad ferrugineum accedunt, aliàs ubique in supina parte nigricat. *Pectus* plumbeum est, *Venter* cinerascit. Sub *cauda* plumæ albæ, quas inter natandum caudam crebrò erigens ostendit. *Pedes* virescunt. *Crura* supra genua maculâ rubrâ insignita.

A. 2. RALLUS *aquaticus* *Aldrov. Ortygometra* *Bellon. Gallinula chloropus altera Aldrov. fortè etiam Gallinula Serica ejusdem. The WATER RAIL, nonnullis, A BILCOCK, or BROOK-OUZELL. Gallinule vulgari* similis est sed minor, *Coturnice* major. *Rostrum* duplo

plo quàm præcedenti longius, ad latera compressum, inferiore parte ad caput rubicundum, superiore nigricans. Calvities admodum exigua & vix observabilis. Color in supina parte tota varius est è nigricante & sordidè luteo seu olivaceo. *Mentum* album, *gula* rufescit cum cinerei mixtura; *Pectus* magis cinereum est, verùm per ejus medium areola alba. *Plumæ* albæ sub *cauda*, ut in præcedente. Verùm præcipuè observabiles & velut characteristicæ hujus avis sunt plumæ in femoribus & lateribus nigræ, transversis lineis albis pulchrè variegatæ. Secundùm alæ basin linea alba ut in *Chloropode*. *Pedes* coloris carnei obscurioris. Celerrimè currit, & juxta *aquarum* ripas delitescit. Ambulat potius quàm natat in aquis.

3. *Gallinula chloropus* altera *Aldrov.* in plerisque notis cum hac ave convenit: differt quòd *rostrum* inferius & superna parte aliquo spatio flavescit: *Collum* & caput nigricant; *Dorsum* cum superna alarum parte coloris castaneæ sunt; *Crura* virent. Eandem tamen specie avem esse existimo, sexu fortasse diversam. *Crura* enim in hoc genus Avibus pro sexûs diversitate colore differunt.

4. *GALLINULA Serica* Gesneri *Aldrov.* Tom. 3. pag. 470. Colore atro & ruffo per totum ferè corpus, nisi quòd *venter* albet, pulcherrime distincta est. Color ater in ea holoserici instar splendet. *Crura* alta & fusca sunt, *digiti* prælongi. Q. an diversa sit ab *Ortygometra Bellonii*?

5. *POLIOPUS Gallinula minor* *Aldrov.* *Grinetta Italica*: *Mediolani* Gillerdine. An *Gallinula* alia *chloropus Fulicæ* similis? *Bellonii Aldrov.* Tom. 3. pag. 496. Omnium quas hætenus vidimus *Gallinularum* minima est. Colore cum *Rallo aquatico* ferè convenit, nisi quòd medio dorso inter alas ductus niger maculis albis conspersus, cernitur, cui & alii duo adjacent, hinc indè in vestitricibus alarum. In costa aut basi alæ à scapulis ad extimæ remigis apicem linea alba, ut in *Gallinula majore vulgari*, extenditur. A *Gallinula aquatica* majore & *Rallo vulgari* parvitate sua, ab hoc etiam brevitate rostri, aliàs figurâ similis, distinguitur.

6. *GALLINULA ochropus major* Gesnero Aldrov. lib. 20. cap. 42. *Rostrum* imum (pedibus concolor,) luteum nempe. Septem in ea colores (ut pictura ostendit) discerni apparent: Reliquam *descriptionem* videsis apud Gesnerum: Nos enim iconibus pictis non multam fidem adhibemus.

7. *GALLINULA ochra* Gesneri, quam Germani Wynkernel appellant Aldrov. lib. 20. cap. 48. Corporis ferè totius color subviridis, sed sordidus & obscurus, prona parte magis fusca. Caput, collum, pectus & alæ punctis & maculis albis insigniuntur. Cauda albicat aliqua ex parte: *Rostrum* partim nigricat, partim puniceum est. Crura lutea.

8. *Gallinula Brasiliensibus* JACANA dicta Marcgrav. Columbae est magnitudinē; cruribus flavo-viridibus, digito postico enormis longitudinis: Cauda brevi; colore in dorso, alis, & ventre ex viridi & nigro mixto; in collo & pectore qualis in collo Pavonum aut Columbarum quarundam cernitur; sub cauda albo. *Rostrum* ab initio ad medietatem egregii miniati coloris est reliqua parte flavo viridis. Caput tegumento membranaceo rotundo Turcoidis colore tegitur.

9. *Gallinula Brasiliensis* AGUAPECACA dicta. Priori figura & magnitudine par, differt alarum colore magis brunnescente. Caret mitellâ, at in qualibet ala corniculum habet directum, quo se defendit.

10. *GALLINULA Brasiliensis tertia* Marcgr. Prioribus figurâ & magnitudine par. Supina pars tota exceptis alis (quæ virides extremitatibus brunnis) brunna. Prona pars itidem brunna. *Rostrum* rectum, croceum, cum cuticula ruffa in exortu illius & parte capitis anteriori. In qualibet pariter alæ parte antica corniculum habet simile, flavum.

11. *GALLINULA Brasiliensis quarta* Marcgr. Figurâ est ut reliquæ; *Rostro* flavo; mitella cutacea in initio capitis propè Rostri exortum rubens. Totum caput, collum & pars corporis prona nigra; supina exceptis alis ruffa seu dilutè brunna. Remiges alarum thalassici coloris, extremitatibus nigris. Pedes cinerei. Quælibet

ala anteriori parte corniculum habet acutissimum croceum.

12. *GALLINULA aquatica*, *TAMATIA Brasiliensis* Marcgrav. Capite & oculis magnis est, dorso & collo incurvatis, incedens. *Rostrum* 2 dig. longum primum latum, instar *Anatis* quidem sed anteriùs acuminatum, superiore *mandibula* nigra, inferiore flavescente. *Pedes* & *digiti* (qui longi ut in *Gallinulis*) è viridi flavicant. *Caput* nigrum, reliquum corpus brunnum, admixtis *pennis* in ventre albicantibus.

13. *PORPHYRIO* ni picturæ nos fallunt (*Avem* enim ipsam nec nos, neque *Gesnerus* aut *Aldrovandus* viderunt) è *Gallinularum* genere est. *Cæruleus* ei toto corpore color. *Media caudæ* extremæ pars in cinereo albicat. *Rostrum* & *crura* purpureo colore splendent. *Andetur* hujusmodi avis dubitatur?

14. *QUACHILTO* sive *Porphyrio Americanus Hernandezi*, *Nieremb.* Internoctu canit *Galli gallinacei* modo. *Color* illi purpureus ex nigro, insertis candentibus *pennis*. *Rostrum* initio pallet, adolescentibus rubet, calvities circa *Rostri* exortum. *Fulicam* imitatur. *Crura* luteo-viridia : *irides* oculorum fulvæ.

15. *RALLUS Italarum* *Aldrov. lib. 19. cap. 16.* A vulgari *Fulica* differt, quòd in *alis* & circa *oculos* plus albi coloris habet. *Rostrum* nigrum : *crura* subviridia ; membranæ inter digitos non ità dissectæ, calvitium nullum, quantum ex pictura assequor, inquit *Gesnerus*. De hac ave quid ult.?

16. *ACOLIN* seu *Coturnix aquatilis Mexicana* *Hernand.* *Gallinule* species est.

Fissipedes aquaticæ, pedum digitis membranis auctis.

A. 1. **F**ULICA, The COOT. *Gallinula* vulgari major est, unciarum 24 pondere, colore undique nigro ; in pectore & ventre dilutiore & plumbeo. *Rostrum*

strum sesquidigitale, ex cœruleo album; à rostro ad verricem assurgit *Globus* carneus, mollis, glaber, rotundus, quem *calvitium* vocant. *Pedes* cœrulei seu ex fusco virides. Ad articulos digitorum membranæ circulares appensæ prætensæve. *Aquis* innatat ferè semper hæc avis.

2. *FULICA* major *Bellonii*: Gallis *Macroule* vel *Diable de mer*: *Aquis* dulcibus se semper immergit, & colore est tam exquisitè nigro, ut penecillo inductus ei videatur. *Alba capitis* macula latior est quàm in *Fulica*; imò & paulò major *corpore* est. *Crura* ad se attrahit, *digitosque* habet latos, & ab invicem sejunctos, ut *Fulica*.

3. *Fulicæ Mexicanæ* altera species *Toboalcoachillin* dicta. In omnibus præterquam colore cum præcedentibus convenit; qui infernè, itemque circa *caput* & *collum* purpureus, *supernè* ex pallido virescens cum cyaneo & fulvo. *Rostrum* niveum est, & prope apicem luteum.

Aves aquaticæ palmipedes, & primò Rostrò angustò.

I. Cruribus longis.

A. 1. **R**ECURVIROSTRA, *Avosetta Italarum*. Magnitudine *Vannellum* superat. Color in *prona* corporis parte tota nivens: in *supina* partim albus, partim niger, *Cauda* tota alba. *Crura* longissima, pulchrè cœrulea, supra *genua* ad tres *digitos* usque nuda. *Rostrum* nigrum, tenue, longum, $3\frac{1}{2}$ digit. figurâ singulari, sursum reflexa seu arcuata, quo ab aliis omnibus nobis hætenus visis avibus differt. In *Angliæ* maritimis, præsertim *Orientalibus*, non infrequens est.

2. **P**HOENICOPTERUS, Gallis *Flammant*. *Collum* & *crura* habet longissima: *Rostrum* latiusculum, singularis & insolitæ figuræ: *Mandibula* nempe superior incurva, depressa, dentata; *inferior* crassior, extremum

nigricat, aliàs obscurè cœruleum est. Collum & corpus alba sunt; alarum remiges nigræ. Vestitrices colorè phœniceo seu flammeo pulcherrimè rutilant, unde ei nomen. Ad litora Galliæ Narbonensis hyberno tempore advolat; unde & circa Martigues in Gallo-provincia, & Monspe- lium in Gallia Narbonensi non rarò capitur. Invenitur in America circa Insulas Antillas seu Caribbeas, testibus Hernandez, Rechefortio & Du Tertre.

3. TROCHILUS vulgo Corriira Aldrov. Crura ha- bet inter Palmipedes exceptis Phœnicoptero & Recurviro- stra seu Avosetta longissima, unde cursu plurimùm va- let. Avis est varia, rostro recto, luteo, in fine nigro; ridu magno; oculorum iridibus albis & lpadiceis, du- plici circulo. Pronè ad ventrem usque candicat: Cau- dam duæ pennæ albæ extremitatibus nigris cooperiunt. Supina pars tota coloris est ferè ferruginei.

Aves aquaticæ palmipedes cruribus brevio- ribus & primò Tridactylæ:

Palmipedibus omnibus, exceptis tribus prædictis, Ti- biæ breves: Crura ad articulum secundum plumis vestita: Digiti postici breves: Digitus anticus extimus intimo brevior: Uropygia minùs erecta quàm aliis Avi- bus.

1. PENGUIN nautis nostratibus, quæ Goifugel Hoi- eri esse videtur. An Penguin Batavorum seu Anser Ma- gellanicus Clusii? Magnitudine ad Anserem domesticum accedit. [Clusio eum superat] Color supine partis niger, prone albus. [Collum Clusio albis pennis tanquam tor- que cinctum] Alæ minimæ & ad volandum ineptæ vi- dentur. [Clusius alarum expertem esse scribit, sed earum loco binas parvas coriaceas pinnas habere; ad latera tanquam parva brachia propendentes, pennis tamen rectas, &c] Rostrum Alæ simile, sed longius latiusque, nigrum, ad latera compressum, versùs extre- mitatem sulcis obliquis 7 vel 8 exaratum in superiore mandi-

mandibula, in inferiore 10 : inferior quoque mandibula in angulum deorsum extuberat. Nullæ autem in rostro lineæ albæ sunt, quemadmodum in *Alka*. A rostro ad oculos utrinque linea alba protenditur. Digito postico carèt. *Clusius* tamen digitum posticum appingit, malè ut puto, cum eandem cum nostra avem describere videtur, *Olai Wormii* avis, quam domi vivam per aliquot menses aluit, supra oculos aream rotundam candidam habuit. *Daleri* magnitudine, ut perspicillis dotatam jurares : nec alæ eam obtinere formam quam *Clusius* expressit : latiores enim erant paulò cum limbo albo. *Wormii* avis, ex insulis *Ferroensibus* delata erat ; *Clusii* ex insulis *Freti Magellani*, tanta intercapedine à se invicem remotis inque diversis mundi cardinibus sitis, ut eandem utrobique Avis speciem reperiri vix sit credibile. Nobis descripta in Repositorio Regiæ Societatis Londini, inque muleò *Joan. Tradescanti* sicca visa est ; & cum *Clusiana* porius quàm *Wormiana* (si modò *Aves* diversæ sint) convenit.

2. MERGUS Bellonii *Altrov*. Tom. 3. Pag. 240. cum *Alka Hoieri*, eadem avis esse videtur. Ad litora *Cretæ* invenitur ; Indigenis *Utamania* dicta : Ab *Alka* magnitudine differt *Querquedula* pari ; & rostri colore, quod nigrum superiore, album inferiore parte.

A. 3. ALCA Hoieri *Clus. Worm. mus. The RAZOR-BILL*, Occidentalibus *Anglis* : Septentrionalibus, *The AUK* : Cornubiensibus, *The MURRE*. *Anate domestica* minor est : Supina corporis pars tota nigra ; prona alba quousque aquis immergitur : Quod congeneribus etiam Avibus, *Lomwie Hoieri*, *Anati Arcticæ* *Clus.* & *Columbæ Groenlandicæ* dictæ commune est. Rostrium 2 dig. longum, nigerrimum, compressum, angustum. Superior mandibula extremo adunca, duobus sulcis [interdum tribus] transversis canaliculata, quarum capiti proximus, Rostrium ferè transcurrens, albus. Quin & ab utroque oculo ad angulum Rostri superioris linea candida angusta extenditur. Ova in omnibus hujus generis majora sunt quàm pro Corporis mole. In rupibus inaccessis, & clivis præruptis, in multis circa *Angliæ* partem Occidentalem

infulis, ova deponunt, incubant, & pullos nutriunt, cum *Anate Arctica Clus. & Lemwia Hoieri*. Quò abeant, & ubi hyemem transigant, hæcenus incognitum.

A. 4. LOMWIA *insula Farræ Hoieri, The GUILLEM Cambri-britannis & Monensibus: Northumbris & Dunelmensibus A GUILLEMOT, or SEA-HEN. Eboracensibus A SKOUT, Cornubiensibus, A KIDDAW. Aike* similis est sed major, *Supina* tantum pars ex nigro cinerea potius est quam nigra. *Rostro* potissimum differt, quod 3 ferè digitos longum, rectum, teretiusculum, acutum, per totum nigrum. Unà cum *Alkis & Lundis* degit, eodémque modo & in eisdem locis parit. Stolidior tamen est & faciliùs capitur.

A. 5. ANAS ARCTICA *Clus. Pica marina* vel *Fratercula Gesneri Aldrov. Feroensibus Lunda Worm. Mus.* nominibus *Anglicis* non indiget: nam *Wallis* Septentrionalibus, PUFFIN; Meridionalibus, GULDEN-HEAD, BOTTLENOSE & HELEGUG. *Anglis Septentrionalibus* circa *Tese* fluminis ostia COULTERNEE, or COUNTERNEE. circa *Scarburgum*, A MULLET. *Cornubiensibus*, A POPE, dicitur. *Anate domestico* minor est. *Rostrium* breve, latum, ad latera compressum, contrario sci. modo quàm *Anatum* rostra, triangulare, bicolor, ad caput lividum, versùs extremum rubrum. Tres ei sulci insculpuntur; in parte livida unus, in rubra duo. *Pedes* rubent, & retrorsum siti sunt, ut *Avis* propemodum erecta incedat. *Prona* pars præter caput & collum nigra, *supina* alba. *Vertex* niger, *torquis* etiam niger à vertice productus gulam circuit: *Maxilla, mentum*, capitis latera à vertice ad torquem dictum alba aut pallide cinerea, adeò ut oculi atque aures spatiis hisce albis includantur.

Omniibus hisce avibus, *ale* exiguae, brevibus *pennis* compositæ, nihilominus celerrimâ earum agitatione, propè æquoris superficiem quàm citissimè volant. Quinimo aves prædictæ, *Anser Bassanus* & fortasse etiam hujus generis reliquæ unicum duntaxat una vice ovum pariunt & pullum educant. Est autem ovum illud pro corporis mole longè maximum, ut modò diximus.

6. COLUMBA *Groenlandica* Hollandis, *The GREENLAND-DOVE* or *SEA-TURTLE*. Ob quam rationem *Columba* nomine insignita sit hæc avis non capio, ni fortè ob magnitudinem parem. Amplam in supina utriusque *ale* facie maculam albam obtinet, *Ale* quoque *subtus* albæ, aliàs tota nigra est *Fulicæ* colore. *Rostrum* longius quàm præcedentis, non compressum ad latera, acutum, extremo nonnihil incurvum & prominens. A nominis convenientia hanc avem *Bassæ* Insulæ turturem esse mihi persuadeo. *Fredericus Martens* *Hamburgensis* *Avem* hanc à voce pipiente pullorum seu pipionum *Columbarum* simili *Columbam* à *nautis* dictam ait. *Urinantur* plurimum, & diu sub aquis durare possunt. *Gregatim* non volant, sed plerunque binæ simul, rariùs singulæ. *Volatus* *Perdicum* similis est, *alas* quippe celerrime motitant; nec in sublime evolant; sed ut hujus generis reliquæ paulòsupra maris superficiem. In *rupibus* nidificant non in *Groenlandia* tantùm sed & in *Spitzberga* regione frigidissima & perpetuis nivibus damnata, ut quæ vix decem gradibus ab ipso polo boreali distet.

*Palmipedes tetradactyle, digitis omnibus
membranis connexis.*

I. ONOCROTALUS five PELECANUS
Aldrov. The PELECANE. Ansere maximo longè major est, *Cygno* vel par, vel magnitudine etiam superior. *Color* totius corporis albus: *collum* tamen flavicat, & dorsaliū pennarum scapi nigricant: *Caudæ* quoque & alarum tegetes è fusco cinerascunt, ut in *Anseribus*. *Rostrum* versùs caput coloris plumbei est, extremitate flavicante; *mandibula* superior lata & depressa, apice incurvo seu adunco: inferior velut duæ longæ costæ, altera extremitate junctæ, intercedente inmembrana crassa seu cute lutea, quam *bursam* vocant, quàm ita nonnunquam rostrum versùs retrahit ut ampliùs ferè non sit conspicua; eandem postea ita dilatari sibi permittit,
ut

ut plurimarum etiam aquæ librarum, ad 30 usque, capax sit. *Linguâ* caret. *Nares* ad supremam rostri partem juxta plumas capitis fixæ, rotundæ. In capitis vertice elevatæ quædam *pennæ* emicant, *cristam* æmulantes.

Singulare in hac ave est, quòd *ossa* pellucida solida omni omnino medulla carent inquit *Aldrovandus*, de quo qu. ult. *Du Tertres* concava esse scribit, medullâ tamen carere.

Invenitur in *India Orientali*, inque *America Meridionali* copiosè; olim in *Italia* circa *Ravennam*: unde *Martialis* eum *Ravennatem* vocat, *Turpe Ravennatis guttur Onocrotali*, *Manè* & *vesperi* tantùm pitcantur; tota die quiescent. Quamvis palmipedes sunt, & mole corporis maxima, *arboribus* insident in iisque nidificant, teste *du Tertres*, in *Hist. Nat. Ins. Antill.* quod & *Corvi aquatici* & *Graculus* palmipes, nostra experientiâ, faciunt, & reliquæ fortasse hujus generis aves.

Onocrotali Mexicani dentati iconem & descriptionem vide apud *Jo. Fabrum* Notis in *Animalia Novæ Hispaniæ* *Recchi*. Ego equidem dari ejusmodi *Onocrotalum* rostro dentato ægrè inducor ut credam, cum præter *Fr. Hernandez* nemo rerum *Americanarum* naturalium scriptor ejus meminerit.

A. 2. ANSER *Bassanus*, The SOLAND GOOSE. Magnitudo *Anseris*. *Rostrum* longum, rectum, obscure cinereum, extremo nonnihil incurvum seu hamatum, non procul ab unco appendiculâ utrinque, ceu dente quodam, donatum. *Rictus* ingens; *nares* nullæ; *lingua* exigua, *Os* intus nigrum; *Rostri* mandibulæ ferratæ. *Color* in adultis & senioribus undique *albus*, exceptis alarum remigibus majoribus quæ nigricant, & vertice qui ætate fulvescit. *Alæ* longissimæ, ut cum in terram deciderit ægrè se levare possit.

In insula *Bassa* in medio *Edinburgi* æstuario sita, magno numero quotannis nidificant, in *rupibus* nec alibi usquam, quod sciam, in *Britannia*.

A. 3. CORVUS *aquaticus*, The CORMORANT. Magnitudo paulò infra *Anserem*. *Color* in supina parte fuscus cum quadam obscura viroris tincturâ splendent. *Pectus*

Pectus & venter albicant. Cauda longior quàm in aliis Avium palmipedum generibus. Rostrum $3\frac{1}{2}$ digitos longum, extremo aduncum. Lingua exigua & penè nulla. Nares nullæ; Crura valida brevissima.

A *Graculo* palmipede præter magnitudinem in eo differt, quòd basin *Rostris membrana* seu *cutis* nuda flavicans obvestit, ad eundem ferè modum quo *Cygni feri* nobis dicti *Arboribus* insidet, & in iis *nidificat*.

A. 4. *CORVUS aquaticus minor*, *Graculus palmipes dictus*. The SHAGGE, in the North the CRANE. A præcedente differt 1. *Magnitudine*, quâ ab eo multum deficit. 2. *Pronæ partis seu ventris colore*, qui in hoc fuscus est, in illo albicans. 3. *Numero pennarum caudæ*, quæ in hoc 12 tantum sunt, cum in illo 14. 4. Quòd *cutis* ad basin *rostri* non usque adedò nuda sit, ac in illo, nec ejusdem flavi coloris. 5. *Tandem tenuitate & longitudine rostri*, ad 4 usque digitos extensi, quamvis avis minor sit. In mari *Cornubiam* alluente, & *Hibernico* ad insulam *Monam* & alibi invenitur. *Sevenhuse* in *Hollandia* in arboribus *nidificat* cum aliis multis avibus *aquaticis*.

5. *SULA Hoieri Clus. Anseri Bassano affinis, si non eadem*. Ab *Anseri Bassano* differt *Rostris* acumine, & colore circa oculos nigro, *crurum* exilitate, & nigro *mediarum caudæ pennarum* colore; in reliquis cum eo convenit.

6. *AVIS TROPICORUM* nostratibus *nautis*, item *Du Tertre Hist. des Antilles*. The TROPICK BIRD. *Magnitudo Anatis, Rostrum rubrum 2. dig. longum, non-nihil incurvum, acutum. Venter albus: Dorsum album, transversis lineolis nigris undantibus pulcherrimè variegatum. Remiges alarum pennæ partim albæ, partim nigre. Cauda* (si vel pelli suffultæ, vel eis qui *Avem miserunt fides* sit) duabus tantum pennis longissimis, 18 scilicet digitorum, angustis, acutis constat. [Præter has pennas alias breves adfuisse suspicor] In *Museo Reg. Societatis Londini* vidimus.

Du Tertre *Pedes* hujus *Avis* *rostro* concolores, hoc est, rubros *Coralii* instar facit, verum in *Ave sicca* quam nos descripsimus, *Crura* alba fuere, *pedes nigri*. *Avis Tropico-*

picorum dicitur, quia nullibi nisi intra *circulos Tropicos* dictos invenitur; qua nota ab aliis omnibus *Laris* differt.

7. ANHINGA Brasiliensibus *Tupinambis* Marcgr. *Mergi aquatici* species, *Anatis* magnitudine, *rostro* recto acuto, utrinque serrato duplici dentium ordine: *capite* parvo, *collo* tenuipedali; *cruribus* brevibus. *Color* in capite & collo supernè è griseo subflavescens, infernè & sub gutture griseus; reliqua pars prona argentea. Initium *dorsi* pennis fuscis regitur sed quarum quaelibet in sui medio maculam habet oblongam ex albo pallidè flavam, ita ut punctulatum appareat: reliquum *dorsi* nigrum: *Remiges* pennæ nigræ; sequitur ordo pennarum ab uno latere nigrarum, ab altero canarum. *Crura* & *pedes* ex obscurè flavescente grisei sunt coloris.

Palmipedes tetradaetyle digito postico soluto, & primò Rostro recto angusto acuto, brachypteræ & urinatrices, COLYMBI dictæ.

COLYMBIS *Rostra* angusta recta acuta, *Capita* parva; *Alæ* etiam parvæ; *Pedes* retrorsum siti juxta *caudam*, ad expeditiùs natandum & urinandum; *Crura* lata, plana, & compressa; *Ungues* lati, humanis similes. *Digiti* ad latera membranas extensas obtinent, in nonnullis in aliis membranis connexi sunt.

A. 1. **COLYMBUS cinereus major.** *The great Ash-coloured DIVER, or DOUCKER.* Icon hujus quam transmissit D. Brown *caput* cristatum exhibet.

A. 2. **COLYMBUS major cristatus & cornutus,** *The greater crested DIVER.* Cristatus cornutusque est, plumulis circa *verticem* & *collum* supremum eminentibus, superius nigris, ad latera ruffis. *Mentum* & spatium circa *oculos* album, cui ruffus color conterminus. *Pectus* & *venter* alba ruffo tincta. *Alæ* fuscae: *remiges* minores albæ: *Dorsum* nigricat admixtis plumulis cinereis. Ex agro *Eboracensi* transmissa est à D. *Jessop* avis occitæ pellis.

Acitli

Acitli Hernandez ab hac Ave parùm differt. Eadem, inquit, prorsus esset, nisi caput majori insigniretur cristâ.

A. 3. COLYMBUS sive *Podicipes minor*, The DIDAPPER or DIPPER or DOBCHICK or DOUCKER or small LOON. Corporis figurâ *Querquedula* similis est, tertia ferè parte minor. Color in dorso fuscus, in ventre argenteus. Mentum album. Pectus ventre obscurius. Dissecti ventriculus gramine & herbis repletus erat. *Bellonius* eum piscibus lubentissimè vesci scribit.

Hæ tres species caudâ prorsus carent.

A. 4. COLYMBUS *maximus caudatus*, *Mergus maximus Farrensis* sive *Arcticus* Clus. The greatest tailed DIVER or LOON. Magnitudine ad *Anserem* accedit; figurâ corporis longiusculâ est, Caudâ rotundâ, capite parvo. Color in supina parte tota fuscus seu obscurè cinereus, maculis albis in collo rarioribus, in dorso crebrioribus pictus. Singulæ sci. plumulæ duabus maculis seu lineolis albis propè apicem, hinc inde unâ, notantur. Guttur & collum primum canescunt: pectus & venter alba. In alia ave caput nigrum fuit, itémque collum, in cujus medio torquis albus digitum latus, punctulis albis crebris constans. Fortè hæc mas fuit. Asperitate hyemis compulsus interdum huc advolat.

A. 5. MERGULUS *melanoleucos rostro acuto brevi* D. Brown. Rostro est brevi, modicè inflexo. Supina pars tota præter lineam in alis transversam albam nigricat. Mentum, gula, pectus ad medium usque ventrem alba. Palmipes est & caudatus. Posticum digitum pictura non exhibet.

6. COLYMBUS major *Aldrov.* quem in transmarinis multoties vidimus, magnitudine excepta, quæ illius dupla est, à Colymbo minore in paucis differt, ut descriptione nova non indigeat.

7. COLYMBUS *Arcticus Lumme* Wormio dictus. A quarta specie differt, quòd minor sit, *Anatis* nimirum magnitudine, quòd in illa inaculæ pauciores sint in cervice, plures in dorso, cùm in hac vice versa pauciores sint in dorso, plures in cervice: quod in illa quælibet plumula duas habeat maculas, in hac unam tantum: item macu-

lâ quadratâ nigrâ sub *collo*, undique variegâti ex albo & nigro plumulis instar zonæ cinctâ.

Lumme *Friderici Martens* diversa ab hac Avis est, & ad quintam nostram speciem propiùs accedit.

8. *COLYMBUS maximus* Gelfneri. *Ein grosse Zee fluder.* In *Acronio* lacu capitur *Anser* major; Prona pars corporis alba est, supina cinerea & nigrâ. Si à quarta specie distinctus sit mihi incognitum fateor. D. *Johnson* Avem hujus generis in Anglia sibi visam scribit maculis in dorso nullis, quam tamen à quarta specie diversam non esse opinatur.

II. *Palmipedes* *Rostro angusto, acuto, non adunco, macroptera & volatica* L A R I dicta. *Anglicè* Guls or Sea-Mews, & *alicubi* Sea-Cobs.

L Arorum notæ sunt, *Rostrum* validum, oblongum; angustum, acutum, ac parumper in extremo incurvum, in minoribus tamen speciebus rectius: *Nares* oblongæ; *Alæ* oblongæ & validæ; *Pedes* parvi: *Corpus* levissimum, multis & densis plumis indutum. *Clamosos* esse, *volaticos*, *famelicos*, & *piscivoros*.

L A R I *tridactyli, seu postico digito carentes.*

I. **R** A T H S-H E R R *i. e.* Senator *Friderici Martens.* Avis est *Spitzbergenfis*, *rostro* angusto, acuto, tenui, nigro; *pedibus* nigris, *tridactylis*. nam digito postico caret. *Corpus* totum *Cygni* instar niveum. *Alæ* longæ, *cauda* etiam longiuscula, lata, *Larina* instar. Candore nivem ipsam superat, éstque avis admodum speciosa & decora. *Aquæ* non libenter innatat, verùm in sicco potiùs moratur. *Solitaria* plerunque est; Ad prædam tamen magni greges convolant.

2. STRUNDT-JAGER i. e. *Kongshøns*. Avis Spitzbergensis *Friderico Martens* descripta & depicta. *Rostrum* habet obtusiusculum, nonnihil incurvum, nigrum (quantum meminit Autor) *Pedes* tridactylos; *Crura* non longa: *Caudam* ut in aliis LARIS, in qua tamen *penna* insignis præ aliis in longum exporrigitur. *Summum caput* nigrum: *Collum* circulus seu torquis obscurè luteus ambit. *Supina* pars reliqua brunnea seu leucophæa, *prona* alba. Cur *Strundjager* vocetur, vide in LARO cinereo *Bellonii*.

3. BURGHER-MEISTER *Spitsbergensis* *Frid. Martens* in omnibus fere cum Laro nostro cinereo maximo convenit, præterquam quòd postico digito careat.

LARI tetradactyli seu postico digito donati.

A. 1. LARUS maximus ex albo & nigro seu cæruleo nigricante varius, marinus ingens *Clus.* The great black and white GULL. *Anserinæ* ferè magnitudinis est. *Rostrum* luteo, ad latera compresso, extremo nonnihil adunco. *Mandibula* inferior versùs apicem in angulum infernè extuberat, macula utrinque duplici, inferiore nigra, superiore rubra tinctum. *Caput* (quod grande est) *collum*, *pectus*, *venter*, *cauda* alba. *Medium dorsum* & *Alæ* præter apices remigum nigræ. *Crura* *pedesque* alba; *ungues* nigri. Nos è dissecti ventriculo *Passerem* piscem integrum exemimus. *Cestriæ* hunc nacti sumus.

A. 2. LARUS cinereus maximus, The HERRING-GULE Magnitudine ad *Anatem* domesticum accedit: *Rostrum* flavo, præcedentis figurâ, cum prominentia angulari in inferiore *mandibulâ*, *laturâ* amplâ rubrâ utrinque notatâ. *Pedes* nunc lutei, nunc carnei coloris: *ungues* nigri. *Caput*, *collum*, *uropygium*, *cauda*, totâque *prona facies* alba. *Dorsum*, *alarum* *tegetes* & *rectrices*, exceptis & extimis (albo maculatis) obscurè cineræ. In maritimis frequentissima est hæc avis.

A. 3. LARUS cinereus minor, The common SEA MALL or MEW, *Pondere* est *librali*: *Præcedenti* similis, sed longè

longè minor. Protuberantiâ in inferiore rostri *mandibula* longè minore: *Pedes* pallidè virides.

A. 4. *LARUS cinereus* Bellonii, TARROCK Cornubiensibus. *Columbæ* domesticæ magnitudine est, nec figurâ multùm dispar. Pronæ partis totius color niveus. *Caput* & *collum* superius album, nisi quodd ad aures utrinque macula nigra. inferiorem colli partem nigredo occupat. *Dorsum* medium & *scapulae* cineræ. *Cauda* alba, apicibus pennarum tigris. *Rostrum* digitale, nigrum. *Pedes* lividi, *ungues* nigri. Digiti postici quoddam rudimentum obtinet potius quàm digitum, tuberculum sci. carneum nullo *ungue* munitum: quâ notâ ab aliis omnibus speciebus facile distinguitur.

Avis hæc *Friderico Martens* nomine *Kudge-ghes* à voce seu clamore quem edit imposito, describitur; ejus autem excrementis *Larus Strun-jager* dictus inhians, eam persequi & insectari non desistit, donec alvum dejiciat; ut fimo velcatur; quem antequam in aquam decidit intercipit & avidissime devorat. Hoc (inquit) ego ex aliorum relatu non credidissem nisi propriis oculis ipse sæpius vidissem. Eandem nobis historiam retulerunt Cornubienses.

A. 5. *LARUS cinereus*, *Ornithologi* Aldrov. item *cinereus tertius* Aldrov. *Cephus* Turneri & Gesneri. *The Pewit or Black-cap, called at Chester The Sea-crow*. Magnitudo *Columbæ*, *Rostrum* sanguineum modicè inflexum, *Pedes* etiam obscurè sanguinei, *Ungues* nigri. *Vertex* niger, in nonnullis totum *caput* & *gula* ad medium usque è nigro cinerascunt. Medium *dorsum* cinereum, item alarum tegetes: *Collum*, *cauda*, *pectus*, *venter* alba. Gregatim nidificant & pariunt.

A. 6. CATARRACTES *noſter*, *Skua Hoieri* Clusio. *The GANNET*, ut puto, *Cornubiensium*. *Anati* domestico par est, vel eo major. *Rostrum* validius, majus, brevius quàm in aliis *Laris*, nigrum, extremo aduncum, ad *nares* usque membranâ tectum, *Accipitrum* instar. *Pedes* nigri, *unguibus* aduncis validis, quales in nulla hætenus *Ave* palmipede observavimus. *Color* dorſi *Buteonis* similis è cinereo seu murino ferrugineus. *Venter* & reliqua

qua pars prona dilutior. *Cauda & remiges* alarum pennæ nigrae, fundis albis. *Tota facies* Avem rapacem refert.

Pellem suffultam in cœnaculo cujusdam Generosi suspensam nobis describendam impetravit Vir Clariss. D. Gualterus Needham non ita pridem defunctus.

7. CATARRACTA Aldrov. quam *Accipitrem* Palmarium adeò exactè exprimere scribit, ut vix discernas, à *Catarracta* nostra præcipuè differt 1. *Corporis* parvitate. 2. *Unguibus* minoribus; quibus non obstantibus, eandem specie avem fuisse existimo: Pictura enim fallax est, ut rectè Plinius; *Aldrovandus* autem Avem ipsam non vidit, sed imaginem ejus pictam tantùm.

8. LARUS major cinereus Baltner. cui, ni pictura fallat, corpus totum obscure cinereum supina parte; exceptis alarum *remigibus* majoribus, quæ nigricant, & *vertice* seu summo capite, ex viridi obscuro nigricante: *Rostrum*, rectum miniaceum, *pedes* nigricantes. Excepto pedum colore accedit ad *Cepphum* Gesneri & Turneri i. e. *Pewittam* seu *Melancoryphon* nostratam.

9. LARUS albus major Bellon. Nivis instar candidus est, sub *alis* tamen aliquid habet cinerei. *Oculi* nigro ambiuntur colore. Prope *aurium* regiones utrinque macula est nigra, in reliquis ad *Pewittam* nostram accedit.

10. LARUS major Aldrov. hybernus Baltner. A *Laro* nostro hyberno differt iridum *oculorum*, *rostri*, & *pedum* colore; cum in hac ave *rostrum* & *pedes* lutescant. Cum autem *Lari* hujus descriptio apud *Aldrovandum* exactè respondeat avi illi quam *Leon. Baltner*, auceps & piscator Argentinensis, sub titulo *ein Winder Meb.* i. e. *Lari* hybernici descripsit & depinxit: ab hyberno nostro *Laro Cuddy moddy* dicto Avem diversam existimo.

11. CEPPHUS Aldrov. *Rostrum* mediocre, colore carneo, ad *mandibularum* latera ruffo, in extremo (quod aduncum est) nigro: *Oculorum* irides albicant. *Caput* (quod paulo minus est quàm in *Laris*) cum prona parte tota ex albis & fuscis, intercurrente etiam colore Bœtico & luteo, maculis variegantur. *Alæ* nigrescunt, *penis* in fine lutescentibus. *Caudæ* pennæ majores etiam nigrescunt, *Crura* & *tibiæ* viridescunt: *Pedes* & *membra-*

na digitos intercedens fuscescunt. *Roſtro* & pedum tibia-
rúmque formâ *Larum* refert, in cæteris potiùs *Anatem*.

12. *Larus Braſilienſibus* GUACA GUACU dictus,
Lufitanis Gaviota *Marcgr.* Magnitudine eſt Gallinæ ;
roſtro recto, longo craſſo, flavo. *Caput* ſuperius nigrum,
ut & ultima medietas alarum & caudæ: prona pars tota
& initium alarum alba. Ova ponit in arena, figura,
magnitudine, & colore Gallinaceorum.

A. 13. WAGELLUS Cornubiensium. *Martinazzo*
Venetis. *Amſtelodamenſibus* The BURGO-MASTER
of GROENLAND. *Mallemuck* Spitzbergenſis *Frid.*
Martens, ut nobis videtur. The GREAT GREY GULL.
Pondus 22 unciarum. *Color* tam in prona quàm ſupina
parte ex albido ſeu cinereo & fuſco varius, (*gray* Angli
vocant,) qualis in *Anate* vulgari vel *Numenio* ave cernitur.
Quæ uropygio innascentur & caudæ incumbunt pennæ
maximam partem albæ, in medio duntaxat maculis fuſ-
cis majoribus pictæ ſunt. Alarum remiges nigræ. Pen-
næ caudæ, areolis alternis albicantibus & nigris transver-
ſis variæ; propè ſummam partem ductus ſeu annulus la-
tus niger, ſupra quem apices pennarum albeſcunt. *Roſtrum*
3 digit. longum. totum nigrum. *Collum* breve, *Caput*
grande, quod ſemper ad arinos contrahit inter ſtandum
& ambulandum, quod & alii *Lari* faciunt. A capitis
magnitudine (ut conjicio) *Amſtelodamenſes* hunc *Burgo-*
maſter vocant. Circa Cornubiam frequens.

Alia avis eſt quam *Fridericus Martens* pro *Burgermeiſter*
deſcribit, nimirum *Larus noſter cinereus maximus*: Ve-
rùm pedes ei tridactyli.

A. 14. LARUS fuſcus ſive hybernus, The WINTER-
MEW, in agro Cantabrigienſi the CODDY MODDY
dictus. *Pondus* 17 unciarum. *Caput* album maculis
fuſcis varium. *Collum* & ingluviei regio nonnihil fuſceſcit,
aliàs prona facies tota alba eſt. Medium dorſum cinere-
um; ſcapulares pennæ maculis fuſcis variæ; *Tropygium*
album. *Caudæ* pennarum extremi apices albeſcunt, ſucce-
dit area nigra ſeſcunciam lata; reliqua parte alba. *Ro-*
ſtrum duos digitos longum, à naribus ad extremum è
fuſco albidum. Eminentiam habet in inferiore mandibula.

la. Circa *prata humida, paludes, fluviis* multis milliaribus à mari remotos *hyberno tempore* versatur.

A. 15. *STERNA fusca* D. Johnson, *The BROWN TERN*. An *Larus cinereus minor* Aldrov. ? Pars *prona* tota alba, *supina* fusca. *Alæ* partim fuscae, partim cinereae : *Caput* nigrum. Gregariae sunt hujus generis aves.

LARI minores cauda forcipata.

A. 1. **H**IRUNDO *marina*, *Sterna* Turneri, *The SEA SWALLOW*. *Pondus* 5 unciarum. *Corpus* tenue longiusculum ; *Cauda* forcipata, unde *Hirundinis* nomen indepta est. *Prona* pars tota, (excepto pectore medio quod nonnihil cinereum) ut & uropygium alba. *Dorsum* & *supina* alarum facies obscurè cinerea. *Caudæ* pennæ extimæ semipedales & majores, limbo exteriori ex cinereo nigricant. *Rostrum* longum, rectum, rubrum, extremo nigricans. *Pedes* rubri. Circa *Caldæy* insulam *Walliæ* Meridionali adjacentem *Spurres* dicuntur, alibi *Scrayes* à sono vocis quam edunt, sunt enim impropè clamosæ.

A. 2. *LARUS piscator* Aldrov. & Gesn. *The LESSER SEA-SWALLOW*. *Alæ*, *cauda*, & *velocitas* *Hirundinis* ; *Rostrum* rubrum ; *Vertex* niger ; *Dorsum* & *alæ* cinereae ; *Cauda* bifurca, sex pollices longa.

A. 3. *LARUS niger* Gesneri, *The SCARE-CROW*. Homines perquam aversatur. *Caput* ei, *collum*, *venter* nigra ; *Alæ* cinereae ; *Cauda* parùm forcipata ; *Pedes* minimi, rubri. *Mas* sub mento maculam habet albam.

4. *LARUS niger fidipes alis longioribus* Aldrov. *Alis* & pectore planè cinereis est seu leucophæis ; *Alis* etiam longissimis & finem versùs nigricantibus : *Caudâ* breviusculâ cinereâ ; *podice* albo ; *pedum digitis* satis longis, & insignibus mucronibus armatis, nigris ; *tibiis* brevibus, etiam nigris ; *capite* insuper, *collo*, necnon & *rostro*, (quod longiusculum est, & in extremo leviter aduncum) nigro.

5. *LARUS niger fidipes alter, alis brevioribus* Aldrov. *Magnitudo* præcedentis i. e. *Merulæ* par, sed *alis* longè

brevioribus, & cauda è contrario multò longiore: color cinereus; caput nigrum, ut & Rostrum, quod gracile & aliquantulum recurvum. Pennæ sub cauda candicant: Pedes rubescunt, parvi ut *Hirundinibus*; digiti 4 membranulæ quodam rudimento interjecto.

Duarum sequentium Avium notitiam & descriptiones D. *Johnson* debemus.

A 6. LARUS *miuor fidipes nostras*, *The small black cloven-footed SEA-SWALLOW*. *Hirundine marina* minor est. Rostrum sesquidigitale, acutum, nigrum. Caput nigrum; Dorsum & alarum superior facies obscurè cinerea: Gula & pectus nigricant: infimi ventris pennæ sub cauda niveæ. Cauda forcipata, extimis pennis 3 $\frac{1}{8}$, mediis 2 $\frac{1}{2}$ digitos longis, extimæ utrinque albæ sunt, reliquæ dilutè cinereæ. Pedes exiles è ruffo nigricantes, digitis aliquousque divisis, infima tantum parte membranâ connexis. Vox ab *Hirundinis marinæ* voce vix potest discerni.

A. 7. LARUS *fidipes alter nostras* D. *Johnson*. *Merula* par est, aut eâ paullò minor. Rostro tereti, tenui, acuto, nigro. Vertex niger seu obscurè ruffus; ad colli latera & sub collo rubet. Prona pars tota alba, Dorsum, alæ fuscæ, maculis subflavis. In alis transversa linea alba in apicibus pennularum. Alæ longæ, cauda brevis. Digiti pedum non connexi, sed membranulis ad latera utrinque extantibus sinuosis & eleganter ferratis instructi. Avis hæc singularis est, inter *Fulicas* & *Laros* ambigens. Apud D. *Johnson* siccam vidimus.

8. *Larus minor ex albo & nigro varius* Mus. *Leyd*. An nova *Lari* species sit, an aliqua ex descriptis nos latet?

9. *Larus cinereus minimus* Mus. *Leyd*.

10. *Larus Americanus* minor stolidus, corpore fusco-rubente, vertice albo. D. *Sloane*. A NODDY. *Passer stultus Hernandrz, Nieremberg*. Descriptionem vide in Appendice,

Aves Palmipedes rostro in extremo adunco, non serrato.

1. **A V I S D I O M E D E A** *Aldrov. & Gesn.* Magnitudine est gallinæ, collo & cruribus longiusculis; colore fusco seu cinereo obscuro, ventre candicante: *Rostro* luteo, præter uncum qui nigricat. Laros cum toto corpore, tum alis potissimum refert. De Ave hac, (quæ in insulis Diomedeis *Tremiti* hodie dictis invenitur) diligentius inquirendum. Descriptio enim quam ejus habemus apud Gesnerum & Aldrovandum mutila est & imperfecta. Cæterum ad Avem Diomedeam *Aldrov.* aut potius ad Puffinum Anglorum, nam Diomedea minor est, accedit Avis.

A. 2. **SHEARWATER**, i. e: Aquæ superficiem radens Clariss. Viro D. *Thomæ Brown* dicta, cujus iconem pictam nobis communicavit. Magnitudine Anatit cedit, caput grande, ut in Laris. Pars supina, caput nimirum & dorsum, fusca seu obscurè brunnea; menxum, gula, pectus alba: Pedes carnei. Rostrum teretiussculum, oblongum, extremo hamatum ad Corvi marini modum, nigricans. Alæ longæ complicatæ ad extremam caudam pertinebant.

Avis stulta prior Du Terre esse videtur: notæ enim pleræque conveniunt. Stulta autem appellatur, quod cum navem appropinquantem vider, statim advolat, & vel malis, vel antennis infidet, seque interdum vel manibus capi permittit.

3. **M A I A G U E** *Brasiliensium* Pisoni. Magnitudo & figura Anseris: Rostrum in extremo aduncum, ad modum Corvi aquatici *Gesn.* quo cum etiam fusco seu subnigricante colore convenit: Colli tantum pars interior flava. Caput crassiusculum est & rotundum. Circa fluviorum ostia in mari vivit: in littore autem nidificat & ova ponit. Velox est, natatrix & urinatrix.

A 4. PUFFINUS *Anglorum*, The MANKS PUFFIN: Reperitur etiam in insulis Sorlingis *Sillyes* dictis, Magnitudine Columbam domesticam superat: Color in supina parte tota fuscus aut niger, in prona albus. Rostrum sesquidigitale aut longius, angustum, nigrum, Vannelli figurâ. Mandibula superior extremo adunca. Corvi marini modo, ad basin carne nuda obducitur in qua nares. Alæ longæ; cauda palmum longa. Digitum posticum habet. In cuniculorum foraminibus nidificat; unicum ovum ponit & pullum educat. Tota die piscatur, nec ante crepusculum ad nidum & pullum redit, quem iterum summo manè deserit.

*Palmipedes rostro angusto, in extremo adunco
ferrato; seu* MERGI.

A. I. **M**ERGANSER Aldrov. The GOOSANDER *Harle* Bellon. Pondus 4 librarum. Dorso est lato & plano. Caput & colli superior pars è viridi splendente nigricat. Supina pars corporis ex albo & nigro pulchrè variegata est. Cauda cinerea. Prona pars corporis (seclusis alis quæ subtrus albicant) gilva. Rostrum angustum, ferratum, aduncum, digiti manûs medii longitudine, partim nigrum partim rufum. Pedes coloris miniacei elegantis. Ampullam seu Labyrinthum in trachea habet magnum, osseum, atque insuper Arteria ipsa in duplicem ventrem turgescit. Cirrum in capite propriè dictum non habet, plumæ duntaxat laxiores sunt & surrectiores solito, unde & Caput iusto majus apparet.

A. 2. MERGUS *ferratus longiroster major* Gesn. Aldrov. Merganser fœmina ut puto. The DUN DIVER or SPARLING FOUL. Sexus in hoc avium genere, coloribus mirum in modum inter se differunt. Huic caput tordidè rufum Capitis plumæ nonnihil extare videntur & retrorsum vergere cirri in modum; Mentum album, Dorsum totum cinereum; Prona pars gilva ut in mare. Alæ in utroque sexu pro corporis mole exiguæ, quas inter

ter volandum celerrimè mover, & paulò supra aquæ superficie[m] mira celeritate fertur. Hæc etiam ampullam seu labyrinthum in aspera arteria habet : quod maribus proprium opinati sumus.

A. 3. *Mergus major cirratus* Gesn. *Albellus alter* Aldrov. *The WHITE NUN*. Magnitudine ad Anatem fistularem accedit, 24 unciarum pondere. Vertex, caput, collum alba, exceptâ maculâ, sub crista seu cirro à vertice retro dependente, nigrâ, cirrum ambiente, & in acutum angulum desinente, aliâque utrinque ab angulis oris ad oculos protensâ. Prona corporis facies tota nivea. Dorsum nigrum. Torquis dimidiatus niger duplex à dorso versùs gulam descendit. Alæ variæ sunt ex albo & nigro. Cauda ex cinereo nigra. Rostrum cinereum seu plumbeum ; cujus coloris sunt & pedes, digitis membranâ fuscâ connexis.

Fæmina hujus generis *Mergus Glacialis* Gesnero dicitur, cui Caput totum & genæ ruffæ, gula albet. In summo pectore supra prolobum coloris obscurioris velut torquis quidam cernitur. Crista nulla. Supina pars tota, alis exceptis, è cinereo fusca.

A. 4. *Mergus cirratus* fuscus. A Mergansere fæmina differt 1. Magnitudine qua illi multum cedit. 2. Colore in dorso obscuriore, & fusco potius quàm cinereo. 3. Crista in capite oblonga retro dependente. 4. Macula alba in alæ basi. Ob cristam à capite longam retrorsum dependentem, fortè hæc fæmina fuerit *Mergi cirrati*, aliæ tamen notæ repugnant.

5. *Mergus Rheni* Gesnero Aldrov. T. 3. p. 275. Excepta magnitudine qua eam accedit, & cirri absentia, Avem Albellum dictam per omnia refert, ut ego sane eandem putem : eò magis quòd *Leonardus Baltner* auceps & piscator Argentinensis, diligens sanè & industrius, qui aves omnes Rhenum frequentantes sedulo observavit, descripsit, & delineari fecit, non aliam hujus generis avem præter Albellum exhibet, quam *Nonne albæ* titulo insignivit.

Aves Palmipedes latirostræ majores, seu
ANSERINUM Genus.

ANserini generis notæ sunt 1. Moles corporis major. 2. Collum oblongum. 3. Alæ amplæ; cauda quoque ampla & in circulem circumferentiam terminata. 4. Annulus circa uropygium albus. 5. Dorsum elatius & rotundius, nec acleò planum & depressum ut in Anarino genere. 6. Rostrum ad basin crassius, versùs apicem tenuius & magis resimùm quàm Anatibus.

A. 1. *CYGNUS mansuetus*, *The TAME SWAN*. Magnitudine quâ omnes hujus generis aves superat, colore undique niveo, lobo carneo nigro antrorsum flexo ad basin rostri, à reliquis hujus generis insigniter differt.

A. 2. *CYGNUS ferus*, *The WILD SWAN*, or *ELK*, & alicubi, *The HOOPER*. Non tantùm feritate sua, sed & aliis accidentibus, quæ specificam, ut vocant, distinctionem arguunt, à præcedente distinguitur. 1. Magnitudine & pondere ei cedit. 2. Color non undique niveus est, ut in illo, sed medium dorsum & minores alarum pennæ cinerascunt, fuscis etiam pennis interdum albis intermixtis. 3. Rostrum ad basin cute nuda pulchrè lutea obducitur. 4. Aspera arteria mirabili modo sternum ingreditur inibi que reflectitur.

A. 3. *ANSER domesticus*, *The TAME GOOSE* Cygno minor est, Anate major. Collo brevior quàm Cygnus, longior quàm Anas. Color ut in aliis avibus domesticis varius, vel fuscus sci. vel cinereus, vel albus, vel ex fusco & albo mixtus. Mas plerunque albus est. Rostrum & pedes in junioribus lutei, in adultis plerunque rubri. Cùm irascitur, sibilum edit Serpentis instar.

A. 4. *ANSER ferus*, Magnitudine Anserem domesticum æquat, éstque figurâ corporis ei persimilis, nec colore multum abludit: in universum supinæ partis color obscurè cinereus seu fuscus; pronæ albidus, sensim lucidior

dior ad caudam usque, ubi prorsus niveus. Caudæ etiam supernè incumbentes pennæ albæ. Rostrum basi & apice nigrum, media parte croceum.

A. 5. BERNICLA seu *Bernacla*, The BERNACLE, or CLAKIS. Anser domestico minor est, Rostro nigro, Anserino multò minore & brevior. Mentum, maxillæ, & quod rostro contiguum est, albet, excepta tamen areola à rostro ad oculos nigricante. Collum ad sternum usque supra subtrúsque nigrum. Prona pars corporis alba cum aliqua cinerei mixtura, infimæ tamen femorum plumæ paulò supra genua nigræ. Cauda nigra. Alæ (pennæ coloribus abicante, nigro, cinereo transversim fitis distinctæ) pulchram speciem exhibent. Dorsum nigro & cinereo varium. Maritima Lancastriæ frequentat.

A. 6. BRENTA, The BRENT-GOOSE, *Anas torquata* Bellonii. Anate paulò major est, & figurâ corporis longiore. Caput, collum, & pars superior pectoris nigra. Ad medium tamen colli utrinque macula seu *lineola* alba torquis speciem exhibens. Dorsum coloris Anserini seu fusco-cinerei; versùs caudam nigricat magis, verum pennæ caudæ proximæ albescunt. Rostrum superioris simile. Pedes nigricant.

D. *Johnson* hanc fœminam superioris esse existimat, quòd cum Berniclis congregetur & unà volitet. In maritimis Septentrionalibus.

In Suffexiæ & Hantoniæ maritimis frequentem esse à D. *Tancredo Robinson* habeo.

A. 7. BRENTHUS, The RAT, or ROAD-GOOSE. Anser domestico dimidio minor est. Rostrum vix unciale, nigrum uti & pedes. Vertex & pars colli nigricant. Plumæ ad imum rostrum, gula, pectus fusca. Reliqua pars prona alba; lupina cæsia seu subfusca. Pennæ alarum rectrices, ut & caudæ, nigræ: Hæc tamen utrinque albas aliquot habet. In maritimis Danelmensibus & alibi in Septentrionalibus. D. *Johnson*.

Insignissimus Vir D. *Martinus Lister*, M.D. Literis Septembri mense, Anno 1685. ad nos datis, duas aut fortè tres adhuc species superaddit; Eæ sunt,

A. 1.

138 SYNOPSIS METHODICA

A. 1. *Anser Hispanicus* parvus, Brentæ magnitudine ; figurâ & colore, ad Anserem domesticum accedente. *Cur Hispanicus dictus sit me latet, nisi quòd ab Hispania ad nos advolare credatur.*

A. 2. *Anser maximus niger*, The WHILK dictus, ineunte Bruma primùm adveniēns : Rarò alibi quàm in pratis pascuísque observatus, ubi herbis vescitur.

A. 3. *Anser palustris noster*, GREY LAGG dictus. Huic magnitudo Anteri domestico suppar. Caput ex fusco nigricat, & ad medium collum infuscat. Dorsum ex cinereo livescit ; ipsæ autem alæ & earum Remiges nigricant. Uropygium albescit, ejúsque pennæ externæ albidæ sunt. Venter cinereus, is verò imus sensim fit niveus. Rostrum à capite ad mediam ferè partem nigrum, deinde subpurpureum, ipso etiam apice nigro : in superiore mandibula nonnisi unicus denticulorum ordo, atque idem simplex in inferiore ; item huic lingua uno denticulorum ordine armatur. Pedes subpurpurei sive carnei coloris, ungues fere albidī, excepto medii digiti, qui ex majori parte nigricat. Pendet libras $7\frac{1}{2}$ fere. In paludibus agri Eboracensis nidificant : ipsi & eorum Pulli mense Maio pinguescunt, & in deliciis habentur. Hactenus D. Lister, qui tamen hanc speciem ab Ansere fero vulgari nobis descripto diversam esse non fidenter affirmat, quoniam descriptiones in omnibus fere, excepto Rostrī & pedum colore, conveniunt.

8. ANSER *Cygneus Guineensis*, nonnullis *Anser Hispanicus*. The SWAN-GOOSE. Linea è fusco nigricans à capite per collum summum ad dorsum extenditur. Rostrum, nigrum à cujus radice tuberculum exurgit eidem imminens, qui in maribus & senioribus major est. Torques albus inter oculos & rostrum caput ornat. Pedes rubescunt, & in nonnullis etiam Rostrum. Collo decenter erecto incedit hæc avis.

9. ANSER *Gambensis*. The GAMBO-GOOSE, or SPUR-WINGD GOOSE. Anati moschatæ figurâ similis est, & magnitudinē par ; pedibus tamen longis rubentibus ; Rostrum etiam rubescit. Maxillæ, mentum, & venter alben. Dorsum purpureo obscuro colore splendet. Caput carun-

runculâ rubrâ donatur. Verùm nota maximè characteristica est validum calcar à primo alarum articulo prodians.

10. ANSER *Canadensis*, *The CANADA GOOSE*. Figurâ corporis Anseri domestico responderet, nisi quòd paulò longior sit. Dorsum ex fusco cinerascit Anserini instar, uropygium nigrum est, verùm infimæ plumæ supra caudam albæ sunt; infima etiam pars colli albicat, reliquo nigro. Ab occipite sub oculis per mentum semitorquis albus extenditur. Venter albus: Cauda nigra, ut & majores alarum pennæ remiges, minores & vestitrices è fusco cinerascunt, ut in Anseribus. Pedes nigri. In Ornithotropheo Regio S. Jacobi vidimus & descripsimus.

11. ANSER five *Anas montana Spitzbergenensis* Fridrici Martens. Magnitudo ei mediocris Anseris: Rostrum Anserino quàm Anatino similis. Pennis vestitur ex albo & nigro variis, estque Avis pulcherrima. Anatum more urinatur & sub aquas se demergit. Fœmina Perdicis est colore. Gregatim volant. In insulis humilioribus nidificant, & quatuor fere unà vice ova ponunt, pallide cœrulea, nostratum Anatum ovis paulò majora.

Palmipedes latirostræ minores, seu ANATINUM genus.

ANATINI generis notæ sunt. Pedes quàm pro corporis ratione majores; Corpora minora quàm Anseribus; crura breviora & posterius sita; Dorsum latius & planius, adeoque corpus magis compressum seu depressum; Rostrum denique latius, magisque resimul. Sunt autem vel *Feræ*, vel *Domesticæ* seu mansuetæ. *Feræ* iidem duorum sunt generum. 1. *Marinæ*, quæ in aquis falsis victum quærunt, & plerunque circa mare versantur, rostris latioribus magisque resimilis. Digito postico amplo, tenui, seu membranâ aucto; caudâ longiusculâ;

culâ, non tamen acutâ. 2. *Fluviatiles* seu aquarum dulcium, *Plash-Ducks*.

Anates MARINÆ.

A. 1. **T**ADORNA *Bellonii*, *Vulpanser* quibusdam, *The SHELDRAKE*, or *BURROUGH-DUCK*, *called by some*, *BERGANDER*. Magnitudine inter Anatem & Anserem media est. Rostrum ei breve, latum, nonnihil recurvum, rubrum, præter nares & unguem extremum, quæ nigra. Gibbus propè basin superioris mandibulæ exoritur oblongus, carneus. Caput & colli superior pars è viridi obscuro splendente nigricant. Reliquum colli, & prolobi regio nivea. Pectus & Scapulæ pulcherri-
mo leucophæo seu mali Aurantii colore imbuuntur, qui velut annulus quidam totum corpus antè cingit. Reliquum pectus & venter alba, area tamen nigra ad anum usque producta nigrum medium dividit; ponè anum pennæ leucophææ. Dorsi pennæ ut & alarum, præter eas quæ in extremo articulo sunt, albæ: Scapulares longæ dorso incumbentes nigræ. Caudæ pennæ albæ apicibus nigris. Breviter: Avis hæc pulcherrimis coloribus, albo, nigro, leucophæo distincta & varia è longinquo spectabilis & cognitu facillima est.

In maritimis *Cambriæ* & *Lancastriæ* plurimas vidimus: quin & Orientale Angliæ latus magno numero frequentant.

2. *ANAS capite ruffo major. Capo rosso maggiore Romæ*. Magnitudine Anatem vulgarem æquat superatve. Rostro sanguineo, ad caput crassiore; pedibus, rubris, membranis digitos connectentibus nigris. Capite plumulis densis extantibus grandiore. Vertex plumagine sericea peramœna diluvius ruffa, velut in cristam assurgente vestitur. Irides oculorum miniatæ. Collum totum, scapulæ, pectus, venter totus, nigro colore imbuuntur: laterales sub alis, & quæ alas subtrus vestiunt plumæ albæ rubore dilutæ; ut & alarum remiges, supina parte, apicibus nigris; Corpori tamen proximæ 6,

ut

ut & vestitrices, cinereæ, exceptis iis quæ in summa alæ costa existunt, quæ lineam albam efficiunt. Hanc avem Romæ nacti sumus.

A.3. ANAS S. Cutberti seu Farnensis, An *Eider* plumis mollissimis Wormii? *The CUTBERT-DUCK*. Anatem vulgarem magnitudine superat. Mas ex albo & nigro varius est. Dorsum album, cauda & rectrices alarum pennæ nigræ. Pedes nigri. Rostrum Anatino longitudine suppar, mandibula superior extremo nonnihil incurva. Fœmina colore ad Tetraonem fœminam accedit. In utroque sexu plumulæ latera rostri convestientes, in angulum utrinque ad medias usque nares [sub naribus] procurrunt; quod huic generi peculiare est, nec me in ullâ aliâ, Anatis specie hæcenus observâsse memini. Nullibi apud nos quàm in insula *Farna* parit aut conspicitur: Pullos recens editos ad mare secum deducit, cùmque eis discedens terram nunquam respicit: quò abeat incognitum.

A.4. ANAS *niger* Aldrov. *The great BLACK DUCK*. Anate vulgari major est. Rostrum latum & breve utrinque flavescit, medio nigræ, cum ungue rubro. Caput & colli pars superior in nigro virescit. Corpus reliquum totum nigrum præter lineam uncialem transversam albam in medio alarum, & maculam ponè oculum utrumque albam. Crura & pedes externa parte rubra, internâ citrina, membrana & ungues nigerrimi. In intestinis ad rectum ferè cochlearum & testarum minuta frustula indigesta reperi, at verò in intestino recto satis concocta & quasi in arenulam comminuta: quod notatu dignum.

A.5. ANAS *niger minor*, Eboracensibus SCOTER. Anate tantillo minor est, sed figuræ rotundioris. Color totius corporis undique pullus seu niger, plumis in mento & pectoris medio admixtis cinereis. Rostrum circa nares lutescit, aliàs nigrum. Pedes nigricant. In mare Rostrum præcipuè est notabile, 1. Quòd nullum habeat in superiore mandibula ligulam seu unguem, præter normam aliarum omnium hujus generis Avium. 2. Quòd superior mandibula supra nares juxta frontem in insign-

nem magnitudinem extumescat, in binas velut nates divisum, quas linea flava intercurrit & distinguit. In vadis Lancastrensis frequens est. Gallis *Macreuse* audit, Vid. Transact. Philosoph. N. 172.

A. 6. *FULIGULA* fortè Gesneri, *The SCAUP DUCK*. Anate vulgari paullo minor est; Rostro lato, cœruleo, laminâ superiore multo latiore. Caput & pars colli è nigro virefcit. Pectus nigrum. Venter albus, asperso ima parte subflavo; circa podicem subnigra est. Dorsus pars superior fuliginosa, media alba, lineis fuscis transversis cymatili ductu varia. Alæ fuscae maculis albis cum linea transversa alba variæ. Verùm colores, præsertim capitis & colli in hoc genere in infinitum variant. Pedes unâ cum membranâ & unguibus è fusco cœrulefcunt.

A. 7. *ANAS cristata*, An *Fuligula prima* Gesneri Aldrov. ? *Mergus cirratus minor* Geln. *Querquedula cristata* sive *Colymbis* Bellonii, *The TUFTED DUCK*. Anate minor est, pondere bilibrâli; corpore brevi, crasso. Rostrum latiusculum, præter apicem (qui niger est) pallidè cœruleum. Pedes lividi seu obscurè cœrulei; membranæ digitos connectentes nigrae. Caput è purpureo nigricat, cirro setunciali ab occipite retrorsum dependente. Color in supina parte tota, Inque collo & summo pectore fuscus obscurior & propemodum niger; imum pectus & venter ad anum usque alba aut argentea. Mediæ alæ pennæ remiges niveæ.

A. 8. *ANAS platyrhynchos mas* Aldrov. *Clangula* Geln. *Quattr' occhii* Italis. *The GOLDEN EYE*, i. e. *Anas chrysophthalmos*. Anate minor est, corpore crasso, breviusculo; capite itidem crasso, obscurè viridi, seu è viridi aut purpureo nigricante. Ad angulos oris macula majuscula subrotunda alba, unde nomen Italicum *Quattr' occhii*. Irides oculorum aureæ unde *Golden Eye* nomen. Collum totum, tam pronum quàm supinum, scapulæ, pectus, & venter totus alba. Interscapulum & inferior pars dorsus tota nigricat. Alæ ex albo & nigro variæ sunt. Cauda penitus nigra. Crura perbrevia crocea, membranæ digitos connectentes fuscae seu nigricantes.

Anas

Anas fera capite subruffo minor nobis Will: Ornitholog. pag. 282. descripta hujus fœmina est; ut aucupes nobis retulerunt.

A. 9. *ANAS platyrhynchos altera sive clypeata Germanica. Anas latirostra Schw. latirostra major. Gesn. Aldrov. The SHOVELER.* Anate vulgari aliquanto minor est. Rostro oblongo, nigerrimo, versus apicem multò latiori quàm ad basin, clypei instar excavato, extrema circumscripti-one subrotundo, ab aliis congeneribus faciliè distinguitur, si aliæ notæ deessent. Crura & pedes miniaceæ, minora quàm in aliis Anatibus. Caput & collum ad medium usque pulchrè cœrulescunt, item minores tegumentum alæ pennarum ordines. Mediæ alarum pennæ remiges notam viridem saturatiorem splendentem obtinent. Prolobi regio albicat: reliquum pectus & venter totus ad podicem usque rubent: infra anum nigricat. Dorsum fuscum viridi aut cœruleo purpureove splendente colore dilutum. Cauda ex albo & nigro varia. Uno verbo Avis est pulcherrima.

A. 10. *ANAS fera fusca Gesneri Aldrov. item Rothals Gesneri Penelops Veterum Aldrov. An fera 8. seu Erythrocephalos 1. Schevench. The POCHARD or great REDHEAD-ED WIDGEON.* Penelope vulgari, [*The Common Widgeon, or Whewer*] dictâ major est, & pro magnitudine brevior crassiorque. Caput & collum ferè totum saturè fulvum aut rufum; inferior pars colli, & pectoris summa nigra; media pars pectoris alba, inferior lineolis fuscis varia. Medium dorsum & alarum vestitricæ cinereæ, lineolis transversis fuscis undularis pulchrè variegatæ. Cauda tota nigricat. Alarum remiges è fusco cinerascunt, apicibus mediarum 11. albis. Rostrum extremum aliquousque nigrum, media pars cœrulea, basis iterum nigra. In maritimis frequens habetur.

Nota hujus avis characteristica est unus idemque per totas alas color, sine ullis diversi coloris pennis in mediis alis.

11. *ANAS fera fusca minor, An Anas Fuligula altera Gesneri Aldrov. p. 227? Glaucium sive Morillon Bellon? Capo rosso Venetiis.* Magnitudine est inter Penelopen & Quer-

Querquedula media: Rostro obscure cœruleo, ad margines pallidiore, Apice seu ungue rotundo nigro: Oculorum iridibus lacteis aut eburneis. Capite satis crasso, toto ruffo seu ferrugineo: in angulo tamen mandibulæ inferioris macula exigua alba cernitur: collo brevi, cujus medium torquis fulcus ambit. Supina pars fusca; exceptis alarum remigibus, quæ albæ summitatibus fuscis, ad id ut cum ala extenditur lineam latam transversam albam efficiant. Pectus infra torquem ad arcos usque ruffum, qui color ad medium propè scapularum pertingit. Reliquum pectus & venter summus albidus, imus ad orificium usque excrementorum fuscus. Plumæ sub cauda nivæ, ad femora longiores ruffæ. Crura & pedes nigricant.

Glaucium Bellonii huic similis & congener Avis est, si non eadem. Differt magnitudine quâ excedit, & torque circa collum albo.

12. *ANAS fera capite subruffo major.* An *Anas Schellent* dicta Gesnero *Aldrov.* p. 223? Penelopi par est, aut major; rostro 2. dig. longo, media parte ultra nares sordide flavicante: Oculorum iridibus pulchrè flavis: Capite sordide ruffo; collo cinereo, supina parte reliqua obscure fusca seu nigricante. Macula lata alba in utraque ala media. Prona pars corporis ad caudam usque alba lineâ transversâ ad podicem fuscâ. Pedes obscure flavicant, articulis & membranis digitos incedentibus nigris. Verum colores in hac & aliis Anatibus variant nonnihil in diversis individuis.

13. *ANAS platyrhynchos pedibus luteis* Aldrov. *Platyrhyncho* vulgari paulò major est; Rostro partim fusco, partim subluteo. In toto corpore coloris ex subluteo cinerei maculæ fuscae sunt disseminatæ, densæ & exiguæ in capite, majores sed rariores in collo, dorso, uropygio & cauda; multò adhuc majores & crebriores in toto dorso. Alas fuscas medias linea alba transversim secat, post quam macula cœrulea tetragona. Hanc altera lineâ alba excipit. Crura lutea; digitos fusca membrana conjungit.

Avis est fœmina, nobis nondum observata.

A. 14. *ANAS caudacuta*, *Havelde Wormii similis si non eadem*. *The Swallow-tail'd SHELDRAKE* of Mr. Johnson. Penelopes minoris magnitudine est, Rostro brevi resimo, ad basin, & extremum nigro, media parte rubro. Caput, collum, & anterior pars pectoris alba, ut & dorsum antè usque ad scapulas, verùm ponè aures fusci mixtura quædam habetur. Dorsum reliquum, alæ, pectus ad medium ventrem nigra; reliquus venter albus. E scapulis utrinque descendunt plumæ longæ, acuminatæ, albæ. Cauda 16 habet pennas, extimam utrinque totam albam, medias 4 totas nigras, quarum duæ reliquis, tribus unciis longiores sunt, & valdè acuminatæ; reliquæ pennæ exteriore margine albæ, interiore nigræ. Pedes pallidè cœrulei, cum membranis nigris.

ANATES fluviatiles, aquas dulces præcipuè frequentantes.

A. 1. *ANAS torquata minor*, Aldrov. *Boschas major*, *The common WILD DUCK*. A. 36. ad 40 uncias pendet. Rostrum ex viridi flavum, $2\frac{1}{2}$ digitorum. Pedes crocei, ungues fusci. Mari Caput & collum summum pulchrè virescunt. Succedit torquis albus, qui tamen posteriore parte à circulo deficit. A torque gula ad pectus usque castanea. In alis mediis color purpureo cœruleus splendens, & niger eminent. Verùm reliquæ plumaginis colorum descriptionem vide in *D. Wilughbeii Ornithologia*. Fœmina magis decolor est, neque enim caput ei viride, neque collum torquatum; verùm utrumque ut & totum corpus ex albo, fusco & ruffo nigricante varium ut in anate fœmina domestica. Mediæ 4 caudæ pennæ reflectuntur in mare.

A. 2. *ANAS platyrhynchos rostro nigro* ♂ *plano*. Aldrov. *The GADWALL*, or *GRAY* Magnitudine Penelopen majorem æquat superatve & ad Anatem proximè accedit. Corpore est longiusculo. Rostrum quale Anati vulgari, aut porius Querquedulæ. cujus latera crocescunt, media pars nigra est, uropygium totum nigrum, Dorsum fus-

L cum

cum fimbriis plumarum ex albo ruffis. Mentum & maxillæ albæ, maculis parvis fuscis punctatæ. Caput ex cœruleo nigricat. Inferior colli pars, superior pectoris, & scapulæ plumagine pulcherrima, ex albo & nigro varia, vestiuntur. Latera itidem lineolis & nigris pulcherrimè variegantur. Pectus albet; venter sordescit maculis transversis nigris. Cauda brevis alba 16 pennis composita; quarum mediæ duæ supernè fuscæ. Pennæ alarum remiges fuscæ: habetur tamen macula alba in media ala, quem colorem superius terminat color è nigro purpurâ nitens: in tertio vestitricum ordine maculæ ruffæ seu rubræ sparsæ. Hac ergo velut characteristicam nota hæc Avis ab aliis omnibus sui generis distinguitur, quòd tres in singulis alis, aliam super aliam diversi coloris maculas habeat, albam, nigram, ruffam.

Anas muscaria, Muggent Gesnero Aldrov. lib. 19. cap. 41. Sic dicitur quòd muscas supra aquam volantes capter. Magnitudo & figura fere domesticæ Anatis. Rostrum latum, simum, croceum. Color plumarum per totum fere corpus varius est, ex nigricante, charopo, albo & mustellino alicubi mixtus, alibi distinctus. Pedes flavent: digitum membranis nigricantibus cohærent. Collum tam supina quàm prona parte *συνόν* est quibus diximus coloribus. Vertex magis nigricat; qui color etiam in alis habetur.

A. 3. *Penelope* Aldrov. An *Anas fistularis*? The WIGEON, or WHIFWER, or WHIM. Anate minor est, Caput & collum superius rubia, maculis nigricantibus confersa. Vertex rostrum versùs dilutiore est colore, ex ruffo seu luteo albido, quæ hujus generis nota characteristicam est. Pectoris partem superiorem, ut & latera ad alas usque, vinaceus color pulcherrimus ornat cum lineolis transversis nigris creberrimis. Pennæ scapulares, ut & laterales sub alis, lineolis transversis nigris & albis perbellè pinguntur. Medium dorsum fuscum; Caudæ regetes nigræ. Caudæ pennæ 4 fuscæ. In alis macula est pulcherrima cœrulea Rostrum plumbeum, ungue nigro. Pedes ex fusco albicante cœrulescunt. Avis est frequentissima ad mare & in palustribus.

A. 4. *Phasceas* fortè Gesnero D. *Johnson*. Eboracensibus, *The WIGEON*. Præcedentem magnitudine æquat, éstque corpore depresso aut plano. *Caput & collum* totum pallidè fusca, saturatioribus seu nigricantibus maculis triangularibus crebris respersa. *Corpus totum, alæ, cauda* obscurè brunnea seu fusca; marginibus penarum extremis dilutioribus, & interdum albertibus. Alas lineæ duæ transversæ albæ distinguunt, spatio intermedio incano. *Pectus & latera* dorso sunt dilutiora, obscurioribus maculis varia. *Venter* niveus, nisi quoddam sub cauda maculæ aliquot obscuræ appareant. *Rostrum & Pedes* subcœrulei.

A. 5. *ANAS caudacuta* Aldrov. *The SEA-PHEASANT, or CRACKER*. Corpus huic gracile, collum longiusculum, Penelopes vulgaris magnitudo, *Rostrum* ex cœruleo & nigro varium. Color *capitis* ferrugineus: retro aures leviorè purpurâ tingitur; ab occipite utrinque linea alba incipit quæ ad gulam tendit. *Prona* pars tota, collum, pectus, venter, adusque excrementorum exitum alba, exinde nigra sub caudâ. *Corpus supinum* variis & pulcherrimis coloribus ornatur, verum caudæ pennæ mediæ $2\frac{1}{2}$ digitis productiores reliquis huic pro descriptione & ab aliis omnibus distinctione sufficiunt.

In maritimis Suffolciæ circa *Aldburgh*, & *Orford* observavimus. Habetur & alibi in Anglia.

A. 6. *Querquedula secunda* Aldrov. *The COMMON TEAL*. Minima est in Anarino genere (excepta sequente) 12 unciarum pondere. *Rostrum* latum, nigrum, sursum nonnihil reflexum. *Caput* summum & superior pars colli ruffa seu spadicea. Ab oculis utrinque ad occiput ductus obscurè viridis, serici instar splendens. Ductus hosce sub occipitio macula nigra intercedit. Sub oculis linea alba ruffum colorem à viridi separat. Quæ collum inferius, dorsum summum & latera sub alis vestiunt, transversis lineolis nigris & albis alternis undularis perbellè pinguntur. *Prolobi* regio in nonnullis flavescit maculis nigris velut squamis pulcherrimè picta. *Pectus & venter* canescunt. Sub uropygio macula nigra. *Alæ* fuscæ; medias macula viridis illustrat. *Cauda* 16

pennis composita ; tota fusca. *Pedes* pallidè fuscis ; membrana digitos connectens nigricat. Carne est in Anarino genere laudatissima.

7. ANAS CIRCIA Gesn. *The SUMMER TEAL*. Omnium Anatum minima est. *Rostrum* ei nigricat ; tota pars supina fusco cinerea : in *Dorso* pennarum extremitates albicant : in *alīs* linea uncialis partim atra, partim smaragdina, utrinque alba. In *cauda* pennæ acuminantur. Tota pars prona ex albo dilutè flavescere videtur. In *pectore* tamen & ima ventris parte maculæ majusculæ nigricantes densè admiscuntur. *Crura* dilutè cœrulescunt ; membranæ digitos intercedentes nigræ.

8. QUERQUEDULA *prima* Aldrov. p. 209. *varia* Gesner. *Garganey* Mediolanensibus, *Kernel* *Argentoratensis* Gesner. Figura corporis Querquedulæ simillima est : Nota maximè characteristica quâ ab illa differt est linea lata alba ab interiore oculi angulo utrinque inchoata, & supra oculos aurèsque ad medium ferè cervicis extensa. *Verteæ* autem ferè totæ nigricat, cum in Querquedula nostrate vulgari obscurè ruffa sit.

9. ANAS *fea* 16 seu *minor* 4 *Schwenckf.* Anas parva mustelaris, Vulpanas, magnam habet cum Querquedula similitudinem. Capitis rubore mustelam seu Vulpem refert.

Anates exoticæ Brasilienses.

1. ANAS *sylvestris Brasiliensis magnitudine Anseris.* Marcgr. *Rostrum* est nigro, *pedibus* fuscis : Tota nigra exceptis alarum principiis, quæ alba, nigredini tamen illi viridis color transplendet. *Crista* in capite nigra, & supra rostri exortum massa corrugata nigra. Circum oculos cutis rubra.

2. *Anas sylvestris Brasiliens.* APECA APOA dicta. Marcgr. Magnitudo Anseris octimestris ; figura Anatis nostratis, à qua differt, 1. Quòd major sit. 2. *Rostrum* nigrum & in extremitate aduncum. 3. Super *Rostrum* cristam gerat carneam, latam & rotundam ferè, nigram, ma-

maculis albis insignitam. 4. Pedum & crurum color non ruber, sed è cinereo fuscus. In summitate rostri foramen transversum magnitudine Pisi obtinet, ab utroque latere conspicuum, quod vice narium fungitur. Reperitur passim ad fluvios.

3. IPECA GUACU *Brasiliensium* Pisoni. Domestica est, ob carnis bonitatem celebris. Mole & figurâ corporis media est inter Anserem & Anatem. *Rostrium* ab extremo ad medium usque flavescit: mox rubra macula mediam partem capitis egregiè tingit. Totum corpus à vertice ad caudam albo colore. *Cygni* instar nitescit. *Pedibus* est Anatinis è flavo rubescentibus. Pinguescit æquè in terra ac in stagnis.

4. *Anas sylvestris Brasiliensis* MARECA dicta, prima Marcgr. *Rostrium* ei Anatinum fuscum, ad cujus exortum in utroque latere macula rubra. Caput *superne* grisei coloris, ad latera sub oculis album. Totum *pectus* & infimus venter ligni querni secti colorem obscurè æmularur punctulis nigris variegati. *Crura* & *pedes* nigri. *Cauda* grisea. *Alæ* in exortu ex griseo subfuscescentis coloris. *Remiges* autem in uno latere ejusdem coloris, in altero dilutè brunnescentis (qualis in pedibus esse solet) medio autem coloris viridis transplendentis cum fimbria nigra.

5. *Anas sylvestris Brasiliensis* MARECA dicta, secunda Marcgr. Eâdem cum præcedente magnitudine & figurâ; *Rostro* nigro splendente. *Supina* parte tota Umbræ coloris cum fusco mixti. Sub *guttura* albicat. Ante oculum utrumque macula parva rotunda, ex albo flavescens: *Pectus* & *venter* obscurè grisea aureo admixto. *Cauda* nigra. *Alarum* pennæ fulcæ quibus viride transplendet; & mediæ alarum pennæ eximia viriditate & cœruleo in fusco transplendent, hîc & undam nigram habent; extremitas autem *Remigum* tota alba est. *Crura* & *pedes* insigniter rubri seu miniati coloris sunt. Alata avis apprehensa manus & linteamina tingit colore miniaceo sanguineo.

Anates Domesticæ.

1. **A**NAS *domestica vulgaris*, The Common TAME DUCK. Notior est quàm ut descriptione indigeat, Anser minor, gallinæ suppar, corpore depresso, dorso lato, latoque rostro, cruribus brevibus, retroversus dispositis: colorum mira in diversis avibus varietate; ut in aliis domesticis evenit. *Mas* plumas in uropygio erectas & caput versùs reflexas habet.

2. ANAS *domestica rostro adunco*, The HOOK BILL'D DUCK. Anati domesticæ vulgari specie externa simillima est, *rostro* præcipuè differt quod latum est in extremo, longius paulò quàm in vulgari, deorsum modicè inflexum. *Caput* quoque minus & gracilius esse videtur.

3. ANAS *moschata*, an *Cairina* Aldrov.? Maxima est in hoc genere omnium quas hætenus vidimus. Color *maris* tum *fæminæ* plerunque ex nigro purpurascens. Circa *nares* & *oculos* rubras habet carunculas. *Vocem* edit raucam, & vix audibilem nisi quando irascitur. Anglicè, The MUSCOVY DUCK dicitur, non quòd è Muscovia huc translata esset, sed quòd satis validum moschi odorem spiret.

Quærendum annon Anas Cayrina Aldrov. Anas Libyca Bellonii, & Anas Indica Gesneri una eademque Avis species sint, mihi sanè eadem videntur.



APPENDIX.



N Joan. Nieuhoffi Itinerario Avium sequentium nomina invenio: Descriptiones apud Autorem vide, nec enim ego linguam Belgicam calleo, unde nec Aves locis suis disponere valeo.

1. *Vogel Rubus.* Passeris circiter magnitudine est; rostro & pedibus cœruleis, dorso & caudâ

rubrâ; alis versicoloribus ex albo & nigro; capite summo viridi. Duæ e caudâ exeunt pennæ prælongæ ad instar Avium nonnullarum Paradisearum.

2. *Guira:* Hanc duûm generum esse scribit. [Apud Brasilienses plurimæ occurrunt Aves *Guira* dictæ. Hanc ergo vocem lingua Brasilica avem significare existimo] Una inquit species pectus (*buck*) habet rubrum, altera caudam cœruleam cum longa in ea penna.

3. *Pero,* Avicula est longa, non tamen crassa, à summo rostro ad extremam caudam plus spithamam extenta. Rostrum longum & *Kromachtigh.* Cauda ut in *Guira.* Plumis vestitur cœrulescentibus flavo notatis. Pedes parvi. Formicis victitat.

4. *Wijtbekken.* Leucorhynchi.

5. *Strantloopers.* Gallinaginis minoris species sunt.

6. *Quackels.*

7. *Rijs vogels.*

8. *Penne vogels.*

9. *Lory.* Pittaci species esse videtur.

10. *Geel-vinck:* Chloris.

11. *Rijs mossen,*

12. *Reigers*. i. e. *Ardeæ*.
13. *Springers*.
14. *Bosch-duiven*. i. e. *Columba sylvatica*.
15. *Gout-vinken* : *Aurivittis* seu *Carduelis*.

Aves exoticæ quarum titulos è Musei Leydensis Catalogo transcripsit & ad nos misit
D. TANCREDUS ROBINSON.

Avicula *Zeylanica*, mellivora, lucida; rostro nigro longissimo, adunco, acuto; *Tuttica Zeylanensis* à sono. *Mus. Leyd.* nigra est, pectore flavo.

---- Eadem rostro breviori.

Avis Zeylanica eleganti crocato colore, *Kakakurulla Zeylanensis*, i. e. *Avis crocea*. *Mus. Leyd.*

Avicula Zeylanica mortem prænuncians, *Polidscha Zeylanensis* à sono. *Mus. Leyd.*

Avicula Africana mellivora, floribus *Leonuri* insidens. *Mus. Leyd.*

Du Tertre Hist. Nat. Ins. Antill,

PICA Antillarum. Rostro est & pedibus rubris; collo cœruleo torque alba cincto; *Crista* seu galea in capite alba lineis nigris striata, quæ à rostro usque ad dorsum extenditur, quod plumis leucophæis [*tannees*] vestitur ad uropygium, quod totum flavum est: undè exit cauda magna, & pennis composita, cœruleis albo striatis, quarum duæ reliquas & aut 10, pollicum longitudine excedunt. Alarum vestitricæ leucophææ sunt nigris lineolis radiatæ; remiges cœruleo & viridi coloribus mixtis variæ sunt. Vox *Picarum* Europæarum similis.

Idem *Du Tertre* aliarum etiam Avium meminit, quas *Grives*, i. e. *Turdos pilares*, & *Gros becs*, i. e. *Coccothraustes*, & *Bout de petun* à voce dictas, nominat; item

Serinos,

Serinos, & *Chadonneret* dictas, & *Luscinias*. Hæc postrema satis similis est *Regulo* Europæo, verum paulo major, æstque sola ex Avibus Indicis (inquit) mihi visis, quæ canora est. Muscis & Araneis parvis victitat.

FREGATA avis Rochefortio & Du Tertre *la Fregate*: *Rabiborcado* & *Raboforcado* Hispanis & Lusitanis dicitur, quoddam *caudam* bifurcam sartoriæ forcipis instar nunc explicat, nunc contrahit: *Fregate* Gallis ob pernicitatem volatilis. *Corpus* gallinaceo non majus, verum ventriculus valde carnosus est. *Marium* plumæ omnes nigræ velut *Corvi*. *Collum* mediocris longitudinis, *Caput* parvum; *Oculi* nigri, acie acutissima & *Aquilina*. *Rostrum* satis grande, totum nigrum, *mandibulâ* superiore unci instar recurvâ. *Pedes* breves; *ungues* *Vulturini*, toti nigri: *Alæ* magnitudinis fere prodigiosæ, ut spatium extensarum ab extremo ad extremum commensuratum septem interdum vel octo pedum sit: nec sine causa, cum enim ad trecentas interdum leucas à litoribus in altum provolent, tanta alarum longitudo eis omnino necessaria est. A ramis arborum in quibus resident difficulter admodum se levant: verum cum semel in sublime evolarunt, motu placido absque ulla ferè alarum agitatione aërem tranantes videas velut fluxu aut lapsu quodam, ad instar *Milvorum*. Mas sub gutture *palearia* dependentia habet admodum *Galli gallinacei*, si ætate provectior sit: Juniores enim iis carent.

Si quando pluvix impetus aut ventorum vis urgeat, nubes ipsas transcendunt & in mediam aëris regionem e-nituntur, donec præ altitudine visibus humanis se subducant, & inconspicue evadant.

In insulas quasdam parvas desertas secundum oram Americanam vesperi se recipiunt, ut internoctu quiescant, ibidem etiam nidificant & pariunt, ut aliæ multæ Aves marinæ.

Memorabile inprimis est quoddam de hac Ave refert *Ovidius*, Cum Oceano intumesciente & ad Panamam appellente ingens piscium Sardorum acervus & alluvies simul congregatur, infinita Onocrotalorum multitudo aërem obnubilat, qui in mare se modò præcipientes dant ut pisciculos

sciculos suffurentur, modò in aëra se sublevant, ut illis tutò velcantur, idque toties repetunt, donec diræ suæ fami satis parentaverint. Sed quòd adhuc magis ad spectatorum voluptatem facit, hoc est; quòd aliæ ibidem grandes admodum & rapacissimæ volucres dimorentur, *Caudæ infurcatae* dictæ, quæ, mirum est, quàm Onocrotalos hosce persequantur, ut coacti etiam sint piscium prædam evomere, quàm Aves rapacissimæ illæ priusquam in mare decidat inter volandum in aëre piscantur. *Joan. Faber* Notis in Animalia Novæ Hispaniæ *Nard. Anton. Recchi*; ex *Oviedo*.

Aves suspectæ, nimisque breviter aut minùs accuratè descriptæ.

E. Joan. Eusebii Nierembergii Historiæ Naturæ Libro Decimo: quarum descriptiones è Franc. Hernandez Tractatu de Avibus Mexicanis mutuata sunt.

PASSER STULTUS.

MERUIT famam & nomen insignis stultitia Avis hujus mitissimæ. Manus apprehendentium non fugit aut timet; admiratur solùm aut stupet. Vescitur pisciculis; Voce imitatur *Graculum*, magnitudine *Picam*, formâ *Larum*, præter frontis partem rostro adjacentem, quæ cinerea est; palmipes, rostro tres uncias longo, tenui, obrotundo, rectoque, sed propè extremum nonnihil incurvo: pedibus quoque, qui cæterorum palmipedum sunt, & cruribus nigris; pupillâ etiam nigrâ, & membrana oculos tegente in ambitu cinerea. Marina Avis est. Cæterum mansuetudo avium insulæ *Cernæ* nobilis est: appellantibus nautis perinde insident ac arboribus. Eadem securitas venatûs est; accedunt ac subeunt manus.

In insulis desertis aut incolarum vacuis non mirum est Aves homines primum inspectos non formidare, verum audacter accedere, iisdemque fortasse insidere, ut aliis animalibus solent; antequam capte, cæse, fugate aut aliquo modo territæ fuerint.

Avis ovimagna Daie dicta. Quadam ovorum ac pul-
lorum insolentiâ celebris est avis *Daie* dicta, non ex-
cens Columbam, & commodè edulis. Nidum caudâ ac
pedibus excavat, locis sabulosis, quatuor altum spithamas,
ubi ponit ova per imbres Anserinis majora, & pugnum
ferè lata, *Tapun* incolis dicta, quinquagena pluravè &
citra ullum albumen, crassæ ac pinguis substantiæ; quæ
assa coctæ boni sunt & pinguis alimentum, frixa verò
crassi malique & concoctu difficilis. Mirum est [imò
falsum] Avem tam parvam tantæ magnitudinis ova
tamque numerosa edere; eadem tam profunda in scrobe
collocare, & collocata citra incubantis opem atque re-
porem excludi; & statim evolare pullos inde ex-
clusos.

*Historia isthæc proculdubio fabulosa & falsa est. Quam-
vis enim Aves nonnullæ maxima ova pariunt, ut v. g.
Alkæ, Lomwiæ, Anates Arcticæ, &c. Hujusmodi tamen
unum duntaxat, non plura ova ponunt antequam incubent:
nec ullam in rerum natura avem dari existimo cujus ova
albumine careant. Cum albumen præcipua ovi pars sit,
quodque primum fœtui alimentum subministrat.*

Guitguit Avis corvipeta. Magnam audaciam exiguum
capit corpusculum. Minima hæc Avicula Regulo simi-
lis est, viridi colore & suavi nutrimento. Ea est Na-
turæ rerum vis, ut hæc tantula avis, ac ferè nulla aude-
at persequi corvorum examina, eoque cogat ubilibet la-
titare, & se adversus eam in Arundinetis tueri.

*Hæc ficta esse puto ad imitationem eorum, quæ à Veteri-
bus de Regulo traduntur, quod sci. magno animo cum Aquila
pugnare audeat.*

Maia. In insula Cuba præcipuè gregatim volitat hoc
genus, & Ryzi (cujus seminis maximus est apud eas gen-
tes proventus atque usus) devastat lata. Multi & grati
nutrimenti est, & facilis concoctionis, colorisque fulvi;
cui

cui est in colli postica parte, (dictu admirandum, & nulli alii Animali concessum) ventriculus, primùmque receptaculum nutrimenti.

Credat Judæus Apella.

Tuputa seu *Avis verminosa*. A cantu nomen usurpavit. Viva tota farcitur vermibus: hos pro carne habet, his singula membra imbuta: præter hos & pellem nihil carneum. Cutem non perforant densis exornatam penis. Versatur in carectis & herbosis locis: proceras arbores non amat. Phasiano formâ similis est, sed minor.

Gnaviter impudens fuerit oportet qui mendacium hoc confinxit; nimis stolidus aut insanus est qui credit.

Anates quædam Asiaticæ sunt, non immerito *Cornicines* dictæ, ita voce cornuum sonitum imitantur, quæ inflare solent per dispositos equos iter facientium duces. Est ea *Avis*, quamvis inermis, audax & strenua: quam etiam malos dæmones terrere Turcis persuasum est: ceriè libertatis adeò retinens, ut etiam per totam triennium in corte nutrita, facultatem nacta libertatem saginæ anteponat, sedèlique naturales & suetos alveos volatu repetat: *Busbeq. Epist. 1.*

Triton avicula suavissimi cantus Hispaniolam incolit. Tribus vocibus canit; sci. penè indivisibilibus modulis variat cantum, ab acuta voce in aliàs subito delapsa, ut videatur unà omnes edere unòque spiritu multos formare tonos, tanquam si à tribus gutturbus formarentur. Anonymus MS. testatus se audivisse: censet nullam avem jucundioris cantûs, & oppidò præstare Lusciniæ inexplicabili propemodum dulcedine. Negat à se visam hanc avem, solum auditam; sed aliorum testimonio pulcherrimam prodit, & mirifico colorum ornatu variegatam.

Achalalaetli S. *Avis piscium vibratrix*. Columbina est magnitudine & forma; rostro nigro acuminato, 3 dig. longo & pro corporis proportionem crasso. Caput cristâ ornatur, è colore cyaneo in nigrum tendente, longâque. Venter candidis tegitur plumis & collum torque candenti insignitur. Alæ infernè albescunt, sed postremis partibus videntur fuscæ, & candicantibus maculis interstinctæ, superne

supernè verò, sicut reliquum corpus sunt cyaneæ, extremis partibus nigræ & albis undique respersa maculis. Cauda partim nigra, partim cyanea est, sed inaculis albis per intervalla quoque variata. Crura rubea sunt, pedes divisi in digitos, in atros ungues desinentes: Oculi nigri & iris candescens. Advena est Mexicanæ regioni, & circa aquas versatur estque edulis.

Quetzalototl seu Avis plumarum. Cristata est, & Pavoninis magna ex parte ornata plumis, Picæ Columbæve magnitudine, rostro incurvo luteoque, & pedibus nonnihil luteis. Cauda *Tzanatl* plumis prælongis vestita, atque virentibus nitidisque & Pavonini coloris, Iridis foliis formæ similibus, opertisque aliis supernè nigricantibus, infernè verò & qua parte Pavoninas attingunt, quæ in medio sunt inclinantibus in virorem, quasi cavente natura meliorum pulchritudini. Crista constat plumis pulcherrimis atque splendentibus: Pectus collumque infernè rubris & micantibus, ac Pavoninis supernè; qualibus etiam tegitur dorsum, necnon eæ partes quæ subter alas sunt, intèrque crura sed dilutis, exilibus & molli-bus. Plumæ alarum prælongæ sunt, virore tinctæ diluto, & in acumen desinentes. Pennæ regentes humeros vire-sunt, sed subter sunt nigræ: quæ verò alas interstant nonnihil incurvæ sunt ac unguium colore.

Plumæ hujus avis magni æstimantur, atque ipsi auro præferuntur, longiores ad cristas, reliquæ ad imagines texendas, vivunt in Provincia. *Tecolotlani* ultra *Quauh-temallum* versus *Honduras*, ubi magna curâ cavetur, nè quisquam eas occidat, tantum licet eas deplumare, nec omnibus sed tantum dominis: sunt enim opimorum prædiorum loco, & transeunt adhæredes.

Arbores excavare dicuntur, & in earum cavitatibus educare sobolem, loca aprica amant, nec cicurari volunt. Vox Psittacorum non dissimilis. Quæ de harum Avium venatione ex Hernandez adfert, vide apud ipsum vel in Append. ad Ornithologiam D. Willoughby.

Turdi Chiappæ, *Passeres* Fabri dicti. Nigri sunt, so-lum in pectore & capite rubri, Fructu Querciuo dun-taxat

taxat vescuntur. Rostro perforant corticem Pinuum, glandem singulis foraminibus aptissime accommodant, ut manu extrahi nequeat: sic omnem Pinum ornatissime cingunt glandibus incis. Mox pedibus hærentes cortici, tundunt rostro glandem & vorant.

Hoitlalloth seu Avis longa, à rostri acumine ad caudæ usque exortum, (quæ spithamam quoque longa est) dorantem proluxa conspicitur. Rostrum desuper nigrum, subtus verò cinereum, quadrantem longum, ac mediocriter crassum, cauda virens sed Pavonino splendore. Plumæ totius corporis ex albo fulvescunt, fulvescuntque propè caudam è nigro; sed quæ corporis vestiunt superiora nigræ sunt, maculis candicantibus conspersæ. Humipeta avis est ac modici volatûs, sed adeo pernici cursu ut equorum velocissimorum agilitatem longè excedat.

Coturnices Indicæ Colin dictæ, nostratibus sunt similes, etsi ad *Perdicum* species sint sine dubio referendæ. Multa genera apud Novos Hispanos reperiuntur: nonnulla fusca & cristata, quæ *Quauhzonecolin* nuncupant, mediocris magnitudinis; alia fusca quoque sed cristarum expertia & paulò minora; alia omnium maxima fulvæque, sed capite albo & nigro colore variato, extremis verò alis dorsoque candentibus: pedes verò & rostrum nigra sunt. Omnia bono gratoque constant alimento, malè habentibus convenienti.

Coy lcozque seu *Celi* sonalis, Coturnicibus Europæis similis est, magnitudine, cantu, nutrimento, volatu ac moribus, sed diverso colore, qui supernè est ex fulvo candidoque commixtus, infernè verò tantùm fulvus; etsi verticem ac collum nigricantes albæque plumæ occupent, & tænias ab utroque latere, adeoque à collo ad utrumque oculum constituent atque efforment. Oculi sunt atrii ac fulva crura. Indigena avis est, campestribusque locis, velut & nostras, frequens, & simili etiam alimento.

Colcuicuiltic seu Coturnicis simulacrum, Coturnicis quoque nostræ species est. albis nigris coccineisque variata plumis. & protractis desuper potiùs lineis quàm circumscriptis maculis, subter verò potiùs maculis frequentibus

quentibus quàm lineis. Pedes cruráque cyanea sunt ; sed cantu, magnitudine, moribus cæterisque cunctis præcedenti omninò similis.

Cenotzqui seu Avis nivis evocatrix, Antequam ningat, clamitat, postea fileat. Color illustris variegatione : pectore fulvus, crure pallidus, ungue niger, ventre permixtus notis candidis & atris ; subtrus alas candidus & cinereus ; super, fulvus, niger ; paulò post, cinereus infectus atris maculis : sub finem conspersus albis notis ; caudâ subtrus niger & candidus, super fulvo nigrove maculatus. Caput nigrum est, fasciâ cinctum cinerea : rostrum parvum, cinereum supernè atque inferne ; sed supernè juxta exortum lineâ ambitur luteâ. Oculi nigri sunt, & palpebræ pallentes. Montana colit, & veris tempore educat sobolem. Irà convolvit huc & illuc caput, contorto in varias partes collo, ut eodem situ immota perstans cuncta circumspeciat.

Est & alia ejusdem avis species, quibusdam distans colorum varietatibus, capite siquidem fulvo & cinereo collo partim nigro & partim candescente : sunt qui *Loceto* vocant.

Picicilli post imbres apparet, ignobilitate quadam originis nobilis. Nesciunt adhuc Tetzcoquenses ubi fœtifieret. Muta est ; educat domi, brevi perit. Palato & Stomacho est acceptabilis. Cinerea tota est, nisi capite ac collo, quorum utrumque nigrum : solum oculos nigros candens ambit macula.

Concontlatolli, i.e. Quadringentæ linguæ, Avis polyglotta, totius melodiæ regina, cujusunque vocis arbitra. Sturnum non superat, subtrus albescit, superiore parte fusca, pullis & candentibus intermixtus pennis, maximè ad caudam & caput, quòd imagine quodam coronæ argenteæ redimitur. In caveis ad blanditias auditus, ad ostentum & miraculum naturæ asservatur. Vincit omnes suavitatem & arbitrio gutturis, nullius non imitatur, nullius non superat : Philomelæ longissimè præstat. Contenta est quovis cibo : calidas amat regiones, temperatas tolerat.

Huic similis est *Tzanpan* ; Aliqui suspicantur foemina esse ejusdem speciei, paribus magnitudine, cantu, forma, nisi quod plumæ infernæ albæ sunt, cinereæ & nigræ ; supernæ pullæ, nigræ, albæ.

Noctua Mexicana Francisci Hernandez.

Noctua Mexicana Chichictli dicta. Plumis induta Gallinæ magnitudine esse videtur ; pedibus pennatis, plumis universi corporis fulvo, albo, fusco, nigroque resperfis colore.

Tobaitecototl, Bubo Mexicanus non auritus, Noctuæ magnitudine & colore.

Pxaqua, Genus Oti aut Afionis à nostrate formâ diversi.

Tecolotl, Hubonis auriti species, nigro ac fusco colore varia ; iridibus oculorum aureis.

Telebiquatli seu Noctua junceri. Rostro est nigro brevi, pedibus impenis hispidis, unguibus atris ; plumis circa rostrum albis ; alis infernè nigris admixto fulvo, supernè nigris pallidis candidis ac fulvis, eisque & cauda longis. Licet parvo sit corpore, plumis vestita Gallinæ magnitudine esse videtur.

Tlalquipatli, Oti species parva, rostro resimo ac brevi ; plumis fuscis & cinereis ; pedibus hirsutis, unguibus atris ; iride Oculorum ex luteo rubescente.

Chicuatli seu Noctua canora, Rusticulæ par est, rostro longo, tenui ac pullo, ac ræniis juxta utrumque oculum luteis & incurvis. Inferiora corporis pallida sunt, nigris quibusdam plumis circa collum interseris : irides oculorum luteæ ; cætera ex fulvo, fusco, & cinereo permixta. In montibus versatur ; inque caveis enutrita haud vulgariter garrit. *Rostrum longum* & *tenuem Avem rapacem non esse arguit*,

• *Aves rapaces diurnæ* Francisci Hernandez.

Yzquaubtli, Aquilæ cristatæ genus, Arietis magnitudine, rostro ad radicem luteo, deinde nigro, pedibus pallidis ; ventre colore è nigro & candido permixto ; collo, dorso & cauda nigris aut fuscis. Ferocium Animalium audaciam imitatur, & cicutata si irritetur levi de causa aggreditur & involat hominem ipsum ; mitescit tamen & ad aucupium facile institui possit.

Tlacoquaubtli, seu Aquila virgæ, Asturis est magnitudine, colore fusco & cinereo.

Tlaquaubtli, Aquilæ genus mediocris magnitudinis supina corporis parte fulva & subnigra, prona pallidiore & subfulva, occipitio pallido. An Balbusardus seu Haliaetus, an verò Milvus æruginosus? Pedes lutei.

Hoinetli seu Avis incurva, Asturis est magnitudine ; rostro nigro, cruribus luteis ; caudâ spithamam longâ, latâque : colore subtus candente, fulvo variato ; superne, atro fusco fulvo atque candente : iride oculorum lutea.

Tlotli, Falco columbarius *Nebbi* dictus, niger totus excepto rostro & pedibus quæ lutea.

Ceceto, Tinnunculi species à voce nomen habens.

Cozcacoaubtli, sive Regina Aurarum *Nieremberg*. Accedit magnitudine gneſſis Aquilis. Corpus universum præter eas partes quæ juxta pectus sunt ex nigro purpurascens, fulvum est ac pullum : alæ subtus circa exoritur nigræ, cætera cinereæ, desuper verò mixtim fulvæ, nigræ, & nonnihil in purpureum vergentes, Crura rubra, & unci ungues. Rostrum Psittaci, extremo album, cætera sanguineum. Irides oculorum fulvæ, palpebræ rubæ, frons sanguineus ac plicatilibus rugis torva, quas nonnunquam explicat ; pilis quibusdam retorridis rarisque vestita. Cauda Aquilæ, inferne cinerea, foris nigra. Anguibus, muribus & lacertis victitat, sed morticinis maximè & humano stercore. Vi incredibili obsistit ventis, contraniturque adversantibus, iisdem sedibus perans immobilis.

Garagay, magnitudine est Milvii, capite & extremitate alarum albis; brevis volatus, Crocodilorum & Testudinum ovis infesta, quas sub arena in ripis fluminum condita odoratur & vorat. Auræ eam insequuntur ut potiantur furto: aliàs solivaga est.

Corvini generis Aves Franc Hernandez.

H*Oitzanatl*, Monedulis persimilis, corporis tamen magnitudine eas vincit, & prolixitate caudæ vel Picis pari: colore etiam nigro in cœruleum splendentem vergente à nostratibus differt.

Tzanaboei seu Pica Mexicana *Hern.* Picæ nostrati similis esset ni tota nigricaret, præter caput & collum, quæ inclinant in fulvum colorem. Vox querula est velut minorum Sturnorum.

Pici Martii, Mexicani Fr. Hernandez.

PICI Martii genus maximum *Ocononetl* dictum.

Quatotomomi, Picus imbricoetus *Nieremb.* Upupæ magnitudine, nigro fuscoque colore varia. Caput parvum est, & rubeis contextum plumis, cristâ etiam rubrâ, sed supernè nigra, tres uncias longâ insignitum. Rostrum candens & infernè brevius. Alterutro colli latere fascia candida descendit ad pectus. Pedes lividi.

Tlaulque chultototl, Merulâ major, rostro longo nigro, mandibula inferiore multo brevior; vertice & toto pene collo desuper rubeo; alis ac dorso nigris, lineis transversis albis variis, infernis cunctis cinereis. Pici Martii species esse dicitur *Hernandez*, quia sci. arbores perforat.

Quaubtotopotli, Sturno par, colore nigro sed candidis plumis maculato. præcipuè circa caudam, postremas alarum partes, rostrum ac ventrem, qui totus penè candidus est. Mitescit aliturque domi.

Ococolin,

Ococolin, *Sturni* magnitudine, colore nigro & luteo pulchrè variatum, circa dorsum verò crura ac ventrem cinereo : rostro longo & acuto.

Quauhchohopitli seu *Avicula* ligna excavans *Corur-* nicis forma & magnitudine est, plumis nigris aut pullis, lineis albis transversis distinctis, ventre pectore minii colore.

Tzinitzian, *Avis* est parva, *Columbæ* pæne par, plumis multorum colorum vestita, quibus imagines miræ subtilitatis texunt indigenæ. Rostrum breve est, incurvum & pallidum; columbinum caput ac collum, sed quæ plumis virentibus ac nitidis vestiantur. Pectus ventérque rubra sunt, præter ejus partem quæ est proxima caudæ, illa enim cyaneo candentique promiscuè tingitur colore : cauda supernè virente, ac nigro infernè : Alæ partim albo, & partim subnigro : iris oculi luteo, sed in coccineum vergente ; crura ac pedes cinereo. Vivit in calidis juxta Oceanum Australem.

Gallinacæ Mexicana Franc. Hernandez.

Chachalacametl, Color fuscus : pectus ad caudam usque è candido in pullum vergens ; pectus rostrumque cyanea : Magnitudo *Gallinæ* vulgaris ut & vox : *Avis* est admodum strepera & clamosa, unde nomen quod *Avis* vociferans & clamitans significat.

Hoactzin altera, fusca avis est, *Gallinæ* magnitudine, *Calandræ* cantu, quæ homine conspecto ridere aut eum irridere videtur.

Hoactzin à vocis sonitu simili dicta, *Gallinæ* *Indicæ* ferè magnitudine est, rostro incurvo ; pedibus fuscis, unguibus nigris ; pectore candido in luteum inclinante ; alis caudæque maculatis, per intervalla pollicis, colore candido & pallenti : dorso ac suprema parte colli fulvis, in fuscum inclinantibus, ut & temporibus ad rostrum & oculos. Cristam gestat concinhatam è plumis è candido in pallidum colorem vergentibus, sed dorso earum nigro. Vescitur anguibus. Vivit in calidis regionibus. Usus

in medicina vide apud Autorem; nobis enim suspecti sunt.

Aves Columbae magnitudine Mexicanæ
Franc. Hernandez.

Y*Acatopil* seu Rostrum fudis, Columbi sylvestris magnitudine; rostro 4 dig. longo, tenui, pallido, sed magna ex parte nigro, pedibus luteis, &c. Gallinulæ species esse videtur. Color universi corporis, alarum & caudæ ex albo, cinereo, nigro & fusco permixtus est; sed inferiora simul cum cauda album magis participant colorem. Circa aquas versatur.

Nexton, Columbæ est magnitudine, corpore magna ex parte cinereo, ventre ac collo infernè albo, rostro & pedibus nigris.

Nextototl, Columba paulò minor, coloris supernè cinerei ventre collòque infernè albis; rostro & pedibus nigris.

Ocotzinitzcan, Avis est formosa, Columbæ magnitudine, rostro 2 circiter dig. longo nigro; capite & pectore purpureis, necnon pedibus, reliquo verò corpore ex luteo virescenti. Alibi colorem cyaneum ei attribuit, partim etiam album & cinereum, pedes nigras; nisi fortè alia avis sit ejusdem nominis.

Tlanquiquiztototl seu Passer sibilans, Columbæ par, rostro crasso, acuminato & nigro; iri oculorum lutea; Alis caudæque albo & nigro colore variatis, tœnia nigra à rostro ad extremum usque pectus procedente; alis tamen anteriùs luteis, ac universim reliquo corpore pallenti; pedibus fuscis.

Quaxoxotototl, Magnitudo circiter Columbæ; Rostrum magnum, nigrum, latum, & in acumen contortum tendens; vertice est cyaneo, & reliquo corpore cyaneo pallido, viridèque promiscuè ac nigro.

Momet. Irides oculorum coccineæ: Rostrum incurvum subnigrum 3. penè digit. longum, acuminatum, infernè

inferne brevius, superne ferratum. Pedes fusci. Caput cœruleum & pavoninum, reliqui corporis color virens. Rarum est caudæ inesse pennam unicam cæteris longiorem, & quæ extrema tantum parte plumata sit. Hoc equidem rarum, imò ut suspicor falsum: nam in caudis avium omnes pennæ geminae sunt, h. e. ejusdem generis binæ, hinc inde una. Verum & in Spitzbergenfibus. Frid. Martens hujusmodi avem invenio.

Aves quaedam exoticæ & anomalæ, Turdi magnitudine, Marcgravii & Franc. Hernandez.

1. **PITANGA GUACU** *Brasilienfibus* Marcgr. *Bemtere* Lusitanis. Magnitudo Sturni: Rostrum crassum latum pyramidale, acuminatum, digito longius. Caput depressum & latiusculum; collum breve, quod sedens contrahit. Pedes fusci. Supina pars tota è fusco nigricat; prona flaver. Superius tamen juxta caput corollam quasi monachicam habet albi coloris. Quædam ex his Avibus in summo capite maculam habent flavam.

2. **ATINGA guacu mucu** *Brasil.* Marcgr. Turdelæ fere magnitudine est: Capite satis crasso; Rostro paulum adunco, coloris ex viridi & flavo mixti: pedibus cinereis; caudâ longissimâ 9 digitorum. Pars corporis supina tota cum alis & cauda brunna seu fuliginea: Extremæ caudæ pennæ albæ ad semidigitum; prona pars cinerea. In capite longiusculas habet pennas, quas instar duorum cornuum surrigere potest.

3. **MATUITUI** *Brasil.* Marcgr. Magnitudo Sturni: Collum breve, ut & crura. Rostrum rectum, forte, colore cinnabarino. Supina pars tota fusca pallidè flavo maculata: Guttur flavum, reliqua pars prona alba, fusco punctulata. Crura obscurè cinerascunt.

4. *GUIRA PUNGA Brasiliensibus* Marcgr. Turdo major est, Columbæ ferè par Rostro. digitali, lato, nigro; ore amplo; oculorum irides cœrulescunt. Sub gutture & in collo inferiori multas digitorum longas propendentes particulas carneas nigras habet, figura spiculi hastæ. Caput obicure brunnium: Totum collum, pectus, venter, dorsum, & crura superiora leucophæis pennis teguntur, quibus, potissimum in dorso, nigricantes admixtæ, ac versùs caudam etiam virescentes. Alæ nigricant, virescentibus pennis admixtis. Crura nigricant. Alra voce clamat ut ejus sonus è longinquo audiatur. Cauda tres digitos longa.

5. *GUIRARU Nbeengeta Brasiliensis* Marcgr. Merulæ aquaticæ magnitudine est, aut paulò major: Rostrum rectum, nigrum, compressum: irides oculorum sapphirini. Pedes nigri. Totum caput, collum, pectus, venter infimus albogrisei: Dorsum leucophæum seu cinereum. A rostro utrinque per oculos ad occiput macula oblonga nigra tendit. Alæ & cauda nigra. Caudæ pennarum extremitates albæ, & superiùs quoque albis plumis tegitur.

6. *ACOLCHICHI Mexicanorum seu Sturnus Mexicanus humeris rubeis* Hernand. Magnitudine, colore & forma Sturnis pares sunt, cum quibus etiam versantur. Humeri ætate in rubeum mutantur colorem. Sata in quibus confedère vastant & depopulantur; quo à Sturnis differunt. In caveis inclusæ & edoctæ humanas voces imitantur, & lepide garriunt. Ex humerorum rubeorum argumento Hispani *Commendadores* vocant.

7. *TZANATLTOTOTL*, Hernand. Dodrantem longa, Sturni magnitudine; Rostro brevi crasso, cinereo, & nonnihil incurvo: prona parte rubescente, capite nigro, reliquo corpore pennis nigris, albis & alicubi fulvis vario.

8. *MOCOTOTOTL* seu Avis quæ alitur herba vocata *Mocoquitl* Hernand. Sturni magnitudo: color fuscus, pallido permixtus. Pectus cander, & cauda subtus. Pedes rostrumque coccinea sunt. Canora est.

9. *Chietototl*. Turdo viscivoro forma & magnitudine similis est, sed cinerea tota præter ventrem postremum & mentum, quæ candicant.

10. *Tet-*

10. *Tetzonpan*. Sturni magnitudine, cinereo, candido, pullo atque nigro colore.

11. *Xochitototl*, ventre, pectore & cauda magna ex parte croceis, non sine mixtura coloris atrii; alis subtus cinereis, supernè atro & candenti colore permixtis; reliquo corpore cum capite atro. Hanc *cap. 28*. *Coztototl* seu *Avem luteam* vocat, & magnitudinem *Passeris Canarii* ei attribuit, erat enim juvenis seu pullus. Eandem etiam eodem nomine *cap. 140*. describere videtur. Quæ autem hoc nomine *cap. 143*. describitur, tota erat lutea, capite nigrâ maculâ insignito; caudâque ac alis pallido ac nigro variatis colore, fortè ramen præcedentibus eadem.

12. *Xochitototl* altera seu *Avis florida*, *Passeri* formâ & magnitudine similis est, verùm colore differt, plumis partim pallidis, partim nigricantibus, partim albis, ac partim fuscis. Nidum construit ex arborum ramis pendulum.

13. *Toxcacoxtic*, Turdi viscivori magnitudine & forma, sed collo & pectore luteis; & fascia ejusdem coloris frontem præcincta.

14. *Chiantototl*, Sturni magnitudine, rostro mediocri & nonnihil incurvo, cinereo, pectore & ventre candenti, sed subfuscis plumis maculato, dorso subfusco & cyaneo; alis verò candidis atque subnigris; capite cinereo lineâ candidâ juxta alterutrum oculum insignito.

15. *Nopaltencol*, Sturno paulò major, rostro subincurvo & prolixo; iri oculorum rubea; subfusca & cinerea tota.

16. *Caxcaxtototl*. Avis est tota cyanea subnigraque, Sturni majoris longitudine, oculorum iride lutea; Rostro longiusculo, acuto, nigro.

17. *Abuatototl*, Sturni magnitudine & forma, sed alis & cauda cæruleis, cætero corpore è subalbido vergente in fuscum.

18. *Pitzmalotl*, Sturni genus dodrante paulò majus, lato rostro nigròque.

19. *Tayauhquitototl*, Sturni magnitudine, viridi, cyaneo fulvo & cinereo colore; duabus pennis ab extrema cauda pendentibus, cæteris longioribus, scapis aliquous-

que nudis, extremis cyaneis & nigris pilis vestitis. *Guitra guainumbi* Marcgravii esse videtur.

20. *Cochitototl* seu Avis florida, rostro tenui acuminato, paulum incurvo, supina parte promiscuè cinerea ac nigra, cæteris luteis : pedibus cinereis. An *Xochitototl* eadem?

21. *Izananatl*, Colore, naturâ, moribus, voce *Sturnum* refert : A rostro extremo ad caudæ exortum spithamixæ, ad extremam caudam dodrantalis. Pennæ nigrae, Pavonino colore splendentes. Rostrum tres digitos longum nigrum, ut & pedes.

22. *Tequix quiacatzananatl* seu *Sturnus* falsus, quia juxta lacus falsos verlatur. Sturno forma, magnitudine, colore persimilis est, cauda tamen prolixiore & paulò majori corpore. Pennæ omnes, exceptis quæ collum & caput vestiunt (nam hæ pullæ sunt) nigrescunt cum quodam fulgore. Gregatim volant, & fata devastant.

23. *Tolocatzanatl* seu *Sturnus* junceti. Sturno similis est forma & magnitudine, sed paulò minor : totus niger, si caput excipias, quod fuscum est.

24. *Txonyayaubi* tertia, Magnitudo *Sturni* : color subtus albus fulvisque, desuper verò ex viridi pallescens. Dextræ alæ exortus candet, fulvescitque ; caput verò partim virescit ac pallet, partim nigricat. Pars colli dextra nigra est, sed rostrum atrum. Pedes ex albo rubescunt.

25. *Txamazcatl*, *Sturni* est magnitudine, rostro mediocri & nonnihil incurvo, cinereo, iride oculorum cœrulea ; plumis è fusco virescentibus, pectore luteo, ventre albo, & subfuscis pedibus.

26. *Elcoztototl*, *Merulæ* par, luteo pectore ac ventre, caudâ nigra ; alis ex nigro fulvescentibus ; supinâ parte cinereâ rostro subnigro longiusculo, oculorum iridibus luteis, pedibus cinereis.

27. *Cacalototl* seu Avis *Corvina*, Sturno nostrati par est, universo corpore è nigro vergente in cœruleum, atro rostro, cauda prolixa, & iri ex luteo rubescente.

28. *Chilcoquipaltototl*, Magnitudo *Merulæ* ; rostrum è cyaneo nigrum, crura virescunt. Caput nigricat, venter pectusque pallescunt, reliquum verò corpus luteo viridique

viridique, necnon albo & nigro variatur colore.

29. *Chiltototl*, Præcedenti similis est rostro, magnitudine, colorum varietate, necnon moribus, sed capite coccineo & fulvis pedibus.

30. *Tlaubtototl*. Merulæ est magnitudine, tota rubra, nigris quibusdam plumis alis interfertis.

31. *Xotlapech*, Magnitudo Sturno minor: supernè fulva, infernè cyanea: Crista in capite fulva sed humilior, cujus extrema versùs rostrum pennæ subnigræ atque subrectæ excipiunt.

32. *Olotototl*. Præcedenti par, sed tota pene cyanea pavoninæque, quamvis circa collum albi rubrique coloris sit.

33. *Yacatlil* seu Avis rostri nigri, à nigro rostro, digitum transversum longo, & è crassiuscula origine desinente in acumen, nomen accepit.

34. *Ceoan* seu Avis nivea, Turdo viscivoro paulo major, imitatione humani sermonis nobilis, circa pectus ventrem & alarum exortum fulvescens, permixtis ad caudam cinereis plumis. Alarum extrema caudæque ipsa infernè cinerea sunt: supernè totum corpus è fusco nigrescit. Rostrum (quod exile) & pedes fulvescunt.

Aviculæ Mexicanae Franc. Hernandez *Passeris*
vel forma & magnitudine, vel magnitudine
sola.

C*hiltototl*, *Passeris* est magnitudine & forma; differt rostro nigro, incurvo, tenuiore & longiore; ventre & capite flammeis, caudæque nigra.

Chiltototl altera, nigra avis est, sed alba quoad pectus atque humeros, fronte (qua parte depilis est) nigrâ maculâ insignis.

Chiltototl quarta, tota fere coccinea est, sed nigris juxta alas admixtis, maculis verò prope oculos candentibus.

Elotototl

Elotototl seu Avis spicæ Mayzii, Magnitudo Passeris, Rostrum breve, tenue, color partim albus, partim pulchus partim cyaneus atque cinereus.

Elotototl secunda, sesquidodrantem longa est, & variis coloribus decorata, & cristam quandam in pectore habet ex nigris pennis compositam.

Elotototl tertia, Coturnicis est magnitudine, rostro ut Rusticulæ longo, Colore totius corporis albo, fulvo & nigro promiscue.

Elotototl quarta Cardueli pene par est, sed albo aut cyaneo colore, caudâque pene tota nigra. Pro *Elotototl* quarta aliam avem describit, cap. 227.

Hoauhrototl, Passere nostrate major est, pedibus ac rostro fuscis, cæteris coccineis, demptis capite, dorso ac alis dilute viridibus.

Hocxtototl seu Avis saligna, quia circa Salices versatur, Passeris parvi est magnitudine, fusca & pallida promiscue tota; rostro & pedibus nigris.

Tzcuicuil seu Oculus pictus, Passeris est magnitudine & colore, superioribus tamen plumis magis fulvis: nonnullæ circa caput & rostrum nigrescunt, aliæ ex albo pallescunt.

Texixoubqui seu Avis cyaneorum pedum, *Andario* Hispanis Tolerani regni incolis dicto persimilis, sed caput candicantibus tegitur plumis, nec rostrum adeò est in superiorem partem contortum.

Nlamotototl seu Avis vetula, Passeri similis, paulò tamen major, cauda infernè fulvescente, ventre albo, pectoréque & collo infernè ruffis.

Xochiltototl altera seu Avis florida Passeris forma & magnitudine est, variat tamen plumarum colore quæ partim pallent, partim nigricant, partim albæ sunt, ac partim quoque fulcæ. Nidum construit ex arborum ramis pendulum, Hanc ob nomen commune inter Surnos etiam recensuimus.

Teoauhrototl, Passeris magnitudo; rostrum breve, pronæ partis color albus in luteum vergens, supinæ cyaneus, alarum niger.

Txamatzcattototl, Passeris magnitudine ac voce, colore subtus pallente, circa alas verò & caudam albo, partibus circa oculos candentibus, quod nomen significat, Rostrum ac pedes cyanei.

Nochtototl, Passeri par & similis, sed caput, mentum, & desuper exortus ipse caudæ coccineo colore tingitur; reliquum corpus magna ex parte fusco, aliàs verò nigro atque candente.

Quaubeilni, Passeris magnitudine, rostro unciali tenui nigro, collo & ventre candentibus, reliquo corpore promiscuè albo fusco & nigro.

Tlalchinoltototl, Passeri nostrati magnitudine forma & colore ferè similis.

Tobualtototl, Passeri pene par; avis nocturna dicitur, vel quoniam noctu victum quærit, vel quòd nigra tota sit, paulisper vergens in fulvum, iride tamen & inferiore rostro è luteo rubescentibus.

Ayo quantototl tiltic, Passeremajor, rostro parvo fusco ac nigro, reliqui corporis colore è luteo vergente in candidum.

Txtezcatototl, Passeris est magnitudine, variata tamen cinereo, fusco & nigro colore.

Ayo quantototl, Præcedenti magnitudine par, luteo, nigro, subalbidoque colore varia.

Tatac, Magnitudo Passeris, supina parte tota cinerea, alba, & è nigro in cinereum tendens: collo & pectore è luteo rubescentibus, ventre albo, femoribus albis & cinereis; pedibus è fusco virescentibus; lineis albis & incurvis supernè circumdantibus oculos.

Coltotl, Magnitudine eâdem, ut & forma atque aliquatenus etiam colore Passeris. Canora est, & voce Carduelem imitatur, describitur plenius, cap. 20.

Aviculæ Mexicanæ Fr. Hernandez *Carduelis* magnitudine, nonnullæ etiam forma; cum aliis *Aviculis* minimis.

M*lacatototl* seu *Avicula* germinis *Mayzii*, quòd ei insidere solet, ventre pallente, alis & cauda infernè cinereis, reliquo corpore nigro, pennis tamen candentibus intersertis.

Cocoxtli, *Avicula* lutea *Carduelis* cantu & magnitudine, verùm è luteo in fuscum inclinans colorem.

Quatoxtli, *Carduele* minor, pullo ac nigro colore conspersa, sed postremo corpore & circa caput pallente. Est & alia cognominis avis longe diversa.

Techitli, seu avis se scalpens ad arundines, *Carduele* paulò minor est, desuper è fusco virescens, subtus verò ex albo pallescens. Pedibus rubris, rostro brevi, acuto, supernè nigro, infernè albo, plenius describitur apud Hernandez. cap. 110.

Tlapalchichi seu confrixatrix rubra, *Cardueli* par, mille coloribus visu jucundis varia, cœruleo, viridi, rubeo, flammeo: Rostro brevi crassiusculo, supernè nigricante, albicante inferne.

Cocochatl, *Carduele* paulo major, luteo albòque & fulvo colore variata, ac maculâ juxta alterutrum oculum insignis; in mare majore.

Cocoxtotl, *Carduelis* magnitudine, luteis cyaneisque pennis varia.

Techitli, præcedenti pene par, sed cinereo & fusco varians colore.

Cacatototl, *Acanthidi* par est, infernis omnibus candidis, supernis verò subnigris atque subfulvis: pedibus cinereis.

Axoyatototl, Magnitudo *Carduelis*; Color infernè subalbidus, supernè subfuscus & luteus. Crura ex luteo rubescunt, cristæque quam capite gestat.

Xompantototl, Cardueli pene par; Colore albo, purpureo, luteo, candentique distinguitur.

Cuitcuitzcatototl, Præcedente major. Inferna coccinea sunt, capitis superior pars fulva; reliquum corpus cyaneo, candido atque subnigro distinguitur colore.

Chiltototl Carduele paulò major, tota ferè coccinea, sed nigris juxta alas admixtis plumis; maculis propè oculos candentibus; rostro parvo ac nigro. Superiùs ponitur ob nominis identitatem inter Passerinas.

Xiquipiltototl, Avicula est minima, nigra macula rostrum collumque conspersa, cætera cyaneo cinereoque tincta colore. Canora est.

Quauhchichil, seu Avicula capitis rubri, *Hoitzitzillin* paulò major est, infra candens, supernè è fusco virescens: capite coccineis ornato plumis, femoribus nigris: rostro & pedibus atris. *cap. 17. & 170* eandem describit.

Tozcacoxtli mas, seu gutturiis pallidi. Cardueli pene par, pedibus ex albo rubescentibus, rostro brevi, tenui, acuminato, supernè nigro, inferne pedibus concolore. Inferna corporis lutea sunt, superna partim lutea, partim cyanea: Alæ infernè cinereæ, supernè ex fusco pallescentes. Fascia nigra ab ortu rostri per utrumque oculum ad pectus usque procedit.

Coztototl seu Avis lutea, fusco, nigro, cinereo & luteo colore varia est. Canora est, ac colorem in nigrum candidum & luteum mutare vicissim solet. Aliam sub hoc nomine describit luteam totam, sed capite nigrâ macula insignito, caudâque & alis pallido nigroque variatis.

Tzitziquilotl, Avis est fusci coloris dilutionis, quæ imbribus decidentibus apparere solet & exultare, pedibus longis nigris, collo tenui & longo, rostro prolixo nigroque.

Tlaquilotototl seu picta avis. Pulcherrimis coloribus, luteo, coccineo, viridi, purpureo variatur. Pedibus est cinereis, oculorum iridibus luteis.

Tlaubtototl seu Avis coccinea; lisdem variatur colorum differentiis, sed paulò minore constar corpore.

Coyoltototl, Avis est mediocris, rostro crassiusculo brevi, eodémque & cruribus fuscis, pectore & ventre coccineis, reliquo corpore subrubro & nigrescente.

Tlapal-

Tlapaltototl, Cardueli par aut paulò minor; rostro tenui, iride oculorum lutea, alis caudâque è nigro rubescens, & reliquo corpore coccineo.

Chachavatototl, Carduele paulò major, pedibus fuscis, rostro parvo & nigro, infernis partibus luteis, reliquis verò cœruleo, nigro atque cinereo colore variatis.

Chichiltototl, Magnitudine est præcedentis, infernis tamen partibus rubeis, supernis verò cinereis & nigris, sed in purpureum colorem vergentibus rostro paulò acutiore & longiore.

Xolotlapech, Passeris pene magnitudinè, infernè lutea, fusca verò supernè.

Caquantototl, Magnitudo Passeris, color cinereus, sed extrema cauda lutea, & ab extremis alarum pennis, coccineis quibusdam filamentis dependentibus parvo capite cristato, rostroque parvo.

ISPIDÆ.

Ispida Mexicana maxima Tolcomectli dicta, Tres circiter Spithamas longa est, ventre ac pectore albo, sed fuscis quibusdam undulato pennis; alis desuper fusco candidoque & cœruleo variantibus colore. Piscium rapina vivit.

Axoquen, Avis est ictus satis noxii, cinereo, luteo, ac fulvo colore varia, rostro nigro acutoque & 8 uncias longo, collo verò duas spithamas, ac pelle laxius dependente cavo; cauda verò sesquidodrantem proluxa, ac productis cruribus. Hæc Avis quidem aquatica est & piscivora, verum ad Alcyonum genus minimè pertinet, ut vult Fr. Hernandez.

Acaca cahoaçtli Ispidæ etiam species est, (cujus descriptionem integram alibi damus) Anate fera paulo minor, collo & rostro spithamizo, &c.

Hoxoconauhtli. Hujus generis Avem vide inter Aves terrestres rostris oblongis aquas frequentantes piscivoras.

Quapachtototl, i.e. Avis fulva, à colore alarum, colli ac capitis dicta. Æmula risus humani est, atque idcirco inauspicari ominis infamiâ Indis infensa: Octo uncias longa,

longa, ac toridem cauda. Rostrum è cyaneo nigrum, longiusculum & incurvum: Oculorum irides albæ. Pectus cinereum, ac indè ad caudam usque venter niger: Cauda ex nigro fulvescens. Caro non ingrata.

Anates Mexicanæ FRANCISCI
HERNANDEZ.

M*etzcanaubtli*, Anati domesticæ par est, & iisdem variata coloribus. Vivit circa Mexicanam paludem.

Ecatototl seu Avis venti, Anate domestica paulò minor est, Rostro atro, tenui, subtereti, propè extrema contorto, plumis infernè candidis, superne vero juxta femora fulvis: capite nigro & cristato, sed ab occipitio tæniæ candicantes utrinque procedunt ad oculos, quorum irides luteæ. Alæ subtus cinereæ, supernè verò fuscae, nigrae atque albæ. *Ex figura Rostris ad Mergos potius quam Anates pertinere videtur.*

Ecatototl altera, Præcedentis sæmina est, eique similis, sed crista majori, orbiculari, & coronæ modo eminente, paululùmque alba. Differt etiam coloribus, ut in hoc genere fieri solet.

Colcanaubtlicioatl, Anatis sylvestris genus est, supernè fusca, infernè alba; cruribus pallidè rubentibus; rostro supernè nigro, infernè & ad latera fulvo.

Concanaubtli, Anatis magnæ genus *Lavanco* Hispanico similis.

Tacatexotli, *Anas* fera lacustris, domesticæ magnitudine, rostro lato, supernè cyaneo (quod & nomen significat) supina corporis parte fulva, prona ex argenteo nigricante, alis subtus cinereis, supernè nigris.

Tzitzihoa mas Anati nostræ caudacutæ Phasianus, marinus dictæ, eadem avis esse viderur.

Toltecoloçli seu *Metzcanaubachtli* i. e. *Avis lunaris*. Hanc Avem Clangulam esse, *Quattr' ochii* Italis dictam, macula candidæ inter oculos & rostrum, reliquaque descriptio suadet. Q. an Primæ eadem sit?

Tzcnz-

Tzonyayaubqui & *Tztactzonyayaubqui*, Magnitudine domesticae Anatæ pene par; Rostro lato, supernè cyaneo, juxta extremum seu ligulâ maculâ albâ distincto; pedibus etiam cœruleis. Corpus albo fulvôque variat colore; capite est crasso, colore Pavonino, vertice nigriore.

Xalcuani seu Avis arenam deglutiens, Anate domestica paulò minor est. Rostro supernè livente, infernè nigro, modicè lato; cruribus pullis: supina corporis & alarum parte virenti, candido, nigro, & fusco coloribus variâ; pronâ candidâ: tænia viridi ab occipitio ad oculos ducta; pectore fulvo cum lineis candidis transversis.

Colcanaubeli seu Anas Coturnicum Mexicanarum colore, Magnitudine est mediocri, rostro lato & nigro, fulvis pedibus: cætero corpore albo, fulvo, nigroque, & cinereo colore vario.

Nepapantotl, Rostro est in acutum quadantenus deficiente, quo ab Anatino genere differt. Nullum (inquit) est genus coloris alias Anates ornare solitum, quod huic soli non contingat; unde nomen.

Tztactzon yayaubqui seu Avis varii capitis, Rostro est nigro, mediocriter lato; universo pene corpore candenti, nigro atque cinereo, sed circa collum & caput purpureo, albo, cyaneo, viridi, & ad Solis repercussus lapidis aut vestis heliotrophiae instar vario atque pavonino. Pedes rubri, ad natatum solum non ad incessum comparati, ut quæ extremo adhæreant corpori ut in colymbis. Lacui Mexicano advena est.

Tacapatlaboac seu Avis lati rostri. Anate domestica paulò minor est, pedibus & rostro inferna parte ex pallido rubescente; superna in ambitu ex fusco rubescit, circa extremum ex fulvo nigrescit. Corpus universum tegitur pennis semicirculos quosdam imitantibus, fulvis, nigris & candidis, ventre tamen omnino fulvo. Alæ supernè partim albæ, partim virides splendentes, maximam partem fuscæ, subtus albicant.

Tempatlaboac, Anas fera Domesticae magnitudine, unde idem apud Indos nomen usurpavit. Rostro est lato & longo, undique nigrante, pedibus ex pallido rubentibus; collo & capite viridibus purpureis, & nigro colore splendens

tibus, prout varie obijciuntur luci : iris pallida ; pectus candens, reliquum corpus inferne fulvum, & binis maculis juxta caudam utrinque candentibus insignitum ; supernè vero semicirculis quibusdam in ambitu ex albo fuscis intus è nigro viridibus. Alæ initio cyaneæ sunt, mox candidæ, tandem virides, extremo vero altero latere fulvæ, altero viridi splendentia,

Opiixan, Rostro est subrubro, pedibus fulvo & candenti colore variatis, reliquo corpore cinereo & nigro.

Quapach canaubtli, Rostro est lato, eoque ut & pedibus cœruleis : Capite, collo, pectore ac ventre fulvo ; cauda brevi, alba & nigra : alis cum dorso è fusco fulvoque transversis tæniis variatis.

Querquedula latirostra Mexicana *Atapalcatl dicta*, Colore est candente & fulvo, rostro latissimo ; cætera Querquedulæ vulgari similis.

Chilcanaubtli seu *Avis Chilli* colore, Querquedulæ species est, paulò minor vulgari, rostro latiore. angustiore tamen quàm præcedens : colore totius corporis fulvo, alarum tamen vario ex cœruleo, candido & nigro virescente.

Tacapitzaboac seu *Avis rostri mucronati* eadem esse videtur cum *Colymbo nostrate* minore.

Xomotl, Dorso est & alis desuper nigris, pectore fusco. Cristatum iracundia facit. Pennas ejus *Indi* vestibis suis intexunt.

Aves aquaticæ MEXICANÆ fissipedes
Franc. Hernandez.

1. **C O M A L T E C A T L**, *Avis* est lacustris, Columbæ sylvestris magnitudine, pedibus rubescentibus tri-dactylis, digitis longis : Rostro palmum longo, tenui, acuto, nigro : plumis universi corporis candentibus ; superna parte capitis nigra ; alis supernè infernèque nigro colore variatis,

N

Chocho

2. *Chochopitli*, *Corlito* i. e. Arquatæ perſimilis, ſeſquiſpithamam longa, à ſummo roſtro ad extremam caudam; roſtro palmarî, ad exortum virente, extremo nigro: Candentibus tegitur pennis, inſertis tamen circa alas quibuſdam fufcis: quas cum collo & capite albas nigrâſque petiis fortitur.

3. *Chiquatli* ſeu Noctua; cap. 168. ſub *Chiquatoti* nomine andem paulò aliter deſcribit. Ruſticulæ noſtrati par, roſtro longo, tenui & pullo, ac tæniis juxta utrumque oculum luteis & incurvis: inferiora corporis pallida ſunt, nigris quibuſdam plumis circa collum interſertis. Iris lutea ac nigri oculi: cætera ex fulvo, fuſco, & cinereo permixta.

4. *Yaca cintli* ſeu Roſtrum ſpicæ Maizii, Ternos circiter dodrantes longa eſt, virentibus cruribus, capite & ventre cyaneis, ſed vergentibus in purpureum, alis promiſcuè fulvis nigrisſque; oculis luteis, ac roſtro, ſed in coccineum propè exortum vergente, quod 3 pæne dig. longum eſt: anteriore capitis parte ut in Fulicis & Gallinulis, quarum ſpecies eſt.

5. *Yobual quachili*, ſeu Caput Chilli nocturnum, ſalſorum lacuum alumna, Sturni fere magnitudine; capite parvo; collo tenui longo; roſtro longo luteo; cruribus itidem & pedum digitis longis cinereis; unguibus luteis. Ab exortu roſtri aſſurgit corona tricuspis, & luteo rubescens; & ab interiore alarum parte bini aculei contorti ſeu incurvi. Gallinulæ ſpecies eſt Marcgr. deſcripta.

6. *Xochitenacatl* tertia. Avis (inquit) lacuſtris eſt, ſeſquiſpalmam longa ſi roſtrum excipias, quod 8 pæne uncias eſt prolixum, ac tres latum, ſerratum coccineum juxta extremum; circa alias verò partes cyaneum & ex albo pallescens, ſed ſingu'is pæne momentis (quod fide pæne caret) mutans colorem. cætera vide, nam Picam Braſilicam Toucan dictum deſcribere videtur: quamvis alibi de ea loquatur ut de Ave ſibi non conſpecta.

7. *Acolin* ſeu Coturnix aquatica à magnitudine pari dicta, Avis eſt fuſca; Roſtro prolixo & curvo in inferiora, pedibus longis. Juxta aquarum ſummitatem currit celerimè, nunquam ferè volat; ad lacum Mexicanum. Ali-

bi *Acolin* Sturno magnitudine parem facit; pedibus ex viridi pallescentibus, in digitos 4 proluxiores divisos. Cui Rostrum luteum, tenue, mucronatum, pro corporis proportionem longiusculum: irides oculorum fulvæ, caput parvum. Inferna corporis candida sunt, lateribus fusco maculatis colore: superna verò & cauda, quæ breviuscula est, fulva sunt, & maculis nigricantibus distincta, & candidis lineis quasvis pennas circumambientibus, ejusdemque coloris punctis nonnunquam conspersis. Caput mira colorum varietate micat, cujus medium atra linea secat, ac velut cineræ aliæ latera, maculæ verò parvæ & candentes canthos externos. Collum pectusque cinerea sunt. Mexicani lacus indigena est.

8. *Hoastli* seu Avis sicca, Gallinæ magnitudine, ternas spithamas à rostri acumine ad caudam postremam longa est. Crura proluxa pedem, Rostrum cum uncia trientem, pollicem crassum, supernè nigrum, ad latera pallens, infernè nigrum & subfuscum. Oculi magni, iris lutea, palpebræ rubræ: Vertex niger. crista etiam nigra insignis. Collum, venter, corpusque universum candet; sed cauda cinerea est, velut & desuper alæ. nam infernè sunt albidiores. Superiores alarum partes virore quodam splendent. Dorsum etsi candidis tegatur plumis, pennis tamen nigris in virentem splendorem inclinantibus vestiri solet. Albâ fasciâ circumcingitur caput à rostri exortu ad oculos usque procedente. Pedes & crura pallescunt. Lacus Mexicani advena est, & piscium captura victitat, & gravem vocem edit.


9. *Amacoque* seu Avis rubescentis colli: palustris est, Turturi nostrati magnitudine par: Pedibus in digitos fissis, ex albo rubescentibus, nigris unguibus: rostrom mediocriter longo exili & nigro; iridibus oculorum rubris. Pectoris, ventris & alarum inferna alba sunt, sed cauda (quæ mediocrem magnitudinem nanciscitur) fulvo & nigro colore est inspersa. At collum pectusque torques bini, minimi ferè digiti distantes intervallo, nigrique cingunt, quarum anterior undequaque circuit, posterior superna deficit ac disparet parte. Ex utroque latere maculæ binæ candentes, pari amplitudine supra oculum

versùs collum, illud ferè attingentes discurrunt. Superna corporis, adeoque ipsa cauda albo, nigro, fulvòque sunt colore; alæ verò desuper fulvo & fusco. Indigena est & lacus mexicani alumna: vescitur insectis & pisciculis. Caro edulis est, sed qualis aliarum Avium aquaticarum. Vehementiùs perstrepat quam pro corporis ratione.

CATALOGUS

Avium JAMAYCENSIVM

Quas, cum in Insula illa commoraretur, observavit & descripsit Eruditissimus Amicus noster & totius Historiæ Naturalis scientissimus D. HANSIUS SLOANE, additis earum quæ in præcedenti Synopsi desiderantur descriptionibus contractis ex ejusdem Schedis manuscriptis.

1.  **ULTURI** affinis Brasiliensis, Urubui Marcgr. pag. 207. Tzopilotl sive Aura Hernandez quoad descripr. *The Carrion-Crow*, nostratibus colonis.

2. Tinnunculus sive Cenchris, eive valdè similis Accipiter. *The Kestrel, or Stannel.*

3. Guira querea Marcgr. Caprimulgi species. *A Wood-Owl, or Goat-sucker.* Nostrates à sono quem edunt hoc genus Aves, *Churn-Owls*, eas vocant. Sylvas frequentant tam in Jamayca quàm in Anglia, præsertim montosas.

4. Caprimulgus seu Noctua sylvatica Jamaycensis minor. *The small Wood-Owl.* Insigni nota ab aliis hujus generis avibus differt, quòd nares, velut tubuli quidam, ad $\frac{1}{8}$ digiti altitudinem supra rostri superficiem extent. Parva admodum avis est, à summo rostro ad extremam caudam septem non plus digitis longa, ab alarum exten-
tarum terminis decem lata. Figurâ capitis, ore & rostro,
cum

cūm Caprimulgo convenit. Supinæ ut & pronæ partis color varius è xerampelino, cano & nigro, alis tamen & caudâ dilutioribus

5. *Psittacus maximus cyano-croceus Aldrov. lib. 11. pag. 663. Ararauna Brasiliensibus Marcgr. Premier espece d'Arras Rochefort. The great Maccaw.*

6. *Psittacus minor macrouros totus viridis Aldrov. Ornithol. lib. 11. pag. 678. Tui species secunda, Tuia-putejuba Marcgr. The green Parakeet. Psittacus viridis, alarum costa superna rubente Aldrov. lib. 11. pag. 668. The most common green Parrot, with the ridge of the Wing red. This is brought from the Spanish Main frequently into Jamaica.*

7. *Psittacus leucophcephalus Aldrov. lib. 11. p. 670. Papagayos verdesque tienen un flueco de plumas blancas en el nacimiento del pico de Oviedo, lib. 14. cap. 4. E Cuba & Hispaniola in Jamaicam inferuntur.*

8. *Psittacus minor, collo miniaceo. An Xaxabes Oviedi? The common Parrot of Jamaica. Collo est rubente, alias undique viridis: cauda brevi lata. Articulatè loquitur.*

9. *Cornix nigra garrula. A Chattering Crow, or, A Cacao-walk. Loca montosa frequentat, Avis est garrula admodum, voce à Cornice Europæa multum diversa: alias nihil video in ejus descriptione quo discreper à nostrate.*

10. *Pica luteo-nigra varia. The Yellow and Black Pic. A summo rostro ad extremos unguis novem digitos longa erat, totidem fere ad ultimam etiam caudam. Rostrum digitale, rectum, acutum, nigrum; quo colore & pedes, & unguis imbuti. Color capitis & gulæ niger, dorsi etiam aliquatenus & caudæ: Alæ albo & nigro variæ: totum corpus reliquum pallido Aurantii colore tinctum. Incessu saltatorio Picam variam nostratem imitatur.*

11. *Picus varius medius Jamaicensis. The Middle-sized parti-coloured Wood-Pecker. Longitudo 10 dig. latitudo inter extrema alarum extensarum 14. Rostrum & lingua ut in nostrate vario; nec cauda multum dispar.*

Caput fuscum seu leucophæum, vertex tamen & collum superius coccinea. Dorsum, alæ, cauda nigra lineis albis transversis varia. Gula, pectus, venter inter Aurantium & fuscum colorem amigunt. Pedes è viridi flavicant. In sylvis passim occurrunt.

12. *Picus major leucophæus seu canescens. Pluviæ Avis & senex dictus. An Old Man, or Rain bird.* Ab initio rostri ad finem caudæ 18 digit. longa erat, tantundem lata inter alarum extrema. Rostrum unciâ longius, leniter incurvum, teretiusculum, acuminatum, supernè nigrum, subtus albicans. Cauda dodrantalis. Caput plumagine fusca mollicellâ vestitum; dorsum & alæ paulo dilutiores: cauda nigra, apicibus pennarum albis: Mentum & gula alba, molli & velut holosericea lanugine recta: reliqua pars prona è rubro xerampelina. Pedes è cœruleo nigricant.

Omni anni tempore in sylvis & sepibus invenitur. Voce solito clamosiore pluviam præfagire creditur.

A canescente lanuginosa plumagine Senes seu vetulæ dicuntur.

13. *Picus seu Pluviæ avis alia canescens Senex dicta* rostro longiore & rectiore. In omnibus cum præcedente convenit præterquam rostro, quod huic rectum, dimidio digito longius, tenuius, seu gracilius, & albidius.

14. *Isipida ex atro & albo varia. Jaguacati guacu Brasiliensibus Marcgrav. An Pescheur Du Tertre. The Crab-catcher.*

15. *Gallus gallinaceus & Gallina. The common Dunghill Cock and Hen.* Per totam Americam, in calidissimis regionibus optimè se habent, adolescunt & vigent.

16. *Gallo-pavo, seu Numidica avis, quibusdam Meleagris, The Turkey.* Hæc etiam Avis calidis Americæ regionibus gaudet, ibidémque mirum in modum proficit, & se multiplicat.

17. *Gallina Guinea, Veterum Meleagris, Poules Pintades Rochefort: The Guiny-Hen.* Gregatim incedunt, suntque in Savannis dictis frequentes: Earum caro optima & lautissima habetur.

18. Pavo. *The Peacock and Hen.* Hæc etiam Avis in calidis hisce regionibus non infrequens.

19. Miru vel Mutu alia species, Mituporanga Brasiliensibus *Marcgr.* Tepetototl *Nieremberg.* Gallus Indicus alius *Aldrov.* A Quirizao; quoniam ex insula Quirizao in Jamaicam illatus est.

20. Perdix montana. *The Mountain Partridge.* Longitudo à summo rostro ad extremam caudam 10 unciarum: latitudo inter alarum extensarum apices 16. Rostrum Columbino persimile. Caput parvum: Cauda duos digitos longa. Supina pars tota colore xerampelino seu purpuro rubente cupri æmulo tincta: Prona dilutior, & sub ventre albicans. Oculorum irides flavæ; palpebræ pulchrè coccineæ. Crura & pedes duos digitos longæ, & ut in Columbis rubræ.

In sylvis montosis inveniuntur, & baccis victitant. In arboribus humilioribus nidificant, nidis è virgultis tenuioribus transversim positis constructis, quibus pilos & gossipium superimponunt, ut ova melius foveantur, & pulli molliùs cubent.

21. Columba vulgaris. *The common Wild Dove, or Pigeon.* In columbariis aluntur frequentissimæ.

22. Columba caudâ fascia fusca notatâ, velut annulo cinctâ. *The Ring-tail'd Pigeon.* Quindecim uncias longa erat, viginti lata, Longitudinem ab initio rostri ad finem caudæ sumimus: latitudinem ab extremo ad extremum alarum extensarum; quod Lectorem semel monuisse sufficiat, nè eadem sæpius repetere cogamur. Rostrum $\frac{3}{4}$ dig. longum, ad basin & circa nares duplici protuberantia elatum. Oculorum irides coccineæ. Cauda 4 aut 5 digitos longa. Corpus crassum. Caput, collum, pectus purpurascens plumis vestita; venter albicantibus. Collum superius virecebat ex purpura, pennæ pro vario ad lucem objectu versicoloribus, & serici instar splendentibus. Dorsum & cauda pallidè cœrulea, excepta illa quam diximus fasciâ seu area transversâ nigra. Alæ fusæ.

23. Columba minor ventre candido. *The White-bellied Dove.* Novem digitos longa erat, 16 lata. Rostrum $\frac{3}{4}$

unciæ æquabat cum totidem quot in præcedente protuberantiis. Oculorum irides albæ. Vertex & prona pars rota alba, unde nomen : supina colli è cœruleo & purpureo versicolor. Dorsum & alæ è fusco purpurascunt cum aliqua rubri tinctura : Cauda cœrulea cum linea in extremo alba. Mense Januario in Savannis seu campistris planis inveniuntur ; & in cibis commendantur.

24. Columba minor leucocoryphos. Goritas de Oviedo, *lib. 14. cap. 2. The Bald pate.* Longitudo huic 11. digitorum, latitudo 18. Rostrum semunciale, ad basin rubrum & protuberans, infra nares oblongas album. Vertex in adultis albus, unde nomen. Supina pars colli è cœruleo seu viridi splendente colore varia : totum præterea corpus obscure cœruleum. Oviedo Hispaniæ communem esse scribit, ubi grandior evadit. *D. Sloane* Oenadi eandem esse suspicatur verum notæ non respondent. Oenas enim ob verticem album insignis non est.

25. Turtur minimus alis maculosis : an Turtur minimus Barbadenfis. Picuipinima Brasiliensibus *Marcgrav.* Quinque digitos longus erat, 8 latus. Rostrum semunciale, singulis ad singulas nares protuberantiis fungosis, incurvum, apice nigricante, ad basin flavum, seu mali Aurantii colore infectum. Oculorum irides duplici circulo altero flavo, altero coccineo distinctæ. Vertex cœruleus : Dorsum fusco dilutiore, alæ & cauda obscuriore colorata : Alæ autem cœruleis vel purpureis maculis notatæ. Pectus purpura diluta, & Abdomen adhuc pallidior tinctum. Humi plerunque resident & victum quærunt. & si quis eas excitat Perdicum more breves volatus faciunt ; sicutque gregariæ.

26. An Ear-Dove, i.e. Turtur auritus. Palomas Torcas *Oviedi, lib. 14. cap. 2.* an Turtur vulgaris nostras ? Turtur auritus dicitur, quia in alterutro colli latere maculam habet nigricantem auris quodammodo æmulam.

27. Icterus minor nidum suspendens. An Jupujuba seu Japu Brasiliensium *Marcgrav. The Watchy Picket, or Spanish Nightingale. The American Hang-nest.* Avem hanc quia ex extremis arborum furculis seu viminibus nidum suspendit, cum Jupujuba *Marcgrav.* specie eandem esse

esse suspicor, quamvis colores non conveniant. Aves enim nonnullæ ejusdem speciei, ut v. g. *Loxia*, coloribus plurimum variant, nec diversam puto Avem *Luscinia Virginiana* capite non cristato distam, cujus meminit D. Joan. Clayton in Epistola ad Regiam Societatem Londinensem missa, cujus exemplar extat in Philosoph. Transact. N. 206. pag. 993.

28. Monedula tota nigra. *The small Black-bird*. Longa est 12 uncias, 16 lata. Rostrum unciale, rectum, acutum, non in arcum assurgens. Cauda 5 digitos longa. Tota nigra est. absque ulla colorum diversitate.

29. Ani Brasiliensibus *Marcgr*. *The great Black-bird*. D. Sloane in hujus Avis descriptione à Marcgravio dissentit, quòd digitos usitato situ tres antrorsum, unicum retrorsum extensum ei attribuat.

30. Merula fusca. *The Thrush*. Longitudo septuncialis; latitudo 10 unciarum. Rostrum digitale, rectum, terebricululum, Aurantii colore cum linea ad apicem nigra. Cauda 3 digitos longa. Supina pars tota obscurè fusca: sub mento macula alba: inferior pars colli & pectus dilutius fusca: venter albicat. Crura & pedes Auranti coloris. Sylvas montosas frequentant, earumque caro in cibis laudatur.

31. Turdus minor cinereo albus non maculatus. *Centlatolli Hernand*. *The Singing-bird, Mock-bird, or Nightingale*. Virginiae, ubi frequens occurrit, colonis *The Grey Mocking Bird*, dicitur.

32. Tapera Brasiliensibus *Marcgrav*. An Hirundo apus nostras? Vencejos *Oviedi*, lib. 14. cap. 2. *The Black Martin, or Swift*.

33. Sitta seu Picus cinereus major, capite nigro. *A Loggerhead*. Sex digitos longa erat, 11 lata. Rostrum nigrum, digitale, compressum, triquetrum; naribus rotundis, ad basin undique setis nigris cinctum. Cauda $2\frac{1}{2}$ digitos longa: Caput grande vertice nigro & velut cristato. Dorsum dilutè fuscum seu cinereum aut canescens. Alæ & cauda obscurè fuscae seu nigricantes, & ad eorum extrema lineæ transversæ albæ. Prona pars tota alba. Avis est stolidâ, nec hominem appropinquantem fugit

fugit aut reformidat ; sed tandiu moratur donec baculo percuti & occidi possit : unde *Loggerhead* nomen ei impositum.

34. *Sitta* seu *Picus cinereus major* rostro curvo. *Another sort of Logge head.* Præcedente paulò major erat : Rostro $\frac{1}{4}$ dig. longo, mandibula superiore media parte elatiore, recta, acuta, extremo incurva ; naribus rotundis, & similibus circa basin setis. Caput & dorsum cinerea seu incana ; Alæ & cauda obscurè fusca ; aurantiî colore secundum margines virgata. Cauda tres uncias longa. Mentum incanum, pectus & venter albida. Pedes fusci.

35. *Muscicapa Brasiliensibus Japacani dicta* *Marcgr.* *The small Yellow and Brown Bird.*

36. *Muscicapa* è fusco & albo varia. *The small black and white Bird.* Longa 4 digitos, 7 lata. Rostrum rectum, teretiusculum superne nigrum, inferne album, $\frac{1}{2}$ dig. longum. Cauda sesquidigitalis. Supina pars tota colore est nigricante, lineis albis varia ; prona alba cum aliqua nigri mixtura. Pedes è viridi fusci ; ungues sublutei.

37. *Muscicapa* è cœruleo, cinereo, fusco & luteo varia. Magnitudine præcedentem æquat aut excedit. Rostrum par, nigrum. Vertex, collum, supinum dorsum cinerea aut incana & lanuginosa : Alæ & cauda (2 dig. longa) è fusco & albo varia. Mentum & gula flava ; Colli latera utrinque alba & nigra. Pectus & venter alba nigris quibusdam ad latera maculis. Pedes fusci.

38. *Muscicapa* pallidè fusca. *The Worm-eater.* Quinque digitos longa erat, latitudine longitudinis circiter dupla. Rostrum semunciale, rectum, teretiusculum, acutum, pallidè fuscum. Supina pars tota dilutius fusca. Per oculum ductus obscurior : mentum etiam obscurius coloratum. Pectus & venter è nigricante & terreo colore mixta seu varia, fere ut in *Alaudis* nostratibus. Crura $1\frac{1}{2}$ dig. longa.

39. *Oenanthe* fusco lutea minor. Quatuor digitos longa erat, duplo latior. Rostrum rectum, teretiusculum, non admodum acutum, fuscum. Caput summum & dorsum

dorsum luteo-fusca : Alæ & cauda fusca cum strijs aliquot albis ; cauda $1\frac{1}{4}$ dig. longa. Mentum, pectus, venter flauicant. Insectis vescitur.

40. *Rubecula viridis elegantissima. The Green Sparrow, or Green Humming Bird*, 4 dig. longa erat, 8 lata. Caput pro corporis proportionem majusculum : Rostrum compressum, latum, mandibula inferiore rubra, superiore è fusco rubente, linea elata, recta secundum longitudinem ejus decurrente. Caput supinum, dorsum & alæ quatenus visui apparent, colore viridi vivido & pulcherrimo tinguntur. Sub mento macula coccinea elegans diametro semunciali. Venter è luteo albicat, pectus dilute virescit. Pedes è fusco rubent. Digni anteriores omnes aliquousque juncti, extimi duo ad ungues fere cohærebant : ungues longi & adunci. Plumago mollis & lanuginosa. Cauda sesquidigitum longa. E pulcherrimis quas unquam vidi Aviculis erat.

41. Guainumbi tertia species *Marcgr.* fortè etiam secunda ejusdem. Nam has duas aviculas specie non differre suspicor. *The long-tail'd Humming Bird*. Pennis duabus incanda prælongis Manucodiatas seu Aves Paradisi imitatur.

42. Guainumbi prima species *Marcgr.* *The larger Humming-Bird.*

43. Guainumbi quinta species. *Marcgr.* *The largest or blackest Humming-Bird.*

44. Guainumbi septima species *Marcgrav.* *The least Humming Bird.*

45. *Luscinia* seu *Philomela* è fusco & luteo varia. *A black and yellow Bird.* Longa erat $4\frac{1}{4}$ dig. 8 lata. Rostrum semidigitale: acutum, nigrum. Caput è nigro fusco varium, exceptis lineolis duabus supra oculos albis. Mentum & major dorsi pars obscure fusca. Uropygium supra caudam flavicat. Cauda ipsa & alæ supinæ obscure fuscæ, lineolis quibusdam albis ad apices virgatæ. Pectus & venter totus flavent. Crura sescunciam longa.

46. *Passer coeruleo-fuscus. The Banana Bird*, Quinque circiter digitos longitudinis obtinet. Cauda sescuncialis. Rostrum breve ($\frac{1}{2}$ dig. longum) crassum, subrotundum. Caput pro corporis

corporis ratione grande. Latitudo 9 uncias explet. Pedes nigri, unguiculis acutis pariter nigris armati. Dorsi pennæ ad caudam usque lanuginosæ, obscurè cœruleæ; pectoris dilutiùs cœrulescunt: Apices pennarum in ventre luteæ. Alæ & cauda è cœruleo obscuro virescunt. Arbores Bonanas dictas frequentat, unde nomen.

47. Alia hujus species est, capite minore, coloribus etiam dilutioribus varians.

48. Passer niger punctis croceis notatus. *The black Sparrow*. Longus erat 5 dig. 8 latus. Rostrum breve, crassum, nigrum, acutum, narium foraminibus rotundis. Cauda 2 digitorum. Tota avis nigris ad cœruleum tendentibus intuebatur pennis, maculis duntaxat nonnullis supra oculos, sub mento & cauda aurantii colore picta. Pedes longi nigri, unguiculis brevibus acutis.

49 *The Savanna-Bird*. Quatuor uncias longa erat, 7 lata. Rostrum breve, crassum, acuminatum. Vertex, supina pars colli & dorsum colore ex obscure fusco albicante & xerampelino mixto: prona pars colli seu gula & pectus dilutius fusca & ad luteum tendentia. Venter albus: pedes etiam albicabant. Alarum apices & supercilia lutea. In campestribus humi sedent & currunt Alaudarum more.

50. Serino affinis avis è cinereo luteo & fusco varia. Octo digitos longa erat, 12 lata. Rostrum $\frac{1}{3}$ dig. longum, breve, crassum, superiore mandibula è cœruleo fusca, inferiore dilutiore. Caput plumagine canescens: vestiebatur, dorsum è luteo fuscâ. Alæ & cauda obscurè fusca lineolis albis striata. Mentum canescens, pectus & venter lutea; sub cauda tamen alba. Pedes subcœrulei.

51. Serino affinis, è croceo & nigro varia. *A small Black and Orange-coloured Bird*. Longitudine ad 4 digitos extendebatur, 6 lata erat. Rostrum $\frac{1}{4}$ dig. longum, latum ad basin: Cauda sesquidigitalis, Caput & collum nigra, quibus & dorsum concolor cum levi Aurantii tinctura. Alæ & cauda fusca, Aurantii coloris virgis striata. Pectus & Alarum vestitrices eodem Aurantii colore tinctæ. Venter albus, Pedes nigri. Formicis vescitur.

Aves

*Aves aquas frequentantes fissipedes & in aquosis
victum quærentes.*

1. **G**uiratinga Brasiliensibus *Marcgr.* Ardea alba major nostras. *The largest White Gaulding.*

2. Ardea cœrulea, an Ardeola *Marcgr.* Cœci 3 *Pison.*
An Heron.

3. Ardea cœruleo-nigra. *The Black or Blew Gaulding.* Longitudo sesquipedalis, latitudinis subdupla. Rostrum $2\frac{1}{2}$ dig. longum, ad basin circa oculos cute viridi rectum, acutum, apice nigricante, reliqua parte subcœruleum. Cristam plumarum longiorum in summo capite gestat. Collum 6 dig. longum, plumis raris vestitum, colore è cœruleo nigricante; quo & reliquæ totius Avis pennæ imbuuntur, exceptis iis quæ pectori, ventri & partibus subalaribus innascuntur, quæ dilutiores sunt. Crura 7 uncias longa, squamis virentibus tecta.

4. Ardea stellaris minor. *A small Bittern.* 14 digitos longa erat, 20 lata. Rostrum basin & oculos membrana lutea nuda cingit, ad nares usque extensa. Rostrum duos digitos longum, acuminatum, angulosum, mandibula superiore nigra, inferiore lutea. Collum 5 digitos longum in formam S literæ inflexum, rigidum. Cauda digitum longitudine non multum superat. Plumæ in vertice obscure fuscæ, & apicis in modum elatæ; eodem colore imbuuntur quæ collum superius, dorsum, alas & caudam vestiunt, maculis duntaxat quibusdam albicantibus & leucophæis hic illic inspersæ; quæ Mentum, collum inferius, pectus & ventrem, dilutius fuscæ; albo & xerampelino coloribus intermixtis. Crura 4 digitos longa, antè obscurè fusca, postè flava.

5. Platea incarnata, Tlahquechul *Hernandez.* Aiaia Brasiliensibus, Colherado Lusitanis, Belgis *Lepelaer Marcgr.* *The American Scarlet Pelicane, or Spoon-bill.*

6. *Pluvialis major Aldrov. Limosa Gesneri. The great Plover of Aldrovand, called here, The Curlew.*

7. *Himantopus Plinii Aldrov. lib. 20. cap. 30. Long-legs.*

8. *Totanus dorso fusco, albis maculis notato. The Sea-Plover. Descriptio hujus Avis in omnibus fere excepta magnitudine Tringæ majori Europææ convenit.*

9. *Pluvialis viridis. Pluviers Rochefort & Du Tertre. Gorriones ò Pardales de Oviedo. The Green Plover.*

10. *Pluvialis ex fusco & albo varia, cauda longiore. The greatest Snipe. Magnitudine cum Arenaria nostra Sandering & Curwillet dicta convenit, quoddamque postico digito careat: nec colore multum abludit, nisi quoddam circulum seu torquem habeat in summo collo album, & supina pars corporis magis fusca sit. Differt caudæ longitudine digit. 3½ & pedum colore albicante.*

11. *Gallinago minima ex fusco & albo varia. The least Snipe. Avis hæc à nostro Stint, Gallis Alauda marina dicto, Bellonio Schœniclos seu Junco, non multum differt. Magnitudo & forma eadem, nec colores admodum diversi.*

12. *Rallus aquaticus Aldrov. Ortygometra Bellon. An Gallinula chloropus altera Aldrov. The Water Rail.*

13. *Charadrius sive Hiaticula. Matuitui Brasiliensibus Marcgr. The Sea-Lark.*

14. *Colymbus sive Podicipes minor. The Didapper, or Dobchick, or small Loon.*

15. *Gallinula chloropus major Aldrov. The most common Water-Hen, or More-Hen.*

Aves aquis innatantes palmipedes.

1. *PHœnicopterus, The Flamingo.*

2. *Hirundo marina minor capite albo, Passer stultus Nicremberg. A Noddy.*

3. Onocrotalus five Pelecanus fuscus. Grand-gosier *Roche-
fort* & *Du Tertre*. *The Pelecan*.

4. Avis Tropicorum. Festu in cul ou l'Oiseau de
Tropic du Tertre. *The Tropic Bird*.

5. Anseri Bassano affinis Avis cinereo-alba. *A Booby*. Al-
bo & cinereo colore varia est; Anatis Moscoviticæ mag-
nitudine, tetradactylos, digitis omnibus membranis
connexis. Aquis imminent Milvorum modo, absque a-
larum agitatione aërem tranantes, ex alto prædam spe-
culantes, & Pisces quamprimum prope aquæ superficiem
apparent rapientes. Rostrum longum teretiusculum, fla-
vicans. Caribbeas insulas frequentant; numerosis gre-
gibus insulam quandam parvam non longe à *Nieves*, *Re-
dondo* dictam, incolis vacuam & desertam advolitant, ibi-
démque nidificant & pariunt.

6. Anseri Bassano congener fusca Avis. An Faves *Roche-
fortii*? Avi præcedenti persimilis est. cum qua plerun-
que capitur. Differt colore saltem obscuriore.

7. Hirundo marina major. Patines de Oviedo, *lib. 14.
cap. 1.* *The greater Sea-Swallow*. Columbâ vulgari
major erat, colore in dorso obscurè cinereo seu griseo
quem vocant, infernè albo: Alis acutis, volatu pernici;
Hirundinis more Aquæ superficiem stringere seu radere
videtur, prædæ intenta. Sub vesperam volatu continuo
delassatæ congregantur multæ insimul, & aquæ super-
ficie insident. In alto mari 50 circiter leucis ab ex-
tremo Occidentali Angliæ promontorio, *the Lands end*
dicto primò occurrunt, & abinde in Boreali Atlantici
Oceanii parte ad *Maderas* usque insulas frequentes cer-
nuntur. A quibus non longè versùs Canarias dictas de-
sertæ quædam insulæ *Salvages* dictæ jacent, in quibus
Aves hæ pariunt & se multiplicant magno numero.

8. Anser domesticus. *The Tame Goose*. Ex Europa ini-
tio huc translatus.

9. Anser Canadensis. *The Canada Goose*.

10. Anas domestica vulgaris. *The common tame Duck*.

11. Anas moschata, an Cayrina Aldrov. ? *The Muscovy
Duck*.

Anas

12. *Anas fistularis*, arboribus insidens. *The Whistling Duck*. Ab apice rostri ad extremam caudam 20 circiter digitos longa erat. Voce fistulæ sonum imitatur, unde nomen : & quod singulare est in hoc Avium genere, arboribus insidet. In hac insula frequens est

13. *Anas fera* ventre candido. *The White-bellied Duck*. Longa erat 20 uncias, 30 lata. Rostrum nigrum, duos digitos longum, narium foraminibus rotundis. Cauda ad 3 digitos extendebatur. Caput plumis obscurè & dilutiùs fuscis mixtis tegebatur. Superior pars colli, partes subalares, & venter etiam aliquatenus, pennis fuscis, & albescentibus lineolis transversis variis, tegebantur. Dorsum plus fusci minus albi obtinet. Cauda & alæ dilutiùs fuscae, verùm è brevioribus seu mediis remigibus nonnullæ colore viridi aurantiacum & album intercedente pictæ. Pectus & ventris bona pars alba. Crura & pedes è fusco virelcebant.

14. *Querquedula secunda* Aldrov. An *Anas Circia* Gesn. ? *The Teal*.


15. *Rabihorcados todos negros* de Oviedo, lib. 14. cap. 1. *Fregattes du Terre*. *Avis Rabo focardo* Lusitanis GAZOPHYL. Natur. PETIVER. Tab. 45. Fig. 1. Catal. 182. *A Man of War*.



MAN-




INDIAN BIRDS about FORT ST GEORGE.



INDIAN BIRDS about FORT ST GEORGE

13. *Pied Bird of
PARADISE.*



14. *Broad-taild
MADRASS
DOVE.*



15. *PARROT DOVE*



16 *Red JAY-DOVE*



17 *Red. Pied
DOVE.*



18. *MADRASS
RING-DOVE*



19 *Cock SAULARY.*



20
Hen SAULARY



21
SANGUILLO



22 *Red TOORACA
with a black Head*




23
Black TOORACA



24
*Pied TOORACA
with red spots.*





MANTISSAM HANC

A V R U M Maderaspatanarum

Addidit peritissimus Naturalis Historiæ Cultor

D. JACOBUS PETIVERUS, S. R. S.

Quarum Descriptiones ex Iconibus elegantissimè pictis;

Sibi à D. EDVARDO BUCKLEY;

A B A R C E

Maderaspatana (*vulgo* Fort St. George)
missis, desumptæ sunt.

1. **HIMANTOPUS** Maderaspatanus *è nigro albente, cruribus rubris*; Nobis. An *Himantopus* Plinii lib. 10. cap. 47? *The red legged CRANE.* Fig. 3. *Rostrum* longum, gracile, nigrum. Dorsum, Alæ (quæ ultra caudam extenduntur) Vertex; Cervicis pennæ (usque ad Scapulas crispata) eodem colore: inde usque ad caudæ finem albo. *Femora* nuda; *Crura* longissima, gracilia; *Digiti* tres (Postico enim caret) membranulis connexi; rubro. *Ungues* acuti, adunci, nigro. Cum *Aldrovandi* descriptione benè convenit.

2. **GALLINAGO** Maderaspatana *Perdici colore.* *The PARTRIDGE-SNIPE.* Fig. 2. Coloribus variis, maculisque elegantibus undique ornatur. Venter & Pectus (quòd linea lata transversa nigra dividit) albescent. *Caput*, *Tempora*, & *margo Alarum* superior maculis nigrofuscis asperguntur. *Remiges alarum*, & *Cauda* luteo, griseo, nigroque eleganter interstinguuntur. *Rostrum* longum (apice crassiusculo) rufescit. *Digit*

[N]

143

tus posticus (ungue adunco) longitudine anteriorem æquat.

3. *Motacilla Mader. nigro alboque mixta.* The Black and White WAGTAIL. Fig. 3.

4. *Motacilla Mader. ex albo cinerea, caudâ forcipatâ.* The forked WAGTAIL. Fig. 6. Hunc & præcedentem Marem esse & Faminam existimo. Utrique (præsertim huic) cauda forcipata, quæ ex 4 tantum pennis constare videtur, exterioribus albis, mediis nigris.

5. *Avis Maderas. major, Novaculæ facie.* Coddel Cauka, sive Summoodra Cauky Malabaricis. The SEACROW. Fig. 5. Nigrescunt Vertex & Alæ, quarum extremitates longissimæ, tenues, recurvæ. Collum, Pectus, Venter albicant, lineolis subfuscis striata. Rufescunt Crura brevia, Digiti (usque ad medium membranulis intercedentibus juncti) & magna pars Rostris. Maxilla superior inferiore multò brevior, & in eandem ut Novacula in Manubrium suum incidit. Hujusmodi Rostrum è Carolinâ olim accepi, cujus Icon in Gazophil. Nat. & Art. Tab. 76. Fig. 2. exhibetur.

6. *Crex Indica ex albo cinerea, nigroque mixta.* Caurangoly, Malabarensibus; Boollu Cory, Gentilibus: The Maderas RAIL-HEN. Fig. 4. Capite, Corporis magnitudine & figura, Anati similis: Rostrum autem habet acutum, teres, longiusculum; Pectus album, maculis lunulatis nigrisculis respersum; Pennas alarum cinereas, marginibus nigris: Caudam brevissimam; Digitos & Ungues (aduncos) longos.

7. *Pica Maderas. fulva, alis penè nigris.* Vanga Pandooe; Gentil. The BUFF-JAY. Fig. 9. Magnitudo circa Pice glandariæ nostratis. Caudæ superior pars, nigra, apice excepto, qui flavus: pars inferior alba flavo mixta. Ductus niger obliquus oculos cingit. Alæ nigræ, apicibus, & areola circa medium, flavis: Cætera fulva, lineolis ruffo-fuscis interstincta.

8. *Pica Madraspatana flavicans.* Vanga Pandooe Pedda; Gent. The YELLOW-JAY. Fig. 8. A præcedente differt colore dilutiore flavo; Pectore usque ad anum lineolis obliquis sinuosis (pellium Armeniana-

rum instar) insignito; Alis integris, & Macula ovali Oculis ambiente, nigricantibus: Dorso & Guttore flavo.

9. *Pica Madraspat. Sturni ad instar maculata. Cundoe Vanga Pundoe*; Gent. The MOTL D-JAY: Fig. 7. à præcedente differt Pectore & Dorso mitcelli coloris; Capite & Caudâ in hac nigrescente, quæ in illâ flavo.

10. *Pica Maderas. p. virescens caudâ tricuspide. Passary Caye. Gent. The GREEN-JAY. Fig. 10.* Magnâ ex parte viridis; Dorso & caudâ intensius Cauda tricuspis notabilis, apicibus nigricantibus, cuspidè mediâ longissimâ.

11. *Pica Maderas. p. minima è cœruleo nigrescens. Peach Caye; Gent. The small blew JAY. Fig. 11.* Caput & Alæ cœruleo intensiore quam Cauda. Cætera nigra aut cinerea; Cruribus & Rostro exceptis, quæ rufescunt.

12. *Pica Indica vulgaris: Ponnunky pitta; Gent. Ponnandurry; Maderaspatanensibus: The MADRASS-JAY. Fig. 10.* Nostrati *Pica glandaria* affinis est. Linea arcuata albida supra oculos. Alarum tegetes virescunt, Scapis flavescentibus; juxta basin alarum macula cœrulea: Remiges & Cauda nigrescunt: Uropygium cœruleo maculatur: inter femora usque ad caudam rufescit.

13. *Manucodiata cristata ex albo nigroque variata: Tella Yeaco narry; Gent. The pied BIRD OF PARADISE. Fig. 13.* Hanc elegantissimam rarissimamque avem ejusdem speciei esse credimus, ac ea quam in Hollandiâ inter *Κεμυλία Hermanniana*, Anno 1711. pro Clariss. SLOANIO emi. In D. Hermannii catalogo, p. 13. No. 184. vocatur, *Avicula Paradisea Zeylanica barbata ex albo & nigro variegata, caudâ 2 longissimis pennis constructa: Walluhora, Zeylanensibus, i.e. Gossypium furcata: Het Catoen Diefje; Belgis. Rstrum, Crista, & totum Caput nigra. Cætera alba, lineis arcuatis, sive lunulatis respersa. Cauda insignis, pennis 2 longissimis. Apud Hollandos in magno pretio habetur, & inter rarissima numeratur. Nec quicquam ex Clariss. Hermannii Museo refertissimo pluris vendebatur.*

14. *Columba Maderasp. cauda 3 pennis latis conflata*. The *Broad-tailed MADERAS DOVE*. Fig. 14. Pars maxima corporis albescit. At alarum bases colore sulphureo, maculis rufescentibus fimbriatæ: extremitates Remigum nigræ. In Uropygio 3 pennæ miniacæ acutæ. Rostrum & Crura lutea. Huic proprium & peculiare, Cauda tribus tantum pennis longis latis, albis, nigro undulatis, scapis rubris, constructa; quarum extremæ breviores, setâ longâ nigrâ inter singulam pennam interpositâ.

15. *Columba Maderasp. variis coloribus eleganter depicta*. The *PARROT-DOVE*. Fig. 15. Variis coloribus perfunditur: *Pectus* sanguineo flavi umbrâ; *Caput* & *Venter* obscure viride pallecente; *Alæ* fusco viride tincto; marginibus viride & luteo undulatis: Remigum apices, & pars Caudæ superior nigro; inferior rufescente. *Femora* lanugine obducuntur. *Crura* brevissima, crassa, rufescentia. *Pedes* longi ejusdem coloris. *Rostrum* breve, crassum, prope apicem torosum.

16. *Columba Maderasp. è rubro alboque mixta*: The *red JAY DOVE*. Fig. 16. Temporibus, Pectore & Ventre albis; Rostro & Vertice rubris, lineis duabus ejusdem coloris; unâ collum cingente, altera pectus & ventrem dividente. Bases alarum cancellatæ, ut in *Picâ glandariâ*, tantum rubro: Cæteræ Alarum pennæ albæ, marginibus nigrescentibus, Remigibus exceptis, rubris albo tinctis. Cauda eodem colore, apice & lineis latis transversis rubris.

17. *Columba Maderasp. minor, ex albo rufescens*: The *small red pied DOVE*. Fig. 17. Buccæ, Pectus, Venter, Femora alba: *Alæ*, Cauda, Vertex, subrubra. Supra Oculos linea lata nigra: eodem colore *Pedes*, Crura longa, nuda, gracilia.

18. *Avi Maderasp. è cinereo-rubente*. *MADRASS RING-DOVE*. Fig. 18. *Woorulla Ponnunky*; Gent. *Magnitudine Turdum* æquare videtur; cinereo colore perfunditur, præsertim capite, collo, dorso, alis, & porriunculâ caudæ: pectore autem, ventre, & majore caudæ

caudæ parte, incarnato colore: vertice, alarum apicibus, & lineâ transversâ sub maxilla inferiore, nigro: rostri apice flavescente.

19. *Saulary mas* Mad. *ex albo nigroque mixtus*. The COCK SAULARY. Fig. 19. Magnitudo *Sturni*. Pectus, venter, femora, pars caudæ inferior, & areola in alis albissima; cætera nigricantia.

20. *Saulary femina* Mad. *fusco alboque varia*. The HEN SAULARY. Fig. 20. A Mare distinguitur caudâ acuminatâ, & colore, qui in hâc fuscus, ubi in illo niger.

21. *Sanguillo* Mad. *capite caudaque nigris*. Fig 20 Gulla Cavalla; *Gent.* Magnitudo *Pica variæ*. Vertex elatus, *Rostrium*, collum, & cauda, nigerrima, *Alæ*, scapulæ, dorsum, & uropygium, rubra. *Venter* & femora alba. Hujus avis nota *characteristica* est Vertex acuminatus, & Cauda 3 pennis latis, in acumen desinentibus, constructa; media penna ultra extimas protenditur, & Tragulæ formam caudæ tribuit.

22. *Tooracca Pigaly* Mad. *è rubro alboque mistis, capite acuminato nigro* The red TOORACCA, with a black Head. Fig. 22. Huic Avium generi nota *characteristica* Setæ quædam tenues in cervice.

Multæ sunt earum *Species*, quæ coloribus præcipud inter se distinguuntur.

Huic *pectus*, venter, femora, & inferior pars caudæ, alba: *Scapulæ*, dorsum, alæ, caudæ pars superior, & anus, rubra.

Hæc & sequentes à *Sanguillo* differunt, *Setis* in cervice, & quod *Sanguillo* dimidio minores sint.

23. *Tooracca* Maderasp. *è rubro alboque partitis*. The Red and White TOORACCA. Præcedenti similis, capite excepto, huic rufo, illi nigro.

24. *Tooracca* Mader. *albida, ano rubente*. The whitish TOORACCA. A præcedente differt colore, huic cinereo albo, ubi illi rubro.

25. *Tooracca* Mad. *nigrescens*. The black TOORACCA. Fig. 23. Totum fere corpus nigrum, apice caudæ

198 SYNOPSIS METHŌDICA, &c.

excepto, albo. In hâc notatu dignum, Podicem, seu Potius pennulas caudam sustinentes, nigricare, in omnibus aliis rubere.

26. *Tooracca* Mad. è *nigro albicans*. The MAGPY TOORACCA. Pectus (nigris lunulis conspersum) venter & caudæ pars inferior, alba. Pectoris colore, & ani rubicundia à præcedente differt.

27. *Tooracca* Mad. *auribus, & maculâ in basi alarum sanguineis*. The MAGPY-TOORACCA, with red Spots. Fig. 24. A præcedente differt maculis sanguineis juxta Aures, & Alarum bases.



INDEX

INDEX

NOMINUM

AVIUM

Anglicorum, Wallicorum, Cornubiensium,
Septentrionalium, cæterorumque Britani-
corum & Hibernicorum.

A. Pag. Pag.



L P

Amzel

Auk

B.

Bald-Buzzard

Bald-pate

Bee-eater

Bergander

Bernacle

Bilcock, or Brook-Owzel

Bird, Black and Yellow

— Black and Orange

— Bonana

— Humming Birds

— Savanna

— Small Black and White

86

65

119

16

184

49

140

137

113

186

188

187

ibid.

188

186

— Small Yellow

Brown

— Tropick

Bittour, or Bittern

— Small

Black-Bird

— Great and Small of

Jamaica

Black cap

Black-Cock

Black-Game

Booby

Bottle-Nose

Bramble, or Brambling

Brent-Goose

Bull-Finch

Bunting

Burgo-master of *Greenland*

Burrough Duck

[N 4]

and

186

197

100

189

65

185

73, 128

53

ibid.

191

120

88

137

86

93

127, 130

140

Bustard

I N D E X.

| | | | |
|--------------|--------------|-----------|---------------|
| Bustard | Pag. 58 | Curlew | Pag. 103. 190 |
| Butcher-bird | 18, 19 | Curwillet | 109 |
| Buzzard | 16 | | |
| —Honey | <i>ibid.</i> | | |

D.

C.

| | |
|---------------------------|-------------|
| C Anary-Bird | 91 |
| Carriou-crow | 10, 11. 180 |
| Cassowary | 36 |
| Chaffinch | 88 |
| Chattering-Crow, or Ca- | |
| cao-walk | 181 |
| Churn-Owl | 180 |
| Clakis | 137 |
| Cockatoons | 28, 29 |
| Cock and Hen | 51. 182 |
| Cock of the Wood, or | |
| Mountain | 53 |
| Coddy-Moddy | 130 |
| Cold-Finch | 77 |
| Cole-Mouse | 73 |
| Coot | 116 |
| Cormorant | 122 |
| Cornish-chough | 40 |
| Coulterneb, or Counterneb | |

120

| | |
|-----------------|--------------|
| Crab catcher | 182 |
| Cracker | 147 |
| Crane | 95. 123 |
| —with red Leggs | 193 |
| Creepers | 47 |
| Cross-bill | 86 |
| Crow | 39 |
| —Royfton | <i>ibid.</i> |
| —Sea-Crow | <i>ibid.</i> |
| —Madrafs | 194 |
| Cuckow | 23 |
| Cantur | 11 |

| | |
|----------------------|--------------|
| D Aker-Hen | 58 |
| Didapper, Dipper, or | |
| Dob chick | 125. 190 |
| Divers, or Douckers | 124, |
| | 125 |
| Dodo | 37 |
| Dotterell | 111 |
| Dove | 59. 183 |
| —Madrafs | 196 |
| Duck, black | 141 |
| —Cuthbert | <i>ibid.</i> |
| —Hook-bill'd | 150 |
| —Muscovia | 150. 191 |
| —Scaup. | 142 |
| —Tame | 150. 191 |
| —Tufted | 142 |
| —Whistling | 192 |
| —White-bellied | <i>ibid.</i> |
| Dun-diver | 134 |
| Dunlin | 109 |

E.

| | |
|-----------------------|-----|
| E Agle, black | 7 |
| —Golden | 6 |
| —White-tailed, or Py- | |
| gard | 7 |
| —Sea | 16 |
| Elk | 136 |
| Ear-Dove | 184 |

F.

| | |
|-------------------------|----|
| F alcon, Gentile | 13 |
| —Haggard | 14 |
| —Jer- | |

I N D E X.

| | | | |
|---------------------|--------------|------------------------|--------------|
| — Jerfalcon | Pag. 13 | Grouſe, or Gray-game | P. 53 |
| — Mountain | <i>ibid.</i> | Grygry | 19 |
| — Peregrine | <i>ibid.</i> | Guillem, or Guillemot | 120 |
| — Red | 14 | Gulden-head | 120 |
| — Stone | <i>ibid.</i> | Gulls, Black and White | 127 |
| — Tree | <i>ibid.</i> | — Herring Gull | <i>ibid.</i> |
| — Tunis, or Barbery | <i>ibid.</i> | Guinea-Hen | 182 |
| — White | <i>ibid.</i> | | |

| | |
|--------------------------|-----|
| Fallow-Smith | 79 |
| Field-Fare, or Feldefare | 64 |
| Flamingo | 190 |

G.

| | |
|--------------------------|--------------|
| G Adwall, or Gray | 145 |
| — Gannet | 128 |
| Gaulding, Black or Blew | 189 |
| — White | <i>ibid.</i> |
| Gid | 105 |
| Glead | 17 |
| Goat-fucker | 27. 180 |
| Godwit | 105 |
| Golden Eye | 142 |
| Gold-Finch | 89 |
| Goofander | 134 |
| Goose of <i>Canada</i> | 139. 191 |
| — Gambo, or Spur-winged | 138 |
| — Soland | 122 |
| — Tame and Wild | 136 |

| | |
|-----------------------|-----|
| Gorcock, or Gor-Fowle | 54 |
| Goshawk | 18 |
| Gray-Lagg | 138 |
| Great Grey Gull | 130 |
| Green-Finch | 85 |
| <i>Greenland-Dove</i> | 121 |
| Grofs.beak | 85 |

H.

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| A Merican Hangneft | 184 |
| — Haw-Finch | 85 |
| Hawks | 13 |
| Hazlehun | 55 |
| Heath-Cock | 53 |
| Hedge-Sparrow | 79 |
| Hele gug | 120 |
| Henharrier | 17 |
| Heron, common | 98 |
| — Leffer-Aſhcoloured, or Night-Raven | 99 |
| — White | <i>ibid.</i> |
| Herring-Gull | 127 |
| Heyhoe | 42 |
| Hickwall | 43 |
| Hobby | 15 |
| Hoop, or Hoopoe | 48 |
| Hooper | 136 |
| Humming-Birds | 82. 187 |

I.

| | |
|--------------------------|-----|
| J Ack-Daw | 40 |
| — Jack-Snipe, or Judcock | 105 |
| Jay | 41 |
| — Madraſ | 194 |

Kestrel

I N D E X.

| K. | Pag. | Merlin | Pag. |
|-----------------|---------|----------------|-------------|
| K estrel | 16. 180 | Mire-Drum | 100 |
| Kiddaw | 120 | Missel bird | 64 |
| King Fisher | 48 | Mock-bird | 64. 66. 185 |
| Kite | 17 | More Hen | 113. 190 |
| Knot | 108 | Moor Buzzard | 17 |
| | | Moor-Cock | 54 |
| | | Moor-Titling | 76 |
| | | Mountain-Finch | 88 |
| | | Mullet | 120 |

L.

| | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------|-----|
| L Annar and Lannaret | 15 | Murre | 119 |
| Lapwing | 110 | Musket | 18 |
| Lark. Field or Sky | 69 | Mwyalchen y graig | 66 |
| —Crested, greater and lesser | <i>ibid.</i> | | |
| —Sea | 88. 190 | | |
| —that sings like a Grass-Hopper | 70 | | |
| —Tit-Lark | 69 | | |
| —Wood-Lark | <i>ibid.</i> | | |
| Linner, common | 90 | | |
| —Great and Lesser, Red-headed | 91 | | |
| —Mountain | <i>ibid.</i> | | |
| Logger-head | 185. 186 | | |
| Long-legs | 190 | | |
| Loon | 125. 190 | | |

N.

| | |
|--------------------------|----------|
| N ightingale | 78 |
| —Jamaica | 135 |
| —Spanish | 184 |
| —Virginian | 85 |
| Night-Raven | 98 |
| Noddy | 132. 190 |
| Nope | 86 |
| Nun | 74 |
| —White-Nun | 135 |
| Nut-Hatch, or Nut-jobber | 47 |

O.

M.

| | |
|---------------------|---------|
| M Acaos | 28. 29 |
| Maccaw, the greater | 181 |
| Magpy | 41 |
| Man of War | 192 |
| Martin, or Martlet | 71 |
| —Black, or Swift | 71, 185 |
| —Sand | 71 |
| Mavis | 64 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| O LD Man | 182 |
| Osprey | 7 |
| Ostrich | 36 |
| Owls, or Howlets | 26 |
| —Brown, Ivy, or Screech | 25 |
| —Grey | 26 |
| —Horn | 24. 25 |
| —Lottle | 26 |
| —Fern, or Churn | <i>ibid.</i> |
| —White, | |

I N D E X.

— White, Barn, or Church

Pag. 25

Ox-Eye

73. 110

P.

| | |
|---------------------------|-------------|
| P aradise Bird | 195 |
| Parrakeets | 34. 181 |
| Parrots | 30. 181 |
| Partridge | 57 |
| — Mountain | 183 |
| — Snipe | 193 |
| Peacock | 51. 183 |
| Pelecane | 121 |
| — <i>American</i> Scarlet | 189 |
| Pellicane | 102. 191 |
| Penguin | 118 |
| Pettrichaps | 79 |
| Pewit | 128 |
| Pheasant | 56 |
| Pianer | 41 |
| Pie, yellow and black | 181 |
| Pigeons | 59, &c. 183 |
| Pintado | 52 |
| Plover, bastard | 110 |
| — Great | 190 |
| — Green | 111. 190 |
| — Grey | 111 |
| — Sea | 190 |
| Pochard | 143 |
| Pool-Snipe | 107 |
| Pope | 120 |
| Popinjay | 30 |
| Pouts | 54 |
| Puffin | 120. 134 |
| Puttock | 16 |
| Pygard | 7 |

Queeft
Quirizao

Q.

Pag.

62

183

R.

| | |
|---------------------------|---------|
| R ail | 58. 113 |
| — Water-Rail | 190 |
| — Hen Madrafs | 194 |
| Rain-Fowle | 42. 182 |
| Rat, or Road Goose | 137 |
| Raven | 39 |
| Razor-bill | 119 |
| Red Game | 54 |
| Red Shank | 107 |
| Red Start | 78 |
| Red-Wing | 64 |
| Reed-Sparrow, the greater | 47. 93 |
| — Lesser | 47 |
| Ring-Dove | 62 |
| Ring-Owzel | 65 |
| Ring Tail | 17 |
| Robin-red-breft, or | Rud- |
| dock | 78 |
| Rock-Owzel | 65 |
| Roller | 41 |
| Rook | 39 |
| <i>Royfton</i> -Crow | 39 |
| Ruffe and Reeve | 107 |

S.

| | |
|--------------------|-----|
| S anderling | 109 |
| Sand-Martin | 71 |
| Sand-piper | 108 |
| Scare-Crow | 131 |
| Scaup-Duck | 141 |
| Scoter | |

INDEX.

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------|---------------|----------|
| Scoter | Pag. | 141 | Stone Curlew | Pag. | 105, 108 |
| Sea Crow | | 128 | Stone Plover | | 105 |
| Sea-Dottoreil | | 112 | Stone Smith, or Stone-char- | | |
| Sea-Lark | 88. | 112 | ter | | 76 |
| Sea-Mall, or Mew | | 127 | Storks | | 97 |
| Sea-Pheasant | | 147 | Swallow | | 71 |
| Sea Pie | | 105 | — Sea | 131, 132, 191 | |
| Sea-Swallow | 131, 132, | 191 | Swan, tame | | 136 |
| —— Leffer | | 131 | —— Goose | | 138 |
| —— Leffer, black, cloven- | | | —— Wild | | 136 |
| footed | | 132 | Swift | | 72 |
| Sea-Turtle | | 121 | Swine-pipe | | 64 |
| Shagge | | 123 | Syvigw | | 80 |
| Shear-water | | 133 | | | |
| Sheld-apple | | 86 | | | |
| Sheldrake | | 140 | | | |
| —— Swallow-tail'd | | 145 | T Arroch | | 128 |
| Shore bird | | 71 | Teal | 147, 148, 192 | |
| Shoveler | | 143 | Brown Tern | | 131 |
| Shrite | | 64 | Tewit | | 110 |
| Silk-tail | | 85 | Thistle-Finch | | 89 |
| Siskin | | 91 | Throstle, or Song Thrush | | 64 |
| Skout, or Sea Hen | | 120 | Thrush of Jamaica | | 185 |
| Snipe, or Snite | 105. | 190 | Titmouse, Blew, or Nun | | 74 |
| Song-Thrush | | 64 | —— rested | | 74 |
| Sparling Fowl | | 134 | —— Great | | 73 |
| Sparrow-Hawk | | 18 | —— Long-tailed | | 74 |
| Sparrow | | 86 | —— Marsh, or Black-cap | | 73 |
| —— Black | | 188 | Tropick Bird | 123, 191 | |
| —— Green | | 187 | Turkey | 51, 182 | |
| —— Hedge | | 79 | —— Wild, of New Eng- | | |
| —— Reed | | 47, 93 | land | | 51 |
| Spoon-bill | | 102 | Turn-stone | | 112 |
| —— Scarlet | | 189 | Turtie Dove | | 61 |
| Stannel, or Stone-gall | | 16. | | | |
| | | 180 | | | |
| Starce, or Starling | | 67 | | | |
| Stint | | 110 | V Vultures | | 9, 10 |
| Stoa Lein | | 66 | —— Chestnut coloured | | 10 |

I N D E X.

W.

| | Pag. | Winter Mew | Pag. |
|--------------------------|----------|-------------------------------|------|
| W Agtail, white | 75 | Woodcock | 104 |
| — Yellow | 75 | Wood Owl | 180 |
| — Madrafs | 194 | Wood-spice, or Wood-pec- | |
| Watchy Picket | 184 | ker, great, black | 42 |
| Water Hen | 113, 190 | — Great spotted, or Wir- | |
| Water Ouzel, or Crane | 66 | wall | 43 |
| Water Rail | 113, 190 | — Green | 42 |
| Wheat-ear, or White-tail | 75 | — Lesser spotted | 43 |
| Whewer | 143, 146 | — Particoloured of <i>Ja-</i> | |
| Whilk | 138 | <i>maica</i> | 181 |
| Whimbrell | 103 | Worm-eater | 186 |
| Whin-char | 76 | Wren | 80 |
| White Nun | 135 | — Golden coloured | 79 |
| White Throat | 77 | Wry-neck | 44 |
| Wigeon, Whewer, or Whim | | | |
| | 146, 147 | | |
| — Great red-headed | 143 | | |
| Wild Duck | 145 | | |
| Wind hover | 16 | | |
| Wind Thrush | 64 | | |

Y.

| | |
|------------------------------|-----|
| Y Arwhelp, or Yarwhip | 105 |
| Yellow Bird | 80 |
| Yellow Hammer | 93 |

I N D E X Nominum A V I U M *Latinorum, Gallicorum, Belgicorum, Brasilianorum, Germanicorum, In- dicorum, Mexicanorum, Italicorum, Lusitanorum, &c.*

| | | | |
|-------------------------|-----|-----------------|--------------|
| A Cacà cahoactli | 174 | — Alaudarius | 15 |
| Acacalotl. | 104 | — Fringillarius | 18 |
| Acatechichiactli | 90 | — Palumbarius | <i>ibid.</i> |
| Achalalactli | 156 | Acitli | 125 |
| Accipitres Macropteri | 13 | Acolchichi | 166 |
| | | Acolin | |

I N D E X.

| | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Acolin | Pag. 116, 178 | —— Hispanicus | Pag. 138 |
| Ægocephalus | 105 | —— Marinæ | 140, 141, |
| Æsalon | 15 | —— | 142, 143, 144, 145 |
| Aguapecaca | 115 | —— Maximus niger | 138 |
| Ahuatotoſt | 167 | —— Mexicanæ | 175 |
| Aiaia | 102, 189 | —— Moſchata | 191 |
| Ajurucurau | 32 | Andorinha | 72 |
| Ajurucuruca | } | Anhima | 96 |
| Ajurucatinga | | Anhinga | 124 |
| Ajurupara | | Ani | 35, 185 |
| Alauda arborea | 69 | Anſer Baſſanus | 122 |
| —— Criſtata major & mi- | ibid. | —— Canadenſis | 139, 191 |
| nor | | —— Cygneus Guinneen- | |
| —— Congener | 93 | ſis | 138 |
| —— Indica | 70 | —— Domesticus | 136, 191 |
| —— Marina | 110 | —— Ferus | 136 |
| —— Minima Locuſtæ voce | | —— Gambenſis | 138 |
| | 70 | —— Magellanicus | 118 |
| —— Minor campeſtris | ibid. | —— Paluſtris | 138 |
| —— Pratorum | 69 | —— Spitzbergenſis | 139 |
| —— Vulgaris | ibid. | Anthos | 81 |
| Albardeola | 102 | Apiafter | 49 |
| Albellus | 135 | Apeca Apoa | 148 |
| Albicilla | 7 | Aquilæ | 6, &c. |
| Alca | 119 | —— Braſilienſis | 7 |
| Alcyon | 48 | —— Fulva | 6 |
| Aluco | 25 | —— Valeria | 7 |
| Amacozque (in Ornithol. D. | | —— Virgæ | 161 |
| Willughb. Amalozq;) 179 | | Aracari | 44 |
| Anaca | 35 | Araracanga | 29 |
| Anas Arctica | 120 | Ararauna | 28, 181 |
| —— Campeſtris | 59 | Arcuata major & minor | 103 |
| —— Circia | 192 | Ardeæ 98, 99, 100, 101, 102 | |
| —— Domestica | 150, 191 | —— Cœrulea | 189 |
| —— Exoticæ Braſil. | 148, | —— Stellaris | 100, 189 |
| | 149, 192 | Ardeola Braſilienſis | 101, 102 |
| —— Fera lacuſtris | 175 | Arenaria | 109 |
| —— Fiſtularis | 192 | Arquata major & minor | 103 |
| —— Fluviatiles | 145, 146, | | |
| | 147, 148 | | |

Aflus

I N D E X:

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| Aglus Bellonii | Pag. 80 | ——— | Paradisi P. 20, 21, 22 |
| Año | 25 | ——— | Picta 173 |
| Astur | 18 | ——— | Pipirivara 44 |
| Atinga guacu mucu | 165 | ——— | Pluviae 182 |
| Atrotl | 47 | ——— | Polyglotta 65 |
| Atrotloquichitl | <i>ibid</i> | ——— | Pngnax 107 |
| Atricapilla | 79 | ——— | Rostri mucronati |
| Attagen | 54, 55 | | 177 |
| Attageni | 54 | ——— | Rostri nigri 169 |
| Avicula Amadavadæa | 92 | ——— | Rubescantis colli 179 |
| ——— Africana | 152 | ——— | Saligna 170 |
| ——— Zeylanica | <i>ibid.</i> | ——— | Se scalpens ad arun- |
| Avium divisio | 1 | dines | 172 |
| Avis Arenam deglutiens | | ——— | Sicca 179 |
| | 176 | ——— | Spicæ Maizii 170, |
| ——— Canuti | 108 | | 172 |
| ——— Corvina | 168 | ——— | Tarda 58 |
| ——— Corvipeta | 155 | ——— | Tropicorū 123, 191 |
| ——— Coccinea | 173 | ——— | Varii capitis 176 |
| ——— Consimilis Stoparolæ | | ——— | Venti 175 |
| & Magninæ | 81 | ——— | Verminea 156 |
| ——— Cinereo-alba | 191 | ——— | Vetula 170 |
| ——— Cœrulea seu Cyanos | | Avosetta | 117 |
| | 66 | Aura | 10, 180 |
| ——— Cyaneorum pedum | | Aurarum Regina | 161 |
| | 170 | Aurivittis | 90 |
| ——— Diomedea | 133 | Axoquen | 174 |
| ——— Florida | 168, 170 | Axoyatorl | 172 |
| ——— Fulva | 174 | Ayo quantorl | 171 |
| ——— Fusca Anseri Bassano | | Ayo quantorl tiltic | <i>ibid.</i> |
| congener | 191 | | |
| ——— Jamaicenses | 180 | B. | |
| ——— Incurva | 161 | B Albusardus | 7, 16 |
| ——— Lati rostri | 176 | Barge | 105 |
| ——— Lunaris | 175 | Beccafigo | 79 |
| ——— Lutea | 173 | Bemtere | 165 |
| ——— Nivea | 169 | Bernacla, & Burnicla | 135 |
| ——— Numidica | 51, 182 | Boarina | 77, 81 |
| ——— Ovimagna | 155 | Boollu | |

I N D E X.

| | | |
|----------------------------|------|-------------------|
| Bollu Cory | Pag. | 154 |
| Borin | | 81 |
| Bosch duiven | | 152 |
| Boschas major | | 145 |
| Bout de petun. | | 152 |
| Brenta | | 137 |
| Brenthus | | <i>ibid.</i> |
| Bubo | | 24 |
| Buteo Apivorus five Vespi- | | vorus 16 |
| ——Vulgaris | | <i>ibid.</i> |
| C. | | |
| C Abure | | 26 |
| Cacatototl | | 172 |
| Cacalototl | | 168 |
| Cairina | | 150, 191 |
| Calandra | | 93 |
| Callidrys | | 106, 108 |
| Canide | | |
| Carne petiere | | 59 |
| Cannevarola | | 47 |
| Canuti Avis | | 108 |
| Capella | | 110 |
| Capo rosso | | 143 |
| Caprimulgus | | 26; 27, 180 |
| Caquantototl | | 174 |
| Caracara | | 17 |
| Carduelis 89 | | |
| ——Congener | | 90 |
| Cariamama | | 96 |
| Caryocatactes | | 42 |
| Casarius seu Casoris, | | five |
| Emeu | | 36 |
| Catoen Diefje | | 195 |
| Caunangoly | | 194 |
| Catarractes | | 128 |
| Catarracta | | 129 |
| Caxcaxtototl | | 167 |
| Cecero | | Pag. 161 |
| Cehoilotl | | 63 |
| Cencontlatolli | | 65, 159, 185 |
| Cenchramus | | 93 |
| Cenchris | | 16 |
| Cenótzqui | | 159 |
| Ceoan | | 169 |
| Cepphus | | 129 |
| Certhia | | 47 |
| Chachalacametl | | 163 |
| Chachavatototl | | 174 |
| Chadonneret | | 153 |
| Charadrius | | 108, 112, 190 |
| Chiantototl | | 167 |
| Chichiçtli | | 160 |
| Chichiltototl | | 174 |
| Chiculatlí seu Chiquarltí | | 110, 160, 178 |
| Chietototl | | 166 |
| Chilcoquipaktototl | | 168 |
| Chiltototl | | 169, 173 |
| Chochopitlí, Corlito | | 178 |
| Chloreus | | 68 |
| Chloris | | 85, 93 |
| Chrylaetos | | 6 |
| ——Caudâ annulo albo | | <i>ibid.</i> |
| Ciconia alba | | 97 |
| ——Americana | | <i>ibid.</i> |
| ——Nigra | | <i>ibid.</i> |
| Cinclus | | 47, 108, 110, 112 |
| Circus | | 17 |
| Cirlus | | 93 |
| ——Stultus | | 94 |
| Cirris | | 99 |
| Citrinella seu Citril | | 92 |
| Clangula | | 142 |
| Cocol | | 100 |
| Coccothraustes vulgaris | | 85 |
| ——Indica | | |

I N D E X.

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| —Indica | Pag. 85 | Coturnix | Pag. 58 |
| —Indica cristata | <i>ibid.</i> | —Aquatilis | 116 |
| Cocochatl | 172 | —Indica | 58 |
| Cocoztli | <i>ibid.</i> | Coxolitli | 56, 57 |
| Cocozton | <i>ibid.</i> | Coyolcozque | 158 |
| Cochitenacatl | 44 | Coyoltototl | 173 |
| Cocorzin | 61 | Cozcacoauhtli | 161 |
| Cochitototl | 168 | Coztototl | 90, 173 |
| Coddel cauka | 194 | Crex Bellonii five Cheva- | |
| Colcanauhtli | 176, 177 | lier | 106 |
| Colcanauhtlicioatl | 175 | Crex Aristotelis | 58 |
| Colcuicuiltie | 158 | —Indica | 194 |
| Colherado | 102, 189 | Cuculus | 23 |
| Colin | 158 | Cuitcuitzcatototl | 173 |
| Collurio | 18 | Culo bianco | 76 |
| Columbæ | 59 ad 63, 183 | Cundoe Vanga Pundoe | |
| —Groenlandica | 121 | | 195 |
| —Madraspatan | 196 | Cuntur | 11 |
| Coltotl | 171 | Curicaca | 103 |
| Colymbi | 124, 125, 126, 190 | Curruca | 79 |
| Colymbis | 142 | Curucui | 45 |
| Comaltecatl | 177 | Cyanos seu Cœrulea | Avis |
| Concanauhtli | 175 | | 66 |
| Confricatrix rubra | 172 | —Indica | <i>ibid.</i> |
| Coracias | 40 | Cygnus cucullatus | 37 |
| Corlito | 178 | —Ferus | 136 |
| Cornix | 39 | —Manfuerus | <i>ibid.</i> |
| —Cœrelea | 42 | | |
| —Frugilega | 39 | | |
| —Cinerea frngilega. | <i>ib.</i> | | |
| —Nigra Garrula | 181 | | |
| Cornicines | 156 | | |
| Corrira | 118 | | |
| Corvus | 39 | | |
| —Aquaticus | 104, 122, | | |
| | 123 | | |
| —Indicus | 40 | | |
| —Indicus Cornutus. | <i>ib.</i> | | |
| Coturnice | 57 | | |

D.

| | |
|---------------|-----|
| D Aje | 155 |
| Dendrofalco | 14 |
| Diabie de mer | 117 |
| Dronte | 37 |

E.

| | |
|-------------------|-----|
| E Catototl | 173 |
| Eider | 141 |
| [O] | En |

I N D E X.

| | |
|-----------------------|--------------|
| Ein Grosse Zee-fluder | 126 |
| Elcoztototl | 168 |
| Elotototl | 170 |
| Emberiza Alba | 93 |
| ——Flava | <i>ibid.</i> |
| Emeu, Eme, Ema | 36 |
| Erithacus | 78 |
| Erythrocephalos | 143 |

F.

| | |
|---------------------|--------------|
| F Alcinellus | 103 |
| Falco Albus | 14 |
| ——Columbarius | 161 |
| ——Gentilis | 13 |
| ——Gibbosus | 14 |
| ——Indicus Cirratus | <i>ibid.</i> |
| ——Montanus | 13 |
| ——Peregrinus | <i>ibid.</i> |
| ——Rubeus | 14 |
| ——Indici Rubri | <i>ibid.</i> |
| ——Sacer | 13 |
| ——Tunetanus | 14 |
| Fedoa | 105 |
| Festuni cul de &c. | 191 |
| Ficedula | 79, 81 |
| ——Cannoabina | 47 |
| Flammant | 117 |
| Francolino | 54 |
| Fratercula | 120 |
| Fregata | 153 |
| Fregattes. | 192 |
| Fringilla | 88 |
| ——Motana | <i>ibid.</i> |
| Fringillago | 73 |
| Fringillarius | 18 |
| Fulica | 116, 117 |
| Fuligula | 142, 143 |
| Fuves | 191 |

G.

| | |
|--------------------------|---------------|
| G Albula | Pag. 68 |
| Gallina Corylorun | 55 |
| ——Mexicana | 163 |
| Gallinago, Major, Minor, | |
| Minima | 105 |
| ——Madraspat. | 193 |
| ——Erythra | 109 |
| ——Erythropus | 107 |
| ——Hypoleucos | 108 |
| ——Melampus | 109 |
| Gallinula Aquatica | 116 |
| ——Braziliensis | 115 |
| ——Chloropus | 113, 114, 190 |
| ——Ochra | 115 |
| ——Ochropus | <i>ibid.</i> |
| ——Serica | 113, 114 |
| Gallo-Pavo | 51, 182 |
| ——Sylvestris | 51 |
| Gallus Gallinaceus | 51, 182 |
| ——Guineensis | 51, 182 |
| ——Peregrinus | 37 |
| Gallus Indicus | 52 |
| ——Sylvestris | 53 |
| Gambetta | 107 |
| Garagues | 162 |
| Gargane | 148 |
| Garrulus Argentoratensis | 41 |
| ——Bohemicus | 42, 85 |
| Garzetta | 99 |
| Gaviaon | 17 |
| Gaviata | 130 |
| Geel Vinck | 151 |
| Giarolo | 70 |
| Giaroncello | 109 |
| Glareano | 81 |

I N D E X.

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Glaucium | Pag. 143, 144 | Harle | Pag. 134 |
| Glottil | 106 | Havelda | 145 |
| Goifugek | 118 | Hazlehun | 55 |
| Gout vinken | 152 | Hellalenia | 65 |
| Gouambuch | 82 | Hiaticula | 112 |
| Graculus Palmipes | 122, 123 | Himantopus | 106, 190 |
| Grand Gofier | 191 | — Madraspar. | 193 |
| Grisola | 81 | Hippomanucodiata | 21 |
| Grinetta | 114 | Hiragrill | 92 |
| Grivesbees | 152 | Hirundo Americana | 72 |
| Gros | 95 | Hirundo Apus | <i>ibid.</i> |
| — Balearica | <i>ibid.</i> | — Domestica | 71 |
| — Indica | <i>ibid.</i> | — Marina | 72, 131, |
| Grygallus | 54 | | 190, 191 |
| Guacagnacu | 130 | — Ripraia | 71 |
| Guaiminibique | 82 | — Rustica | five A- |
| Guainumbi | 82, 83, 187 | greftis | 71 |
| Guara | 104 | — Sinensis | 72 |
| Guarauna | <i>ibid.</i> | Hoactli | 179 |
| Guira | 151 | Hoacton | 102 |
| — Acangatarara | 45 | Hoactzin | 163 |
| — Coereba | 83 | Hoauhtototl | 170 |
| — Guacuberaba | <i>ibid.</i> | Hoextototl | <i>ibid.</i> |
| — Guainumbi | 49 | Hôilotl | 63 |
| — Wieemgaru | 89 | Hoinerli | 161 |
| — Perea | <i>ibid.</i> | Hoitlalloth | 158 |
| — Punga | 166 | Hoitzanatl | 162 |
| — Querea | 27, 180 | Hoitzilazatl | 102 |
| — Tangeima | 45 | Hoitzitzil | 82 |
| — Tinga | 189 | Hortulanus | 93, 94 |
| — Tirica | 86 | Hoxoconaultli | 50, 174 |
| Guiraru | 166 | | |
| Gulla Cavalla | 197 | | |
| Gypaetos | 8 | | |
| Gyrfalco | 13 | | |

H.

HÆmatopus 105
Halixætos 7, 16

J Abiru 96
— Guacu *ibid.*
Jacamaciti 44
Jacana 115
Jacapu 67
[O 2] Jacu-

I.

INDEX.

| | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Jacupema | Pag. 56 | Lepelaer | Pag. 189 |
| Jager-Vogel | 40 | Leimerillon | 19 |
| Jaguacati Guacu | 49, 182 | Ligurinus | 91 |
| Jamacaii | 75 | Limosa | 190 |
| Janibu | 57 | —— Venetorum | 106 |
| Japacani | 84 | Linaria | 90 |
| Japu | 46, 184 | —— Montana | 91 |
| Ibijau | 27 | —— Rubra major minor | <i>ibid.</i> |
| Ibis nigra | 98 | | |
| Icterus | 68, 184 | Lithofalco | 14 |
| Jendaya | 34 | Locustella | 70 |
| Illas seu Tylas | 64 | Lomwia | 120 |
| Ipeca Guacu | 149 | Lory | 151 |
| Ipecu | 43 | Loxia | 86 |
| Ispida | 48 | Lumme | 126 |
| —— Indica major | 50 | Lunda | 120 |
| —— Indica Macrouros | <i>ibid.</i> | Lupus | 40 |
| —— Indica minor | <i>ibid.</i> | Luscinia | 73, 185, 187 |
| —— Mexicana | 50, 174 | Lusciniola | 80 |
| —— ex atro & albo | | Lutea | 93 |
| varia | 182 | Luteola | 80 |
| Junco | 47, 110, 113 | | M. |
| Jupujuba | 46, 184 | | |
| Jynx | 44 | M Acroule | 117 |
| Jzanatl | 168 | Macucagua | 53 |
| | | Magnanina | 79 |
| K: | | Maguari | 97 |
| K Ernell | 148 | Maja | 155 |
| Kudge-ghes | 128 | Majague | 133 |
| | | Mallemuck | 130 |
| L: | | Mansfeny | 19 |
| | | Manucodiata | 20, 21, 22 |
| L Agopus | 54, 55 | —— Maderasp. | 195 |
| Lanarius | 15 | Maracana | 29 |
| Lanius | 18, 19 | Maraca | 119 |
| Larus 126, 127, 128, 129, | | Martinazzo | 130 |
| 130, 131 | | Matkern five Matknelzel | |
| | | | 109 |

Ma-

I N D E X.

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| Matuitui P. 113, 165, 190 | Nepapantototl | Pag: 176 |
| Mazarinò 103 | Nexton | 164 |
| Melanætos 7 | Nextototl | <i>ibid.</i> |
| Meleagris 51, 182 | Nhandu Apoa | 96 |
| Merganser 134 | Nhandu Guacu | 36 |
| Mergulus Melanoleucos 125 | Nisus | 18 |
| Mergus 119, 125, 134, 135, | Nochtototl | 171 |
| 142 | Noctua auritæ | 24, 25 |
| Merops 49 | Noctua non auritæ | 25 |
| Merula 65 ad 67, 68, 185 | Noctua Brasiliensis | 26 |
| Merulæ congener 67 | ———— Mexicana | 166 |
| Merzcanauhtli 175 | ———— Minor | 26 |
| Metzcanahactli <i>ibid.</i> | ———— Silvatice Jamaycensis | |
| Miacarototl 172 | Minor | 180 |
| Miliaria 46 | Naitibo | 27 |
| Milvorum species 17 | Nopaltencol | 167 |
| Mimus 42 | Numenius | 103 |
| Mita five Mutu Brasiliensis | ———— Indicus | 104 |
| 52, 183 | Nycticorax | 99 |
| Mituporanga 52 | | |
| Mocotototl 166 | O. | |
| Momot 164 | | |
| Monedula 40, 185 | O Cocolin | 57, 163 |
| Monticola 77 | Ocononetl | 162 |
| Montifringilla 88 | Ocotzinitzcan | 164 |
| Morillon 143 | Oculus pictus | 170 |
| Morinellus 111 | Oedicephalus | 108 |
| ———— Marinus 112 | Oenanthe | 75 |
| Morphnos 7 | ———— Altera | 76 |
| Motacilla Alba 75 | ———— Congener | 80, 92 |
| ———— Cinerea <i>ibid.</i> | ———— Fusca Lutea | 186 |
| ———— Flava <i>ibid.</i> | ———— Nostra secunda | 76 |
| ———— Madaraspat 194 | ———— Nostra tertia | <i>ibid.</i> |
| Muggent 146 | ———— Nostra quarta | 77 |
| Muscicapa 81, 77, 76, 186 | ———— Vitiflora | 75 |
| | Oenus | 62 |
| | Olotototl | 169 |
| | Onocratalus | 121, 191 |
| | Opipehan | 177 |
| | Oriolus | 68 |
| | | <i>Oryz.</i> |
| N. | | |
| N Ebbi 161 | | |
| Negro 96 | | |

I N D E X.

| | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Oripelargus | Pag 8 | —Ruffa feu Græca P. | 57 |
| Ortygometra | 58, 113, 29c | Pernopteros | 8 |
| Offifraga | 7 | Le Pefcheur | 19 |
| Otis | 58 | Petronia Marina | 92 |
| Otus | 25 | Phafcas | 147 |
| Ouriffia | 82 | Phafianus | 56 |
| | | —Brasiliensis | 56 |
| P. | | Philomela | 78, 187 |
| | | Phoenicopterus | 117, 190 |
| P Alumbus torquarus | 62 | Pica feu Pica varia Cau- | |
| Papagayos | 181 | data | 41 |
| Paragua | 33 | —Antillarum | 152 |
| Paradifæa Avis | 22 | —Brasiliiana | 44 |
| Pari | 73, 74 | —Glandaria | 41 |
| Paffary Caye | 195 | —Jamaicenfis | 181 |
| Passeres Arundinacei | 74, | —Indica caudata feu | |
| | 93 | Japonenfis | 42 |
| —Fabri | 157 | —Marina | 41, 105, 120 |
| —Cæruleo fufcus, | 82 | —Mexicana | 162 |
| niger | 187, 188 | —Perfica | 42 |
| —Trogodytes | 80 | Pici Martii | 42, 162 |
| —Canarienfis | 91 | Picus canefcens feu Leuco- | |
| —Sibilans | 164 | phaeus | 182 |
| —Stultus | 154, 190 | —cinereus | 47, 186 |
| —Cætera fpecies | 66 | —Garrulus Indicus | 42 |
| | ad 88 | —Jamaicenfis Pag. | 181 |
| Paflerculus Zeylanicus | 88 | —Imbrifætus | 162 |
| Patines de Oviedo | 191 | —Luteus Cyanopus | 44 |
| Pavo | 51, 183 | —Maderaspatan. | 194 |
| Pelecanus | 121, 191 | —Murarius | 46 |
| Penelops | 143 | —Nidum fuspendens | 68 |
| Penelope | 146 | —Niger maximus | 42 |
| Penne Vogels | 151 | —Varius Brasilienfis | 43 |
| Peache Caye | 195 | Picus varius Major | ibid. |
| Perdix | 57 | —Varius Minor | ibid. |
| —Alba | 55 | —Varius Minimus | ibid. |
| —Brasiliiana | 57 | —Viridis | 42 |
| —Cinerea | ibid. | —Viridis Major | 43 |
| —Damalcena | 55, 57 | Piciciti | 159 |
| —Montana | 57, 183 | Picupinima | 62, 184 |
| | | Pil. | |

I N D E X.

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Pilvenckegen | Pag. 108 | Quapachtototl | Pag. 174 |
| Pinirolo | 109 | Quatoromomi | 162 |
| Piranga Guacu | 165 | Quatoztli | 172 |
| Pitzmalotl | 167 | Quattr' Occhii | 142 |
| Platea seu Pelecanus | 102 | Quauhchichil | 84 |
| — Mexicana | <i>ibid.</i> | Quauhchochopitli | 163 |
| — Incarnata | 189 | Quauheilni | 171 |
| Pluvialis cinerea | 111 | Quauhtotopotli | 162 |
| — ex fusco & albo varia | 190 | Quauhtzonecolin | 158 |
| — Major | 190, 106 | Quaxoxoctototl | 164 |
| — viridis | 111, 190 | Querquedula Cristata | 142 |
| Podicipes | 125, 190 | — Latirostra Mexicana | 177 |
| Poero | 151 | Querquedula prima | 148 |
| Poliopus | 114 | — secunda | 147, 192 |
| Ponnandutty | 195 | Quetzaltototl | 157 |
| Ponnunky pitra | <i>ibid.</i> | Quijubatui | 35 |
| Porphyrio | 116 | | |
| Poules Pintades | 182 | R. | |
| Poxaquia | 160 | | |
| Psitracorum Marina species | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | R Abihorcado seu Rabo | |
| Psitacus Leucocephalus | 181 | forcado | 153, 192 |
| — Maximus Cyanocro- | | Rabolane | 55 |
| ceus | 181 | Rallus Aquaticus | 113 |
| — Minor collo miniaceo | 181 | — — Itarorum | 116 |
| — Minor macropuros ro- | | — — Terrestris | 58 |
| tus viridis | 181 | Rathsherr | 126 |
| Puffinus | 134 | Recurvirostra | 117 |
| Pygargus | 7, 17 | Regulus | 79, 80 |
| Pyrrhocorax | 40 | Reigers | 152 |
| Pyrrhula | 86 | Rhinoceros Avis | 40 |
| | | Riis Mossen | 151 |
| | | Riis Vogels | <i>ibid.</i> |
| | | Rostrum spicæ Maizii | 178 |
| | | Rostrum Sudis | 164 |
| | | Rothalss | 143 |
| | | Rorknussel | 109 |
| | | Rorschwentzel | 78 |
| | | Rouffette | 80 |
| | | Rubecula | 78 |
| | | — Indica | <i>ibid.</i> |
| | | — Viri | |

I N D E X.

| | | | |
|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| —— Viridis | Pag. 187 | Struthio seu Struthio Came- | |
| Rubetra | 76 | lus | Pag. 36 |
| Rubicilla | 86 | Struthio Camelus America- | |
| —— Americana | <i>ibid.</i> | nus | <i>ibid.</i> |
| Rubicola | 76. | Sturnus | 67 |
| Ruticilla | 78 | —— Indicus | 68 |
| —— Major | 68 | —— Junceri | 168 |
| | | —— Marinus | 67 |
| | | —— Mexicanus | 166 |
| | | —— Salsus | 168 |

S.

| | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| S Alicaria seu filerella | 81 | Subbuteo | 15, 17 |
| Sanguillo | 197 | Sulfa | 123 |
| Saulary | <i>ibid.</i> | Summoodra cauky | 194 |
| Sayacu | 89 | | |
| Schellent | 144 | | |
| Schoeniclos | 110 | | |
| Scolopax | 104 | | |
| Scops | 25 | | |
| Scurvogel | 96 | | |
| Senator | 126 | | |
| Serinus | 92, 153 | | |
| Serino affines | 188 | | |
| Sguacco | 99 | | |
| Sitta | 47, 185, 186 | | |
| Skua | 128 | | |
| Soco | 100 | | |
| Sparverius | 18 | | |
| Spinus | 91 | | |
| Spipola | 80, 81 | | |
| Spipoletta | 70 | | |
| Springers | 152 | | |
| Squaiotta | 99 | | |
| Stella Avis | 59 | | |
| Sterna | 131 | | |
| Stopparola | 77, 81 | | |
| Strantloopers | 151 | | |
| Strapazino | 81 | | |
| Strix | 25 | | |
| Strix Cinerea | 26 | | |
| Strundt Jager | 127 | | |

T.

| | |
|----------------------|--------------|
| T Adorna | 140 |
| Tamatiã | 65, 116 |
| Tangara | 84 |
| Tapera | 72, 185 |
| Tapun | 155 |
| Tarabe | 33 |
| Taraniolo | 103 |
| Tatac | 171 |
| Toauhtetotl | 170 |
| Techictli | 172 |
| Tecolotl | 160 |
| Teitei | 92 |
| Tella yeaco narry | 195 |
| Tempatlahoac | 176 |
| Teperototl | 52 |
| Tequix-quiacatzanatl | 168 |
| Tertiarius | 13 |
| Tetrao | 53 |
| —— Major | <i>ibid.</i> |
| Tetzompan | 167 |
| Thraupis | 92 |
| Tijeguacu Paroara | 89 |
| Tijepiranga | <i>ibid.</i> |
| Tinnunculus | 16, 180 |

Tla-

I N D E X.

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Tlacahoilotl | Pag. 63 | Txonyayauhi | Pag 168 |
| Tlacoquauhtli | 161 | Tzanahoei | 162 |
| Tlalchinoltototl | 171 | Tzanatl | 157 |
| Tlalquipatl | 160 | Tzanatl tototl | 166 |
| Tlanquiquiztototl | 164 | Tzaupan | 160 |
| Tlapulchichi | 172 | Tzinitzian | 163 |
| Tlapaltototl | 174 | Tzitzihua | 175 |
| Tlaquauhtli | 161 | Tzitziquilotl | 173 |
| Tlaquilotorotl | 173 | Tzoniayauhqui | 176 |
| Tlahquechultototl | 162 | Tzopiloth | 10 |
| Tlahuechul | 102, 189 | Tzopilotl | 180 |
| Tlotli | 161 | | |
| Tolchiquatli | 160 | V. | |
| Tolocatzanatl | 168 | | |
| Toltecocoltli | 175 | V Anga pandooe | 194 |
| Tomineio | 82 | —pedda | <i>ibid.</i> |
| Tooracca | 197 | Vannellus | 110 |
| Topau | 40 | Venceios | 185 |
| Tordino | 70, 94 | Verzellino | 92 |
| Torquilla | 44 | Vitiflora | 75 |
| Toranus | 105, 106, 107, 190 | Vogel Rubus | 151 |
| Tortovilla | 69 | Ulula | 26 |
| Toxcacoztic | 167 | Upupa | 48 |
| Tozcacoztli | 173 | Urogallus | 53 |
| Tringa | 108 | Urubiringa | 8 |
| Triorches | 16 | Urubu | 10, 180 |
| Triton | 156 | Urutaurana | 7 |
| Trochilus | 79, 118 | Vulpanfer | 140 |
| Tucana seu Toucan | 44 | Vulturum species | 9, 10 |
| Tui | 34, 181 | | |
| Tuiapara | 35 | W: | |
| Tuiaputejuba | 34, 181 | | |
| Tuiete | 34 | W Agellus | 130 |
| Tuipara | 35 | Wegflecklin | 78 |
| Tuitirica | 34 | Walluhora | 115 |
| Tupinambis | 49 | Wiitbekken | 151 |
| Tuputa | 156 | Wikurulla Zeylanensis | 88 |
| Turdi Chiappæ | 157 | Winder-Meb | 129 |
| Turdi | 64 ad 68, 185 | Woorulin ponnunky | 169 |
| Turtures | 61, 62, 184 | Wynkernell | 115 |
| | | | Xol. |

I N D E X.

| | | | |
|-------------------|-----|---------------------|--------------|
| X. | | | Pag. 169 |
| X Alcuani | 176 | Yacatlil | 164 |
| Xampantototl | 173 | Yacatopill | 167 |
| Xaxabes | 181 | Yayaukquitotl | 170 |
| Xiquipiltototl | 173 | Yexixouhqui | <i>ibid.</i> |
| Xochiltotl | 170 | Yllamotototl | 160 |
| Xochitecanatl | 178 | Yohaltrecototl | 117 |
| Xochitototl | 167 | Yohoalcoachillin | 178 |
| Xolotlapech | 174 | Yohualquachili | 171 |
| Xomotl | 177 | Yohualtototl | 171 |
| Xotlapech | 169 | Yxamatzcattototl | 168 |
| Xoxoukqui Hoactli | 102 | Yxamazcatl | 171 |
| | | Yxtezcatototl | 170 |
| | | Yzcuicuil | 161 |
| | | Yzquauhli | 176 |
| | | Yztactzon-yayauhqui | |

Y.

| | |
|--------------------|-----|
| Y Acacintli | 178 |
| Yacapatlahoac | 176 |
| Yacapitzahoac | 177 |
| Yacatexotli | 175 |

Z.

| | |
|----------------|----|
| Z Ivolo | 93 |
|----------------|----|



F I N I S.



